V.

Verzeichniß

bekannter

Schmettlinge

verfaßt

von

ADELHAUSER
MONASTERIUS

Jacob Hübner.

Augsburg,
bey dem Verfasser zu finden.
1816.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

So manche systematische Schrift, von den bekannten Lepidopteren, schon erschienen ist, so ist doch noch keine vorhanden, worinne alle bekannte Schmettlinge genau bestimmt, füglich gereiht, und bräuchlich benennt worden sind.

Dieses Bewandtniß zwang mich, vor zehn Jahren, als ich meine, vorhin auf die europäische Schmettlinge beschränkte, lepidopterologische Arbeiten, auch auf die exotische auszudehnen beginnte, mir ein systematisches Verzeichniß der sonderbaren Gattungen zu entwerfen, um meine vorhabende Sammlung exotischer Schmettlinge darnach anlegen zu können.

Die Grundlage dieses Entwurfes habe ich sogleich, unter dem Titel: Tentamen determinationis, digestionis atque denominationis singularium stirpium Lepidopterorum bekannt gemacht, damit sie von Verständigen, bevor ich sie annähme, geprüft und beurtheilt werden möchte.

Obwohl ich diese Grundlage nach den manigfältigsten Eigenheiten der Schmettlinge wie nach den gesetzgebenden Systemen der Schriftsteller zu richten suchte

und deswegen sicher seyn mußte, daß sie nicht verworfen werden dürfe, so konnte ich mich doch nicht bereden, daß sie keiner Verbesserungen mehr bedürfen werde.

Denn es ist offenbar, wenn die Lepidopterologie zu einem ihr angemessenen Systeme gelangen soll, so müssen alle Unterschiede der Schmettlinge vollkommen gewürdiget werden. Eine solche Würdigung deucht schon lange sehr nothwendig zu seyn, mithin wird es auch immer unumgänglicher werden, daß die Lepidopterologen sich dazu bequemen.

Ich unternahm es zwar schon bey meiner vorhabenden Sammlung exotischer Schmettlinge eine genauere Bestimmung, füglichere Anordnung und bräuchlichere Benennung einzuleiten. Aber zu viele Hindernisse, welche sich dabey erheben, hemmten mich bisher dieses Unternehmen rasch fortsetzen zu können. Dieses veranlaßte mich nun gegenwärtiges Verzeichniß bekannter Schmettlinge herauszugeben, wodurch ich viel leichter und bälder einen völligen Begriff meines Vorhabens gewähren kann, als durch mit vieler Mühe hergestellte Erschreibungen und Fürbildungen, es möglich ist.

In diesem Verzeichnisse sollen jetzt, alle Schmettlinge, nach ihren mancherley Auszeichnungen, welche ihnen von der Natur her eigen sind, beachtet und er-

wogen, aufgenommen werden. Dazu ist nicht nur die Erhaltung der Horden, Rotten, Stämme wie der Familien, sondern auch die Absonderung der Vereine unerläßlich und vielleicht noch die der Reihen nöthig. Hofflich ist es daher, daß auch diese Vereine gerne angenommen werden, indem sie wenigstens meiner Ueberzeugung gemäß, falls die Kunde der Lepidoptern in ihrer Vervollkommnerung nicht aufgehalten seyn solle, doch durchaus eingeführt werden müssen.

Schon lange ist erwießen und anerkannt, daß bey den Schmettlingen die Bildungsarten ihrer Sinnglieder, so bedeutend sie auch sind, nicht verläßig genug seyen, um unfehlbar darnach bestimmen, anordnen und benennen zu können. Es ist deswegen viel gewisser, wenn sowohl auf die Gestalt, als auf die Bildungen, Besetzungen, Bekleidungen und Zeichnungen aller Glieder geachtet wird, zu ihrer richtigen Kenntniß zu gelangen.

Wie widrig etlichen Aechtern der Schmettlingskunde, entweder die Erhaltung alter oder die Annahme neuer Gesetze scheinen möchte, so würde es doch allen wirklich noch viel widriger werden, wenn alte gründliche verlassen und neue willkührliche befolgt werden sollten, wie auch wenn neue förderliche unbenützt, und alte hinderliche angewandt bleiben müßten.

Da ich mich wegen Mangel natürlicher und vollständiger Muster sehr oft an Erschreibungen und Fürbildungen genügen lassen muß, so werde ich vermuthlich manche Gattung gar nicht erkennen oder doch verkennen können, auch durch falsche Bestimmung, Einschaltung und Benennung öfters irre werden. Erfahrne und billige Kenner werden mir solche Fehler, als dem Ersten, welcher es wagte der Lepidopterologie eine zureichendere und richtigere Verfassung zu geben, gerne verzeihen, besonders weil ich es damit allen leicht mache, Fehler zu erkennen und zu verbessern.

Möchte nur künftighin jedem Kundigen und Aechter der Schmettlinge es auch angelegen seyn, die in mehr als einem Betrachte allgemein wichtige Schmettlingskunde nach Vermögen zu fördern und ihre Hindernisse zu heben, so würde die wahrscheinlich unnachholbare Versäumniß, welche sie bisher erlitten hat, bald zu vergessen seyn.

Augsburg, am 21. September, 1816.

Jacob Hübner.

Schmettlinge. Lepidoptera.

Lepidoptera Linnei; Glossata Fabricii.

Kennzeichen.

Ein einfach herzförmiger beharter Kopf, mit einem holen leeren Mund, einer knotigen, zweyschnaubigen Nase, zwey klappenähnlichen aufwärts gekehrten behaarten Streichlern, zwey halb kugligen, vielfachen Augen, und zwey kielförmigen, vielgliedigen Ohren. Ein länglichrunder, gewölbter, auch behaarter Rumpf mit einem zweylappigen behaarten Kragen, zwey lappenförmigen behaarten Deckgen, zweyerley Paaren, zweigigsenigen hautähnlichen Flügeln, welche mit federähnlichen Schuppen reihenweise besetzt sind, dreyerley Paaren gliediger, beschüppter Stützen, und einem ringweise zusammenhängenden behaarten Wanst.

Erste Horde, Phalanx prima.

Falter, Papiliones.

Papiliones Linn. Papiliones & Hesperiae Fabr.

Kennzeichen.

Der Mund und mit ihm die Schnauben in einen dreyröhrigen hornartigen Rüssel, welcher eingerollt ist, verlängert; die Streichler mit einer spitzigen, fast vorwärts gerichteten Schnauze besetzt; die Ohren gegen ihr Ende sehr merklich verdickt. Der Körper und die Deckgen kurz, und die Flügel sehr ansehnlich groß.

Erste Rotte, Tribus prima.

Nymphalen, Nymphales.

Nymphales Linn. & Fabr.

Kennzeichen.

Die Streichler unmerklich gegliedert, die Ohren ziemlich lang und strack; die Aerme klein und fast klauenlos.

1. Stamm, Stirps I.

Nereiden, Nereides.

Heliconii Linn. & Fabr.

Kennzeichen.

Die Ohren dünn, aber gegen das Ende kolbig verdickt. Die Schwingflügel schmal und lang, die Senkflügel breit und kurz; die Aerme ziemlich lang, die Träger und Füße mit einem Paar zarter Dorne am Ende der Schienen besetzt, und an den Rüsten ziemlich dörnlig, der Wanst sehr dünn, aber gegen den After verdickt.

Erste Familie, Familia A.

Gläsige, Vitreae.

Beyderley Flügel im innern Raume durchsichtig.

1. Verein, Coitus 1.

Hymeniten, Hymenites.

Die Schwingen halb bandirt.

1. Hymenitis Diaphane. Diaphanus Druryi II. 7. 3. Diaphana Crameri 231. C. Hübneri Samml. europ. Schmett. auf dem Titelblatte.
2. H. Sao. Hübn. Zuträge 123. 124.

2. Verein, Coitus 2.

Ithomien, Ithomiae.

Die Schwingen einmal bandirt.

3. Ithomia Drymo. Diaphana Cram. 315. D. E.
4. I. Euritea Cram. 280. D.
5. I. Doto Hübn. Ner. vitr. Doto.
6. I. Cymo Hübn. Ner. vitr. Cymo.

3. Verein, Coitus 3.

Oleriен, Oleriae.

Die Schwingen zweymal bandirt.

7. Oleria Astrea Cram. 22. D.
8. O. Flora Cram. 257. B. C. Hippodamia Fabr. Ent. Pap. 509?
9. O. Clio Linn. Syst. Pap. 66. Cram. 257. D. E.

4. Verein, Coitus 4.

Thyridien, Thyridiae.

Beyderley Flügel bandirt.

10. Thyridia Themisto.
11. T. Psidii Linn. Syst. Pap. 64. Cram. 257. F.
12. T. Ilione Cram. 26. G. H.

5. Verein, Coitus 5.

Aeriен, Aeriae.

Beyderley Flügel sehr zart gelblich beschüppelt.

13. Aeria Nasica Fabr. Ent. Pap, 523. Ammon Cram. 146. B.
14. A. Reckii Hübn. Ner. vitr. Reckia.
15. A. Aegle Fabr. Spec. Pap. 527. Eurymedia Cram. 126. C. D. Hübn. Ner. vitr. Aegle.

16. Aer. Vocula Cram. 353. C. D.
17. A. Asarica Cram. 363. A. B.

6. Verein, Coitus 6.

Ceratinien, Ceratiniae.

Beyderley Flügel trübfärbig beschüppelt.

18. Ceratinia Eumelia Cram. 280. D.
19. C. Lenea Cram. 231. D.
20. C. Melanida Cram. 231. F.
21. C. Neso. Nise Cram. 231. F? Selene 315. F. G. Hübn. Ner. vitr. Neso. Obscuratus Fabr. Ent. Pap. 572?
22. C. Ninonia. Hübn. Ner. vitr. Ninonia.

Zweyte Familie, Familia B.

Rostgelbe, Fulvae.

Die Flügel rostgelb, schwarz und schwefelgelb gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Saiden, Saides.

Die Schwingen einfach fleckig bandirt.

23. Sais Rosalia Cram. 246. B.
24. S. Pamela Cram. 319. A.

2. Verein, Coitus 2.

Dismorphien, Dismorphiae.

Die Schwingen klein, die Senken groß, buntfärbig.

25. Dismorphia Laja Cram. 232. C. D.
26. D. Amphione Cram. 232. E. F. Crisia Fabr. Ent. Pap. 515?

3. Verein, Coitus 3.

Mechaniten, Mechanitae.

Die Schwingen zweyfach fleckig bandirt, die Flecke theils weiß.

27. Mechanitis Eucrate.
28. Mech. Lysimnia Fabr. Ent. Pap. 498.
29. Mech. Polymnia Linn. Syst. Pap. 58. Cram. 191. E. Hübn. Ner. fulv. Polymnia.

4. Verein, Coitus 4.

Eueiden, Eueides.

Die Schwingen zweyfach fleckig bandirt, die Flecke alle gelb.

30. Eueides Dianasa Hübn. Ner. fulv. Dianasa, Isabella Cram. 250. C?
31. E. Halia. Ceres Cram. 90. A.
32. E. Pasinuntia Cram. 316. A. B. C. Eva Fabr. Ent. Pap. 501.
33. E. Eucoma.
34. E. Mneme Linn. Syst. Pap. 59. Cram. 190. C.
35. E. Pione. Numata Cram. 297. C.
36. E. Harmonia Cram. 190. D. Mopsa Fabr. Syst. Pap. 72.

5. Verein, Coitus 5.

Melinäen, Melinaeae.

Die Schwingen dreyfach fleckig bandirt, die Flecke alle gelb.

37. Melinaea Egina Cram. 191. D. & Ludovica 297. E. Egena Fabr. Ent. Pap. 500.
38. M. Clara Fabr. Ent. Pap. 499. Silvana Cram. 364. C. D.
39. M. Equicola Cram. 297. F.
40. M. Eunice Hübn. Ner. fulv. Eunice.
41. M. Irene Drur. III. 38. 1. Stoll. 30. 3. C.

Dritte Familie, Familia C.

Festliche, Festivae.

Die Flügel roth geziert, in schwarzer Grundfärbung.

1. Verein, Coitus 1.

Migoniten, Migonites.

Beyderley Flügel rothstrahlig gezeichnet.

42. Migonitis Thales Fabr. Gen. mant. 255. Hübn. Ner. fest. Thales. Cram. 38. C. D.

43. M. Aoede Hübn. Zutr. 129. 130.

44. M. Erato Linn. Syst. Pap. 70. Vesta Cram. 119. A. Hübn. Ner. fest. Vesta.

45. M. Burneyi.

46. M. Thelxiope. Hübn. Ner. fest. Thelxiope. Terpsichore Cram. 119. A? & Cybele 188. A?

47. M. Andremone Cram. 297. A.

48. M. Ulrica Cram. 297. B.

49. M. Erythrea Cram. 189. A.

50. M. Isaea. Egeria Cram. 34. B.

51. M. Crenis. Amathusia Cram. 177. F. Hübn. Ner. fest. Delila.

2. Verein, Coitus 2.

Suniaden, Suniades.

Die Schwingen roth gefleckt, in schwärzlichbraunem Grunde.

52. Sunias Phyllis Fabr. Syst. Pap. 86. Roxane Cram. 45. E. F.

53. S. Lucia Cram. 350. E.

54. S. Melpomene Linn. Syst. Pap. 71. Cram. 191. C.

55. S. Callicopis Cram. 190. E. F.

3. Verein, Coitus 3.

Apostraphien, Apostraphiae.

Die Schwingen limoniengelb gefleckt, die Senken roth bezeichnet.

56. Apostraphia Ricini Linn. Syst. Pap. 63. Cram. 378. A. Myrti Fabr. Syst. Pap. 82.

57. A. Brassolis Fabr. Syst. Pap. 317. Bellona Cram. 13. E.

58. A. Charitonia Linn. Syst. Pap. 65. Cram. 191. F.

Vierte Familie, Familia D.

Blaue, Caeruleae.

Beyderley Flügel blauschimmernd schwarz.

1. Verein, Coitus 1.

Sycionien, Sycioniae.

Die Flügel blaustralig, gelbfleckig und mit rothen Puncten bezeichnet.

59. Sicyonia Sara Fabr. Ent. Pap. 518. Clytia Cram. 66. C. Hübn. Ner. caer. Sara.

60. S. Thamar. Hübn. Ner. caer. Thamar. Rhea Cram. 54. C. D.

61. S. Apseudes Hübn. Zutr. 141. 142.

62. S. Doris Linn. Mant. 536. Quirina Cram. 65. & Doris 337. C.

2. Verein, Coitus 2.

Ajanten, Ajantes.

Die Flügel blaulichschwarz, weiß gefleckt und mit rothen Puncten bezeichnet.

63. Ajantis Sappho Drur. III. 38. 4. Sapho Stoll. 30. 2. B.

64. Ajan. Antiocha Cram. 38. E. F. Antiochus Linn, Syst. add. 12.

65. A. Hecale Fabr. Gen. mant. 254. Pasithöe Cram. 17. A.

2. Stamm, Stirps II.

Limnaden, Limnades.

Danai festivi Linn. Festivi Fabr.

Kennzeichen.

Die Ohren ziemlich lang und kolbig; die Flügel beyderley breit und länglich; die Aerme kurz, fast glatt; die Träger und Füße am Ende der Schiene mit einem Paare zarter Dornen besetzt, ihre Rüsten rauh, ihre Klauen lang und fast gerade; der Wanst lang und gegen den After dicker.

Erste Familie, Familia A.

Wassergrüne, Thalassicae.

Beyderley Flügel, auch der Rumpf weiß gefleckt und gedupft, in düsterer Grundfarbe.

1. Verein, Coitus 1.

Amauren, Amaures.

Die Schwingen nur bandweise gefleckt, die Senken auch im innern Raum weiß.

66. Amauris Niavia. Niavius Linn. Syst. Pap. 109. Cram. 2. F. G. & 234. A.

67. A. Egialea Cram. 192. D. Damocles Fabr. Ent. Pap. 121.

68. A. Echeria Stoll. 29. 2. 2. B.

2. Verein, Coitus 2.

Hestien, Hestiae.

Beyderley Flügel ganz weißlichgrün gefleckt.

69. Hestia Similis Linn. Syst. Pap. 193. Limniace Cram. 59. D. E. Aventina 59. F. Aglea 377. E. & Cleona 377. F.
70. H. Assimilis Linn. Syst. Pap. 194. Cram. 154. A.
71. H. Idea Linn. Syst. Pap. 73. Cram. 362. D. 193. A. B. Hübn. Lim. thal. Idea.
72. H. Lyncea. Lynceus Drur. II. 7. 1. Idea. Stoll. 42. 3.
73. H. Ismare Cram. 279. E. F.
74. H. Ephyre. Melaneus Cram. 30. D.
75. H. Juventa Cram. 88. B.
76. H. Thöe. Lotis Cram. 230. D. E.

Zweyte Familie, Familia B.

Rostbraune, Ferrugineae.

Alle Flügel schwarz gesäumt und weiß gedupft.

1. Verein, Coitus 1.

Euplöen, Euploeae.

Die Schwingen endwärts weiß bandirt.

77. Euploea Hegesippe. Melanippus Cram. 127. A. B. & Hegesippus 180. A.
78. E. Plexippe. Plexippus Lin. Syst. Pap. 117. Genutia Cram. 206. C. D. Hübn. Lim. ferr. Genutia.
79. E. Philene Cram. 375. A. B.
80. E. Artenice Cram. 375. C. D.
81. E. Chrysippe. Chrysippus Linn. Syst. Pap. 119. Hübn. Pap. 678. 679. & Lim. ferr. Chrysippus.
82. E. Alcippe. Alcippus Cram. 127. E. F.
83. E. Dioxippe. Diocippus Cram. 28. B. C.

2. Verein, Coitus 2. zei

Anosien, Anosiae.

Die Schwingen endwärts weiß gefleckt.

84. Anosia Archippe. Archippus Cram. 16. A. B. Misippus Fabr. Syst. Pap. 171.

85. A. Misippe. Misippus Linn. Syst. Pap. 118. Inaria Cram. 214. A. B.

86. A. Menippe. Erippus Cram. 3. A. B. & Plexippus 206. E. F. Archippus Fabr. Ent. Pap. 150.

87. A. Vincedoxici. Gilippus Cram. 26. E. F. Hübn. Linn. ferr. Vincetoxici.

88. A. Erippe. Erippus Fabr. Mant. Pap. 282. Berenice Cram. 205. E. F.

89. A. Eresima. Eresimus Cram. 175. G. H.

Dritte Familie, Familia C.

Aenderliche, Mutabiles.

Die Flügel blaulichbraun gefärbt, weiß gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Trepsichroen, Trepsichroes.

Beyderley Flügel blauschillernd, die Flecke blaulichweiß.

90. Trepsichrois Basilissa Cram. 266. C. Midamus Sulz. 16. 4. 6. Claudius Fabr. Mant. Pap. 261.

91. T. Mulcibra. Mulciber Cram. 127. C.

92. T. Midamis. Midamus Linn. Syst. Pap. 108. Hübn. Lim. mut. Midamis.

93. T. Alea. Midamus Cram. 266. A. B.

94. T. Eleusina Cram. 266. D.

2. Verein, Coitus 2.

Crastien, Crastiae.

Alle Fl[illegible]l braun, weißfleckig bordirt.

95. Crastia Core Cram. 266. E. F. Corus Fabr. Ent. Pap. 122.

96. C. Limnoria. Climene Cram. 389. E. F.

3. Verein, Coitus 3.

Salpingen, Salpinges.

Die Flügel eigenförmig, düsterbraun, nur die Flecke blaulichweiß.

97. Salpinx Nemertes Hübn. Lim. Nemertes.

4. Verein, Coitus 4.

Didonen, Didones.

Die Senken gekerbt, alle Flügel braun und zierlich gefleckt.

98. Didonis Vitellia Cram. 349. E. F.

99. D. Biblis Fabr. Syst. Pap. 261. Hyperia Cram. 236. E. F.

3. Stamm, Stirps III.

Napäen, Napaeae.

Rurales Linn. & Fabr.

Kennzeichen.

Die Ohren lang; die Aerme ziemlich haarig, an den Langern, und der Wanst kurz.

Erste Familie, Familia A.

Gemeine, Frequentes.

Beyderley Flügel mit vielen kleinen Flecken geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Eurybien, Eurybiae.

Die Flügel trübfarbig und mit schwarzen und weißen Fleckgen reihweise gezeichnet.

100. Eurybia Nicaea. Nicaeus Fabr. Syst. Pap. 175. Lamia Cram. 150. C. & Salome 12. G. H.

101. Eur. Halimede Hübn. Lim. subt. Halimede.
102. E. Upis.

2. Verein, Coitus 2.

Hamanumiden, Hamanumidae.

Alle Flügel voll heller und dunkler Fleckgen.

103. Hamanumida Veronica Cram. 325. C. D.
104. H. Meleagris Drur. III. 27. 3. 4. Cram. 66. A. B.
105. H. Allica Eabr. Mant. Pap. 510. Flegyas Cram. 280. E. F.
106. H. Actoria. Actoris Cram. 93. D.
107. H. Thase. Thasus Cram. 333. I.
108. H. Lusia. Ceneus Cram. 156. F.

3. Verein, Coitus 3.

Polystichten, Polystichtes.

Die Schwingen gekrümmt, alle Flügel mit Strichgen bestreut.

109. Polystichtis Cerea. Cereus Linn. Syst. Pap. 273. Fatima Cram. 271. A. B! C. D?
110. P. Zeangira. Zeanger Stoll. 37. 2. 2. B.
111. P. Mandane. Mandana Cram. 271. E. F.
112. P. Lucinda Cram. 1. E. F. Lucindus Fabr. Spec. Pap. 277.

4. Verein, Coitus 4.

Synargen, Synarges.

Alle Flügel vollkommen, mit theils blaß umringten Puncten gezeichnet.

113. Synargis Phyllea. Phylleus Cram. 63. D.
114. S. Orestessa. Orestes Cram. 282. A. B.
115. S. Sorane. Soranus Cram. 353. A. B.

116. Syn. Tytia Cram 121. C. D. Tytius Fabr. Spec. Pap. 240.

117. S. Oditis Odites Cram. 11. E. F.

5. Verein, Coitus 5.

Echenaien, Echenaides.

Beyderley Flügel mit vielen Strichgen im innern Raume, und Puncten am Saume schwarz gezeichnet, unten weißlichgrau gefärbt.

118. Echenais Aria. Arius Cram 31. E.

119. E. Misenessa. Misenes Cram. 117. D.

120. E. Leucophaea.

121. E. Emylia. Emylius. Cram. 66. G. H.

122. E. Luciane. Lucianus Fabr. Ent. Hesp. 185.

123. E. Crispa. Crispus Cram. 118. D. E. F.

124. E. Alphaea. Telephus Cram. 66. E. F. Hübn. Lemon. mac. Alphaea.

125. E. Chia.

6. Verein, Coitus 6.

Hamearien, Hamearides.

Die Flügel beyderley gitterartig schwarz gezeichnet, am Saume mit äugigen Fleckgen geziert.

126. Hamearis Abarissa. Abaris Cram. 93. C.

127. H. Epule. Epulus Cram. 50. C. D. Hübn. Lemon. mac. Epulus.

128. H. Lucina Linn. Syst. Pap. 203. Hübn. Pap. 21. 22.

7. Verein, Coitus 7.

Aphaciten, Aphacites.

Die Schwingen an ihrem Ende mit einem weißen Flecken gezeichnet.

129. Aphacitis Lusca.

130. A. Dyndima Cram. 271 G. H.

Zweyte Familie, Familia B.

Zärtliche, Subtiles.

Die Ohren ziemlich lang, die Flügel sehr zart, aber groß.

1. Verein, Coitus 1.

Thysonoten, Thysonotes.

Beyderley Flügel nur an den Ränden färbig im innern Raum weiß.

131. Thysonotis Danis. Cram. 70. E. F.

132. T. Athemaena. Athemon Linn. Syst Pap. 243. Hübn. Lim. subt. Athemon.

2. Verein, Coitus 2.

Peplien, Pepliae.

Die Flügel beyderley dunkel gesaumt und mit schwarzen Randfleckgen gezeichnet.

133. Peplia Lamis Cram. 355. F. G.

134. P. Caricae Linn. Syst. Pap. 244. Cram. 170. E. Hübn. Lim. subt. Caricae.

135. P. Pelope. Pelops Cram. 170. F.

136. P. Lisimaena. Lisimon Stoll. 39. 1. 1. A.

137. P. Molpe Hübn. Lim. subt. Molpe.

138. P. Damaena. Damon Stoll 35. F. G.

139. P. Menalcis. Menalcus Cram. 390. K.

140. P. Mante. Mantus Cram. 47. F. G.

141. R. Pelidna. Hebrus? Cram. 50. E. F.

142. P. Ariste. Aristus Stoll 39. 4. 4. C.

3. Verein, Coitus 3.

Mesosemien, Mesosemiae.

Die Schwingen mit einem dreyfach weißkernigen, schwarzen Augenfleckgen, im Mitteraum.

143. Mesosemia Icare. Icarus Fabr. Spec. Pap. 556. Philemon Cram. 22. B.
144. M. Hiphia Cram. 92. G.
145. M. Philoclessa. Philocles Linn. Syst. Pap. 240. Cram. 184. D. F.
146. M. Coea. Philocles Cram. 184. F.
147. M. Ultio. Ulrica Cram. 100. E. F. Titea Stoll 5. 6. 6. G. Ulricus, Fabr. Spec. Pap. 572.
148. M. Osinia Cram. 115. F.
149. M. Eumene Cram. 92. F. G.
150. M. Capanea Cram. 236. D.
151. M. Ephyne Cram. 93. E. F.
152. M. Thymete, Cram. 184. G.
153. M. Rosina Cram. 326. B.

4. Verein, Coitus 4.

Chariden, Charides.

Beyderley Flügel mit erzfärbigen Strichen ausgezeichnet.

154. Charis Gyadis. Gyas Cram. 28. F. G. & Acantus 380. K. L.
155. C. Ania. Anius Cr. 92. B. & Cleonus 380. H. I. Avius Fabr. Spec. Pap. 553.

5. Verein, Coitus 5.

Bäoten, Baeotes.

Die Flügel schwarz, gelb bandirt und silbern gesäumt.

156. Baeotis Hisbaena. Hisbon Cram 83. C.
157. B. Uranis. Uranus Cram. 335. C.

6. Verein, Coitus 6.

Emesis, Emeses.

Alle Flügel ganz scharlachroth, schwarz gesäumt.

Zweyte Familie, Familia B.

Zärtliche, Subtiles.

Die Ohren ziemlich lang, die Flügel sehr zart, aber groß.

1. Verein, Coitus 1.

Thysonoten, Thysonotes.

Beyderley Flügel nur an den Ränden färbig im innern Raum weiß.

131. Thysonotis Danis. Cram. 70. E. F.

132. T. Athemaena. Athemon Linn. Syst Pap. 243. Hübn. Lim. subt. Athemon.

2. Verein, Coitus 2.

Peplien, Pepliae.

Die Flügel beyderley dunkel gesaumt und mit schwarzen Randfleckgen gezeichnet.

133. Peplia Lamis Cram. 355. F. G.

134. P. Caricae Linn. Syst. Pap. 244. Cram. 170. E. Hübn. Lim. subt. Caricae.

135. P. Pelope. Pelops Cram. 170. F.

136. P. Lisimaena. Lisimon Stoll. 39. 1. 1. A.

137. P. Molpe Hübn. Lim. subt. Molpe.

138. P. Damaena. Damon Stoll 35. F. G.

139. P. Menalcis. Menalcus Cram. 390. K.

140. P. Mante. Mantus Cram. 47. F. G.

141. R. Pelidna. Hebrus? Cram. 50. E. F.

142. P. Ariste. Aristus Stoll 39. 4. 4. C.

3. Verein, Coitus 3.

Mesosemien, Mesosemiae.

Die Schwingen mit einem dreyfach weißkernigen, schwarzen Augenfleckgen, im Mitteraum.

143. Mesosemia Icare. Icarus Fabr. Spec. Pap. 556. Philemon Cram. 22. B.
144. M. Hiphia Cram. 92. G.
145. M. Philoclessa. Philocles Linn. Syst. Pap. 240. Cram. 184. D. F.
146. M. Coea. Philocles Cram. 184. F.
147. M. Ultio. Ulrica Cram. 100. E. F. Titea Stoll 5. 6. 6. G. Ulricus, Fabr. Spec. Pap. 572.
148. M. Osinia Cram. 115. F.
149. M. Eumene Cram. 92. F. G.
150. M. Capanea Cram. 236. D.
151. M. Ephyne Cram. 93. E. F.
152. M. Thymete, Cram. 184. G.
153. M. Rosina Cram. 326. B.

4. Verein, Coitus 4.

Chariden, Charides.

Beyderley Flügel mit erzfärbigen Strichen ausgezeichnet.

154. Charis Gyadis. Gyas Cram. 28. F. G. & Acantus 380. K. L.
155. C. Ania. Anius Cr. 92. B. & Cleonus 380. H. I. Avius Fabr. Spec. Pap. 553.

5. Verein, Coitus 5.

Bäoten, Baeotes.

Die Flügel schwarz, gelb bandirt und silbern gesäumt.

156. Baeotis Hisbaena. Hisbon Cram 83. C.
157. B. Uranis. Uranus Cram. 335. C.

6. Verein, Coitus 6.

Emesis, Emeses.

Alle Flügel ganz scharlachroth, schwarz gesäumt.

158. Emesis Bombilcar Stoll. 39. 3.

159. E. Pharea. Phareus Cram. 170. C. Hübn. Lim. subt. Pharea.

160. E. Epaphe. Epaphus Cram. 335. D. E.

161. E. Menetis. Menetes Stoll. 30. 4.

3. Familie, Familia C.

Paradiesfische, Paradiseae.

Die Flügel ansehnlich; die Senken aber besonders verlängert.

1. Verein, Coitus 1.

Erycinen, Erycinae.

Die Senken zugespizt, fast geschwänzt.

162. Erycina Perdita. Perditus Fabr. Ent. Hesp. 222. Jarbas Drur. III. 8. 3.

163. E. Lysippe. Lysippus Linn. Syst. Pap. 250. Cram. 380. A.

2. Verein, Coitus 2.

Helicopen, Helicopes.

Die Schwingen stumpf, die Senken sechszackig.

164. Helicopis Cicilia Cram. 159. D. E. & 376. G, H.

3. Verein, Coitus 3.

Hexuropteren, Hexuropterides.

Die Senken ungleich sechszackig, die Zacken schmal aber lang, wie Schwänzchen.

165. Hexuropteris Endymiaena. Endymion Cram. 244. C. D. E. F. Gnidus Fabr. Mant. Pap. 607. Hübn. Rust. arm. Gnidus.

166. H. Cupidina. Cupido Linn. Syst. Pap. 217. Cram. 164. D. E. F. G. Hübn. Rust. arm. Cupido.

4. Verein, Coitus 4.

Ancyluren, Ancylures.

Die Senken breit geschwänzt, der Schwanz auswärts gekrümmt.

167. Ancyluris Tedea Cram. 102. A.
168. A. Pyrete. Pyretus Cram. 144. A. Meliboeus Fabr. Spec. Pap. 65.
169. A. Periandra. Periander Cram. 188. C.

5. Verein, Coitus 5.

Syrmatien, Syrmatiae.

Die Senken sehr lang; auch lang, aber strack geschwänzt.

170. Syrmatia Nyx. Dorilas Cram. 48. C. Hübn. Lim. subt. Nyx.
171. S. Rhete. Rhetus Cram. 63. C.
172. S. Aulestis. Aulestes Cram. 128. G.
173. S. Chorinea. Chorineus Cram. 59. A.

Vierte Familie, Familia D.

Glänzende, Nitidae.

Die Flügel ziemlich gerändet, oben glänzend dunkelfärbig, unten hell.

1. Verein, Coitus 1.

Lycänen, Lycaenae.

Die Senken stumpf geschwänzt, dem Saum nahe mit schwarzen Fleckgen bezeichnet.

174. Lycaena Xenodice. Echerius Stoll. 31. 1. 1. A. B.

2. Verein, Coitus 2.

Euselasien, Euselasiae.

Alle Flügel oben zeichenlos, glatträndig, unten zierlich gezeichnet.

175. Euselasia Crotope. Crotopus Cram. 336. E. F.
176. E. Hygenia. Hygenius Stoll. 9. 2.
177. E. Orsita Cram. 112. D. E. & F.
178. E. Arbassa. Arbas Cram. 379. L. M.
179. E. Tenage. Sabinus Stoll. 9. 3.
180. E. Cynira Cram. 152. D. E.
181. E. Gelaena. Gelon Stoll. 5. 2.
182. E Telecta. Telectus Stoll. 5. 4.

3. Verein, Coitus 3.

Erythien, Erythiae.

Die Senken am Aftereck zähnig geründet.

183. Erythia Labdaca. Labdacus Cram. 336. G. H.
184. E. Gelanoria. Gelanor Cram. 336. C. D.
185. E. Melaphaea.
186. E. Catoleuce.

4. Verein, Coitus 4.

Anatolen, Anatoles.

Die Senken endlich weiß, schwarzfleckig bezeichnet.

187. Anatole Zygia Hübn. Lemon. mac. Zygia.
188. A. Penthea Cram. 143. E. Pentheus Fabr. Spec. Pap. 571.

5. Verein, Coitus 5.

Thisben, Thisbae.

Alle Flügel mit weißen Fleckgen geziert, wovon der größte, in innern Raume, gemeinschäftlich ist.

189. Thisbe Belise Cram. 376. E. F. & Irenea 328. C. D.

6. Verein, Coitus 6.

Pandemonen, Pandemones.

Alle Flügel fast zeichenlos, auf beyden Flächen.

190. Pandemos Placidia Stoll. 28. 4. 4.
191. P. Liberia Cram. 210. G. H. Liberius Fabr. Mant. Pap. 264.
192. P. Arcassa. Arcas Cram. 179. E. F.
193. P. Lagis. Lagus Cram. 117. F. G.

Fünfte Familie, Familia E.

Gröbliche, Agrestes.

Die Flügel ziemlich dick, gemeinförmig; schwarz mit hellfärbigen Flecken.

1. Verein, Coitus 1.

Hesperien, Hesperiae.

Die Senken ziemlich lang, ganz glatt geränder.

194. Hesperia Jaera. Epitus Cram. 270. C.
195. H. Tale. Talus Fabr. Spec Pap. 580. Pygmaeus Cram. 7. C.
196. H. Cingula. Cingulus Stoll. 13. 4.
197. H. Sagaris Cram. 83. D.

2. Verein, Coitus 2.

Melaniden, Melanides.

Die Schwingen lang, die Senken kurz stumpf.

198. Melanis Melandra. Melander Cram. 336. A. B.
199. M. Pherecla. Phereclus Cram. 178. D.
200. M. Agyrte. Agyrtus Cram. 123. B.

3. Verein, Coitus 3.

Symmachien, Symmachiae.

Die Senken kurz, am Aftereck verlängert.

201. Symmachia Ochima. Helius Cram. 198. B.
202. S. Probetrix. Probetor Cram. 390. I.

4. Verein, Coitus 4.

Hyphilarien, Hyphilariae.

Die Flügel alle fast gemeinförmig, schwarz, aber vom Rumpfe aus hellfleckig und am Saume mit Dupfen gezeichnet.

203. Hyphilaria Nicia. Nicias. Stoll. 13. 3.

4. Stamm, Stirps IV.

Lemoniaden, Lemoniades.

Phalerati Linn, Satyri Fabr.

Kennzeichen.

Die Flügel ziemlich gemeinförmig, glatträndig; der Wanst mäßig dick und lang.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Dubiae.

Die Streichler kurz; die Ohren dünnkolbig fast spizig. Beyderley Flügel ziemlich gleichend angelegt und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Amarynthen, Amarynthes.

Die Flügel schwarz, roth bandirt.

204. Amarynthis Menaria Cram. 94. D. E. & Micalia 94. F.

2. Verein, Coitus 2.

Stalachten, Stalachtes.

Alle Flügel mit weißen tropfförmigen Fleckgen bezeichnet.

205. Stalachtis Phlegia Cram. 197. F. & 236. C. Flegeus Fabr. Spec. Pap. 577.
206. S. Euterpe Linn. Syst. Pap. 61. Cram. 246. D.
207. S. Phaedusa Hübn. Zutr. 13. 14.
208. S. Calliope Linn. Syst. Pap. 56. Cram. 246. C. & 133. F. Hübn. Ner. fulv. Calliope.

3. Verein, Coitus 3.

Actinoten, Actinotae.

Die Flügel ziemlich strahlig gestricht.

209. Actinote Thalia Linn. Syst Pep. 67. Cram. 246. A.
210. A. Epaea Cram. 230. B. C.
211. A. Eurita Cram. 233. A. B.
212. A. Amesis Cram. 104. F.

4. Verein, Coitus 4.

Telchinien, Telchiniae.

Die Schwingen lang; beyderley Flügel, vorzüglich aber die Senken, zierlich gesaumt.

213. Telchinia Cephea. Cepheus Linn. Syst Pap. 54. Cram. 298. D. E.
214. T. Saronis. Medea Cram. 81. C. D.
215. T. Bendis. Artemise Stoll. 25. 4. 4. D.
216. T. Mycenaea. Menippe Stoll. 28. 1. 1. A.
217. T. Zetis. Zetes Linn. Syst Pap. 110. Egina Cram. 39. F. G. Stoll. 25. 3.
218. T. Horta Linn. Syst Pap. 54. Cram. 298. F. G.
219. T. Serena Fabr. Syst. Pap. 76. Eponine Cram. 268. A. B. C. D.
220. T. Issoria. Terphichore Cram. 298. A. B. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Ziegelrothe, Latereae.

Die Streichler gemeinförmig; die Ohren kurzkolbig.

Die Schwingen ziemlich mäßig lang.

1. Verein, Coitus 1.

Melitäen, Melitaeae.

Die Flügel ziegelroth gefärbt, strohgelb bandirt und mit schwarzen Linien inzwischen gezeichnet.

221. Melitaea Phaëtaena. Phaëton Fabr. Syst. Pap. 167. Cram. 193. C. D.

222. M. Agrotera Bergst. 75. 3. 4. Hübn. Pap. 1. 2.

223. M. Maturna Linn. Syst Pap. 204. Hübn. Pap. 598—601.

224. M. Cynthia Schiff. Verz. Pap. L. 3. Hübn. Pap. 3. 569. 570.

225. M. Artemis Schiff. Verz. Pap. L. 10. Hübn. Pap. 4. 5. 6.

2. Verein, Coitus 2.

Schönіden, Schoenides.

Die Zeichnungen der Flügel alle einigermaßen unterbrochen.

226. Schoenis Delia Schiff. Verz. Pap. L. 6. Hübn. Pap. 7. 8.

227. S. Cinxia Linn. Syst. Pap. 206. Hübn. Pap. 9. 10. 11. 12. Trivia Schiff. Verz. Pap. L. 8.

Dritte Familie, Familia C.

Scheckige, Variegatae.

Die Flügel fast gitterartig zusammenhängend gefleckt und kettenähnlich gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Byblien, Bybliae.

Die Senken unten nezförmig zusammenhängend gezeichnet.

228. Byblia Ilithya Cram. 213. A. B. 214. C. D. & Polinice 375. G. H. Ilithuia Fabr. Spec. Pap. 427.

2. Verein, Coitus 2.

Cinclidien, Cinclidiae.

Beyderley Flügel ziemlich gitterartig gezeichnet.

229. Cinclidia Phoebe Schiff. Verz. Pap. L. 1. Paedotrophus Bergst. Nom. 75. 5. 6. Corythalia Esp. Pap. 61. 4. 5. Hübn. Pap. 13. 14.

230. C. Athalia Esp. Pap. 47. 1. Maturna Schiff. Verz. Pap. L. 2. Hübn. Pap. 17. 18. 19. 20.

231. C. Orthia. Dictynna Esp. Pap. 48. 2. Hübn. Pap. 15. 16.

5. Stamm, Stirps V.

Dryaden, Dryades.

Phalerati Linn. Satyri Fabr.

Kennzeichen.

Die Ohren sehr kurzkolbig, fast laffenförmig. Die Flügel oben mit schwarzen Zeichen, auf ockerfärbigem Grunde, unten blaß und färbig gefleckt.

Erste Familie, Familia A.

Gegitterte, Reticulatae.

Die Flügel oben gitterartig gestreift. Die Senken unten färbig gefleckt, auf blaßgelbem Grunde, und mit augenähnlichen Puncten gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Phicioden, Phiciodae.

Beyderley Flügel oben bandweiße gefleckt, unten sehr zart gezeichnet.

232. Phyciodes Cocyta Cram. 101. A. B. C. & Tharos 169. E. F. Hübn. Dry. ret. Gorgone.

233. P. Liriope Cram. 1. C. D. Hübn. Dry. ret. Liriope.

2. Verein, Coitus 2.

Brenthiden, Brenthides.

Die Senken unten bunt gewölkt, matt gefleckt.

234. Brenthis Hecate Schiff. Verz. Pap. L. 4. Hübn. Pap. 43. 44.

235. B. Dictynna Schiff. Verz. Pap. L. 5. Hüb. Pap. 40. 41.

236. B. Thore Hübn. Pap. 571 — 573.

237. B. Daphne Schiff. Verz. Pap. K 10. Hübn. Pap. 45. 46.

238. B. Claudia Cram. 69. E. F. Hübn. Dry. fuc. Claudia.

Zweyte Familie, Familia B.

Phaleraten, Phaleratae.

Die Flügel unterschiedlich gefleckt, unten mit muschelfärbigen Flecken inzwischen geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Argynniden, Argynnides.

Die Senken unten buntfärbig, glänzend weiß gefleckt.

239. ArgynnisAphirape Hübn. Pap. 23 — 25. Offianus & Tomyris Herbst. 270. 4. — 7. Eunomia. Esp. Pap. 110. 5.

240. A. Selene Schiff. Verz. K. 11. Hübn. Pap. 26. 27.

241. A. Euphrosyne Linn. Syst. Pap. 214. Hübn. Pap. 28 — 30.

242. A. Freija Beckl. Diss. II. 14. Hübn. Pap. 55. 56.

243. A. Myrina Cram. 189. B. C.

244. A. Napaea. Isis. Hübn. Pap. 38. 39.

245. A. Pales Schiff. Verz. Pap. K. 8. Hübn. 34 — 37.

246. A. Frigga Beckl. Diss. II. 33. Hübn. Pap. 49. 50.

247. A. Amathusia Fabr. Mant. Pap. 580. Hübn. Pap. 51 — 54.

248. A. Dia Linn. Syst. Pap. 207. Hübn. Pap. 32. 33.

2. Verein, Coitus 2.

Issorien, Issoriae.

Die Flügel, vorzüglich die Senken, fast eckig; unten mit augenähnlichen Zeichen bemerkt.

249. Issoria Egista Cram. 281. C. D.

250. I. Anticlia. Laodice Cram. 157. E. F.

251. I. Lathonia Linn. Syst. Pap. 213. Hübn. Pap. 59.60.

3. Verein, Coitus 3.

Acidalien, Acidaliae.

Gemeinförmig; die Senken unten perlglänzend weiß fleckig, auf grünlichbraunem Grunde.

252. Acidalia Cybele Fabr. Syst. Pap. 311. Daphnis Cram. 57. E F. Idalia 44. A. — D. & Diana 98. D. E.

253. A. Aglaja Linn. Syst. Pap. 211. Hübn. Pap. 65. 66.

254. A. Adippe Linn. Syst. Pap. 212. Hübn. Pap. 63. 64.

255. A. Niobe Linn. Syst. Pap. 215. Hühn. Pap. 61. 62.

256. A. Niphe Linn. Syst. Pap. 308. Cram. 14. C. — E.

4. Verein, Coitus 4.

Dionen, Dionae.

Die Schwingen lang und schief, die Senken fast stumpf und gekerbt, beyderley unter silbern fleckig.

257. Dione Vanillae Linn. Syst. Pap. 216. Cram. 212. A. B. Hübn. Dry. phal. Vanillae. Passiflorae. Fabr. Fnt. Pap. 189.

258. D. Juno Cram. 215. B. C.

5. Verein, Coitus 5.

Colänen, Colaenes.

Die Schwingen lang, die Senken kurz; beyderley streifig; unten fast zierlos; die Senken an der Wurze weiß gezeichnet.

259. Colaenis Julia Fabr. Syst. Pap. 281. Alcionea Cram. 215. A.

260. C. Delila Fabr. Syst. Pap. 284. Cillene Cram. 215. D. E.

261. C. Lybia Fabr. Syst. Pap. 73. Hypsipyle Cram. 177. C. D.

262. C. Mereaui.

6. Verein, Coitus 6.

Argyronomen, Argyronomae.

Die Flügel ziemlich groß; unten glänzend wässerig gestreift.

263. Argyronome Lampetia Linn. Syst. Pap. 160. Cram. Alcippe 389. G. H. & 148. D. D.

264. A. Columbina Cram. 337. D. E. & 238. A. B.

265. A. Laodice Pall. Iter. I. 61. Cethosia Fabr. Ent. Pap. 440. Hübn. Pap. 67. 68.

266. A. Paphia Linn. Syst. Pap. 209. Hübn. Pap. 69. 70.

267. A. Pandora Schiff. Verz. Pap. K. 1. Maja Cram, 25. C. D. Cynara Fabr. Spec. Pap. 473.

268. A. Orthosia. Metea Stoll. 25. 2. 2. B.

6. Stamm, Stirps VI.

Hamadryaden, Hamadryades.

Nymphales Linn. & Fabr.

Die Flügel eckig, die Senken mit einer Hülle worinn der Wanst liegt versehen.

Erste Familie, Familia A.

Zierliche, Decorae.

Die Schwingen fast eckig, die Senken nur zähnig; beyderley sehr buntscheckig.

1. Verein, Coitus 1.

Vanessen, Vanessae.

Die Flügel oben großfleckig marmorirt, unten mit Pfauenspiegeln geziert.

269. Vanessa Hunteri, Fabr. Syst. Pap. 240. Iole Cram. 12. E. F.

270. V. Carye Hübn. Hamad. dec. Carye.

271. V. Cardui Linn. Syst. Pap. 154. Hübn. Pap. 73. 74.

2. Verein, Coitus 2.

Pyrameiden, Pyrameides.

Die Flügel oben roth bandirt unten pfauenschwanzartig gezeichnet.

272. Pyrameis Calliroë Hübn. Hamad. dec. Calliroë.

273. P. Atalanta Linn. Syst. Pap. 157. Hübn. Pap. 75. 76.

Zweyte Familie, Familia B.

Einfache, Simplices.

Die Schwingen eckig, die Senken kerbig; beyderley breit gesäumt.

1. Verein, Coitus 1.

Precen, Preces.

Die Flügel theils marmorfleckig, und mit einer Reihe Puncten bezeichnet.

274. Precis Octavia Cram. 135. B. C.

275. P. Dryope Cram. 178. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Anartien, Anartiae.

Die Senken ungleich, am hintern Theile sehr merklich verlängert.

276. Anartia Arsinoë Cram. 160. B. C. Juliana 280. A. B.

277. A. Jatrophae Linn. Syst. Pap. 172. Cram. 202. E. F.

278. A. Amathea Linn. Syst. Pap. 174. Cram. 209. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Temenen, Temenes.

Alle Flügel mit einer ganzen Reihe zierlicher Augen bezeichnet.

279. Temenis Arcadia Cram. 116. E. F. Minerva Fabr. Spec. 327.

280. T. Merione Fabr. Spec. Pap. 411. Laothoe Cram. 132. A. B. & Ariadne 180. E. F.

281. T. Erigone Cram. 62. E. F.

282. T. Hedonia Linn. Syst. Pap. 153. Cram. 69. C. D. & 374. E. F.

283. T. Laomedia Linn. Syst. Pap. 145. Cram. 8. F. G.

4. Verein, Coitus 4.

Junonien, Junoniae.

Die Senken ansehnlicher mit augenähnlichen Flecken bezeichnet und heller gefärbt als die Schwingen.

284. Junonia Aonis Linn. Syst. Pap. 134. Cram. 35. D. E. F. Lemonias Sulz. 16. 7. 11.

285. J. Lavinia Cram. 21. C. D. & Evarete 203. C. D.

286. J. Orithya Linn. Syst. Pap. 137. Genoveva Cram. 290. C. D. & Orithya 281. E. F.

287. J. Ocyale. Orithya Cram. 290. A. B. & 32. E. F. Roes. Ins. IV. 6. 2.

288. J. Isocratia. Orithya Cram. 19. C. D.

289. J. Clelia Cram. 21. E. F.

290. J. Lotis Sulz. 16. 6. Erymanthis Cram. 238. F. G.

291. J. Oenone Linn. Syst. Pap. 135. Cram. 35. A. B. C.

5. Verein, Coitus 5.

Alcyoniden, Alcyoneides.

Die Schwingen nnd Senken spitzeckig, und mit ansehnlichen Pfauenspiegeln besezt.

292. Alcyoneis Asterie Linn. Syst. Pap. 133. Cram. 58. D. E.
293. A. Almane. Almana Linn. Syst. Pap. 132. Cram. 58. F. G.

Dritte Familie, Familia C.

Trügliche, Fallaces.

Die Schwingen am Ende eckig, die Senken am Aftereck spitzig verlängert.

1. Verein, Coitus 1.

Apaturen, Apaturae.

Die Flügel beyderley gemeinschaftlich mit einer schiefen Linie bezeichnet.

294. Apatura Bisaltide Cram. 102. C. D.
295. A. Tragia. Ida Cram. 42. D. & 374. C. D.
296. A. Terea Cram. 138. E. F.
297. A. Leodice Cram. 138. G. H.
298. A. Itys Cram. 119. F. G.
299. A. Egesta Cram. 46. B. C.
300. A. Iphita Cram. 209. C. D.
301. A. Sabina Cram. 289. A. — D.
302. A. Cloanthe Cram. 338. A B.
303. A. Jucunda Hübn. Hamad. und. Jucunda.
304. A. Archesia Cram 219. D. E.
305. A. Pelarga Stoll. 27. 2. 2. A.

2. Verein, Coitus 2.

Historiden, Historides.

Die Schwingen fast sichelförmig, die Senken kurz.

306. Historis Odia. Odius Fabr. Syst. Pap. 60. & Orion 185. Cram. 84. A. B. Hübn. Hamad. und. Odius.
307. H. Marthesia Cram. 191. A. B. Marthesius Fabr. Spec. Pap. 264.

Vierte Familie, Familia D.

Scharfeckige, Angulatae.

Beyderley Flügel scharfeckig, oben fleckig und bordirt, unten düstern wässerig gezeichnet.

1. Verein, Coitus.

Athenen, Athenae.

Die Flügel an ihren Ecken ausschweifend verlängert, und streifig gezeichnet.

308. Athena Thetis Fabr. Spec. Pap. 385. Sulz. Gesch. 13. 4. Petreus Cram. 87. D. E.

2. Verein, Coitus 2.

Polygonien, Polygoniae.

Beyderley Flügel mit vielen theils zackigen Ecken, die Schwingen unten auch mit einem weißen Zeichen ausgezeichnet.

309. Polygonia Triangulum Fabr. Ent. 381. Egea Cram. 78. C. D.

310. P. C aureum Linn. Syst. Pap. 169. Cram. 19. E. F.

311. P. Progne Cram. 5. E. F.

312. P. C album Linn. Syt. Pap. 168. Hübn. Pap. 92. 93. 637. 638. F album Esp. 87. 1.

313. P. I album Esp. Pap. 95. 4. & V album 52. 1. Hübn. 90. 91.

3. Verein, Coitus 3.

Eugonien, Eugoniae.

Beyderley Flügel mit einem gewöhnlichen Eck, und einer Saumborde ausgezeichnet.

314. Eugonia Angelica Cram. 388. G. H.

315. E. Polynice Cram. 195. D. E.

316. E. V album Schiff. Verz. Pap. I. 7. L album Esp. Pap. 62. 3. Hübn. Pap. 83. 84.

317. E. Polychloros Linn. Syst. Pap. 166. Hübn. Pap. 81. 82. Xanthomelas Schiff. Verz. Pap. 1. 6?

318. E. Pyrrhomelaena. Xanthomelas Esp. Pap. 63. 4. Hübn. Pap. 85. 86. Polychloros Cram. 389. C.D.

319. E. Urticae Linn. Syst. Pap. 167. Hübn. Pap. 87. 88.

320. E. Charonia Drur. I. 15. 1. 2. Cram. 47. A. B. C.

321. E. Antiopa Linn. Syst. Pap. 165. Hübn. Pap. 79. 80.

4. Verein, Coitus 4.

Inachen, Inaches.

Die Flügel beyderley, vorzüglich die Schwingen, mit einem großen buntfärbigen pfauenspiegelähnlichen Fleck geziert.

322. Inachis Jö Linn. Syst. Pap. 131. Hübn. Pap. 77. 78.

5. Verein, Coitus 5.

Elymniaden, Elymniades.

Die Schwingen ziemlich stumpf, mit einem vorragenden Zahn, die Senken kaum eckiggekerbt.

323. Elymnias Protogenia Cram. 189. F. G.

324. E. Jynx Hübn. Zutr. 37. 38.

325. E. Undularis Drur. II. 10. 1. 2. Cram. 256. A. B.

326. E. Lais Cram. 110. A. B.

327. E. Enothrea Cram. 236. A. B.

328. E. Ariadne Linn. Syst. Pap. 170. Coryta Cram. 86. E. F. & Merope 144. E. G. H.

6. Verein, Coitus 6.

Araschnien, Araschniae.

Alle Flügel unten spinnennetzförmig weiß gezeichnet.

329. Araschnia Levana Linn. Syst. Pap. 201. Hübn. Pap. 97. 98.

330. A. Prorsa Linn. Syst. Pap. 202. Hübn. Pap. 94 — 96.

7. Stamm, Stirps 7.

Najaden, Najades.

Phalerati Linn. Satyri Fabr.

Die Ohren ziemlich keulenförmig. Die Flügel oben düster unten hell färbig, allenthalben fleckig bandirt.

Erste Familie, Familia A.

Bescheidene, Modestae.

Die Senken fast geeckt, hell und dunkel gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Jaeren, Jaerae.

Die Flügel fast nezförmig gezeichnet.

331. Jaera Opis Cram. 138. A. B.

332. J. Afra. Afer Stoll. 27. 3. 3. B.

333. J. Crithea Cram. 138. C. D.

2. Verein, Coitus 2.

Callianiren, Callianirae.

Alle Flügel zierlich gelb gefleckt und bandirt.

334. Callianira Ephestiaena. Ephestion Stoll. 25. 1. 1. A. Hübn. Naj. turb. Ephestion.

3. Verein, Coitus 3.

Parthenen, Partheni.

Die Schwingen durchsichtig gefleckt, die Senken fast strahlig bezeichnet.

335. Parthenos Sylvia Cram. 43. F. G.

Zweite Familie, Familia B.

Muntere, Alacres.

Die Schwingen ansehnlich, die Senken mäßig groß, beyderley ziemlich gemeinförmig.

1. Verein, Coitus 1.

Cymothoen, Cymothoae.

Beyderley Flügel auswärts zackig bezeichnet.

336. Cymothoë Amphicede Cram. 146. D. E.
337. C. Althea Cram. 89. E. F.
338. C. Aconthea Cram. 134. D — G. Melissa Fabr. Spec. 458.

2. Verein, Coitus 2.

Euxanthen, Euxanthae.

Beyderley Flügel auf unterschiedene Arten weiß gefleckt.

339. Euxanthe Eurinome Cram. 70. A.

3. Verein, Coitus. 3.

Panopäen, Panopeae.

Die Senken an ihrer Wurze mit vielen dunklen Fleckgen bezeichnet.

340. Panopea Semire Cram. 194. B. C.
341. P. Lucretia Cram. 45. C. D.

4. Verein, Coitus 4.

Euphädren, Euphaedrae.

Die Flügel trüblichbunt, aber glänzend gefärbt, und schwarz gefleckelt.

342. Euphaedra Themis. Hübn. Naj. hil. Themis.
343. E. Cyparissa Cram. 39. D. E. & 156. B.
344. E. Ceres Fabr. Syst. Pap. 257. Lucille Cram. 156. A. C. & Medon 205. C. D.

5. Verein, Coitus 5.

Symphädren, Symphaedrae.

Die Senken unten mit hell färbigen, schwarz umfaßten Fleckgen ausgezeichnet.

345. Symphaedra Aerope. Aeropus Linn Syst. Pap. 128. Cram. 111. F. G. & 254. A. B.

346. S. Alcandra. Hübn. Zutr. 1. 2.

347. S. Evelina Stoll. 28. 2. 2. B.

348. S. Lysandra Stoll. 29. 3. 3. C.

Dritte Familie, Familia C.

Fröhliche, Hilares.

Die Flügel oben dunkelfärbig, mit hellfärbigen Bändern.

1. Verein, Coitus 1.

Catonephelen, Catonephelae.

Unten wolkig an beyderley Flügeln, vorzüglich an den Senken.

349. Catonephele Eupalemaena Eupalemon Cram. 143. B. C. Antiochus Fabr. Syst. Pap. 164.

350. C. Numilia Cram. 81. E. F. Numilius Fabr. Spec. Pap. 252.

351. C. Cupavia Cram. 193. E. F. Fabr. Spec. Pap. 263.

352. C. Chione Cram. 90. E. F. Medea Fabr. Syst. 273.

2. Verein, Coitus 2.

Tigridien, Tigridiae.

Die Senken am Aftereck verlängert, alle Flügel unten tigerstriemig.

353. Tigridia Aceste Linn. Syst. Pap. 191. Cram. 121. E. F.

354. T. Dirce Linn. Syst. Pap. 171. Cram. 212. C. D. Hübn. Naj. hil Dirce.

355. T. Zingha Cram. 315. B. C. Berenice Fabr. Mant. Pap. 471.

3. Verein, Coitus 3.

Dynaminen, Dynaminae.

Die Flügel unten weiß bandirt, die Senken mit zwey augenähnlichen Fleckgen ausgezeichnet.

356. Dynamine Postuerta Cram. 254. C. D.

357. D. Mylitta Cram. 253. D. E.

4. Verein, Coitus 4.

Euthalien, Euthaliae.

Die Flügel düster färbig, weiß und roth fleckig.

358. Euthalia Lubentina Cram. 155. C. D.

359. E. Adonia Cram. 255. C. D.

5. Verein, Coitus 5.

Neſſäen, Nessaeae.

Beyderley Flügel unten grün.

360. Nessaea Ancaea Linn. Syst. Pap. 184. Obrinus 113. Cram. 338. C. D. & 49. E. F. Hübn. Naj. hil. Obrina.

361. N. Harpalyce Cram. 145. D. E. Eupalus Fabr. Spec. Pap. 241.

362. N. Galanthis Cram. 25. D. E.

6. Verein, Coitus 6.

Callicoren, Callicorae.

Die Flügel oben glänzend färbig bandirt; die Senken unten mit kreisweiſen Streifen weiß gezeichnet.

363. Callicore Astarte Cram. 256. D. E.

364. C. Clymena Cram. 24. E. F. Clymenus Fabr. Spec. Pap. 232.

7. Verein, Coitus 7.

Ageronien, Ageroniae.

Alle Flügel sehr bunt fleckig; die Senken mit einer Reihe fast augenähnlicher Fleckgen inzwischen ausgezeichnet.

365. Ageronia Amphinome Linn. Syst. Pap. 176. Cram. 54. E. F. Hübn. Hamad. dec. Amphinome.

366. A. Laodamia Cram. 130. A. &. Arethuse 77. E. F. Arethusus Fabr. Spec. 231.

367. A Feronia Linn. Syst. Pap. 140. Cram. 362. A. B. & 192. E. F. Hübn. Hamad. dec. Feronia.

368. A. Chloë Stoll. 5. 1. 1. A.

Vierte Familie, Familia D.
Gemäßigte, Moderatae.

Alle Flügel braun gefärbt und zierlich weiß gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.
Adelphen, Adelphae.

Die Schwingen gelb gefleckt, gemeinschäftlich mit den Senken schiefstreifig.

369. Adelpha Mesentina Cram. 162. A. B. Mesenteria Fabr. Spec. Pap. 462.

370. A. Basilis. Basilea Cram. 188. D.

371. A. Iphicla Linn. Syst. Pap. 181. Cram. 188. E. F.

372. A. Plesaure.

373. A. Cocala Cram. 242. F. G.

374. A. Elea Linn. Syst. Pap. 183. Cram. 242. D. E.

375. A. Cytherea Linn. Syst. Pap. 210. Cram. 376. C. D. Hübn. Naj. mod. Cytherea.

376. A. Phliase. Phliasus Cram. 192. A. B.

2. Verein, Coitus 2.
Neptен, Neptes.

Die Flügel gelb und weiß bandirt und gefleckt.

377. Neptis Nauplia Linn. Syst. Pap. 197. Cram. 316. D — G.

378. N. Emilia Cram. 223. E. F.

3. Verein, Coitus 3.

Pyrrhogyren, Pyrrhogyrae.

Beyderley Flügel mit großen roth begrenzten weißen Flecken ausgezeichnet.

379. Pyrrhogyra Tipha Linn. Syst. Pap. 164. Cram. 8. D. E.

380. P. Neaerea Linn. Syst. Pap. 190. Cram. 75. C. D.

4. Verein, Coitus 4.

Metamorphen, Metamorphae.

Die Flügel sehr verformt, mit grünlichen Flecken zierlich angelegt.

381. Metamorpha Elissa. Sulpitia Cram. 328. A. B.

382. M. Sthenele. Stehnelus Linn. Syst. Pap. 30. Cram. 79. A. B. Hübn. Naj. mod. Stelenes.

383. M. Dido Linn. Syst. Pap. 192. Cram. 79. A. B. Hübn. Ner. vir. Dido.

5. Verein, Coitus 5.

Symbrenthien, Symbrenthiae.

Die Flügel verworren bezeichnet; die Senken unten geschminkt.

384. Symbrenthia Hippocle. Hippoclus Cram. 220. C. D. &. Lucina 330. E. F.

Fünfte Familie, Familia E.

Traurende, Luctantes.

Alle Flügel gemeinförmig, schwarzbraun gefärbt, blaß bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Pantoporien, Pantoporiae.

Die Flügel ganz ocker gelb bandirt.

385. Pantoporia Phaerusa Linn. Syst. Pap. 180. Cram. 130. C. D.

386. P. Nefte Cram. 256. E. F.

387. P. Hordonia Stoll. 33. 4. 4. D.

388. P. Mardania Cram. 213. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Accen, Accae.

Die Flügel unterbrochen weiß bandirt.

389. Acca Blandina Cram. 327. E. F. Melicerta Fabr. Mant. Pap. 513.

390. A. Agatha Cram. 327. A.B. Melic.Fabr.Ent.Pap.762.

391. A. Columena. Columella Cram. 296. A. B.

392. A. Matuta. Leucothoë Cram. 296. E. F.

393. A. Aceris Esp. Pap. 81. 3. 4. Plautilla Hübn. Pap. 99. 100.

394. A. Lucilla Schiff. Verz. Pap. H. 4. Coenobita Cram. 296. C. D. Hübn. Pap. 101. 102.

395. A. Venilia Linn. Syst. Pap. 177. Cram 219. B. C.

396. A. Heliodora Cram. 212. E. F.

397. A. Leucothoë Linn. Syst. Pap. 179. Erosine Cram. 203. E. F. Hübn. Naj. mod. Erosine.

398. A. Ophione Cram. 114. E. F.

399. A. Valentina Cram. 327. C. D.

400. A. Sulpitia Cram. 214. E. F.

401. A. Hera Cram. 253. F. G.

3. Verein, Coitus 3.

Limeniten, Limenites.

Die Flügel unten theils blau gefärbt, die Bänder fast in Flecken zertheilt.

402. Limenitis Sibylla Linn. Syst. Pap. 187. Hübn. Pap. 103 — 105.

403. L. Camilla Schiff. Verz. Pap. H. 3, Hübn. Pap. 106. 107.

404. L. Populi Linn. Syst. Pap. 164. Hübn. Pap. 108 — 110.

405. L. Procris Cram. 106. E.F.

Sechste Familie, Familia F.

Verwirrte, Turbidae.

Die Schwingen am Senenrand weiß sprenglig; die Senken nahe dem Saumrande mit weißen Puncten gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Hypolimnaden, Hypolimnades.

Die Schwingen weiß gefleckt, die Senken blaß bandirt.

406. Hipolimnas Antilope Cram. 183. E.F.

407. H. Velleda Cram. 349. C.D.

408. H. Eriphile Cram. 376. A.D.

409. H. Perimele Cram. 65. C.D. & 67. B.

410. H. Alimena Linn. Syst. Pap. 178. Cram. 221. A.B.C.

411. H. Pipleis Linn. Syst. Pap. 159. Calisto Cram. 24. A.B. & 60. A.B. Hübn. Naj. turb. Pipleis.

412. H. Manilia Cram. 255. A.B.

413. H. Porphyria Cram. 255. E.F.

414. H. Antigone Cram. 67. C.

415. H. Alcmene Cram. 67. A.

416. H. Iphigenia Cram. 67. D.E.

2. Verein, Coitus 2.

Esoptrien, Esoptria.

Alle Flügel mit einem weißen blaurändigen Spiegelfleck geziert.

417. Esoptria Alcithoë Cram. 80. A.B. Auge 190. A.B. & Lisianassa 205. A.B. Liria Fabr. Ent. Pap. 385. & Lasinassa 386. Hübn. Naj. mod. Alcithoë.

418. E. Bolina Linn. Syst. Pap. 188. Cram. 65. E.F.

Siebente Familie, Familia G.

Uibermüthige, Arrogantes.

Die Senken langzähnig; alle Flügel voll zierlicher Fleckgen und Streifen.

1. Verein, Coitus 1.

Alazonien, Alazoniae.

Die Schwingen gegen ihr Ende schief weiß bandirt.

419. Alazonia Cydippe Linn. Syst. Pap. 163 Ino Cram. 62. A.B.

420. A. Penthesilea Cram. 145. B.C.

421. A. Symbiblis. Biblis Cram. 175. A.B. & Cyane 295. G.D.

8. Stamm, Stirps VIII.

Potamiden, Potamides.

Equites Linn. Nymphales Fabr.

Der Leib ziemlich dick, die Ohren keulenförmig, die Flügel stark und ansehnlich.

Erste Familie, Familia A.

Geschwänzte, Caudatae.

Die Senken auffallend gezähnt, und die Zähne theils schwanzförmig verlängert.

1. Verein, Coitus 1.

Eriböen, Eriboeae.

Zwey vorzüglich lange und spitzige Zähne an den Senken.

422. Eriboea Bruta. Brutus Cram. 241. E.F.

423. E. Unedonis. Jasius Linn. Syst. Pap. 26. Hübn. Pap. 111. 112. 580. 581.
424. E. Pelopia. Pelias Cram. 3. C. D.
425. E. Lucretia. Lucretius Cram. 82. E. F.
426. E. Castoris. Castor Cram. 37. C. D.
427. E. Pollussa. Polux Cram. 37. C. D.
428. E. Aile. Ailus Cram. 317. A. B.
429. E. Tiridatis. Tiridates Cram. 161. A. B.
430. E. Athamis. Athamas Cram. 89. C. D.
431. E. Etheoclessa. Etheocles Cram. 119. D. E.
432. E. Thyestessa. Thyestes Stoll. 32. 2. 2. B.
433. E. Pyrrichia. Pyrrhus Linn. Syts. Pap. 25. Cram. 220. A. B.
434. E. Xypharis Xyphares Cram. 377. A. B.
435. E. Euriale. Eurialus Cram. 74. A. B.

2. Verein, Coitus 2.

Marpesien, Marpesiae.

Die Senken nur einmal, an der Hälfte, geschwänzt, aber am Aftereck noch lappig verlängert.

436. Marpesia Thyonnea. Thyonneus Cram. 220. E. F.
437. M. Eleuchea.
438. M. Zosteria. Jole Stoll. 29. 4. 4. D.
439. M. Chironias. Chiron Fabr. Marius Stoll. 30. 1. 1. A. Syst. Pap. 40.
440. M. Cinna Cram. 200. F. G. Orsilochus Fabr. Spec. Pap. 48.

3. Verein, Coitus 3.

Pallen, Pallae.

Die Senken am Aftereck gemeinförmig, aber an der Hälfte doch geschwänzt.

441. Palla Decia. Decius Cram. 114. B. C.

4. Verein, Coitus 4.

Coen, Coeae.

Die Senken geschwänzt, alle Flügel oben vom Rumpfe aus hellfärbig.

442. Coea Varanessa. Varanes Cram. 160. D. E. & 388. A. B.

443. C. Acheronta Fabr. Spec. Pap. 383. Cadmus Cram. 22. A. B.

444. C. Pherecydis Cram. 330. A. B.

5. Verein, Coitus 5.

Anäen, Anaeae.

Die Flügel unten trüb gewässert und bey dem Schwanze mit etlichen Puncten bezeichnet.

445. Anaea Troglodita Fabr. Syst. Pap. 250. Astinax Cram. 337. A. B. Hübn. Hamad. und. Astina.

446. A. Laërtias. Laertes Cram. 73. C. D.

447. A. Leonida Cram. 383. C — F.

448. A. Riphea Cram. 48. G. H.

449. A. Acidalia. Arachne Cram. 48. A. B.

Zweyte Familie, Familia B.

Stolze, Superbae.

Alle Flügel ziemlich gemeinförmig, nur am Aftereck die Senken fast lappig verlängert.

1. Verein, Coitus 1.

Memphen, Memphes.

Die Schwingen aussen unförmlich breit; die Senken kaum merklich verlängert.

450. Memphis Odilia Cram. 329. C. D.

451. M. Basilia Cram. 329. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Zaretiden, Zaretides.

Die Schwingen am Eck sonderlich verbreitet; die Senken aber geschnäbelt.

452. Zaretis Isidora Cram 235. E.F. & A.B.
453. Z. Polybete Cram. 235. C.D. &. 234. C.D.

3. Verein, Coitus 3.

Morphonen, Morphones.

Alle Glieder sehr dicklich; die Flügel anbey ziemlich gemeinförmig, oben schwarz, glänzend blau bandirt, unten grauschattig marmorirt.

454. Morpho Omphale. Demophon Cram. 158. E. Hübn. Pot. sup. Laërtes.
455. M. Demophaena. Pheridamas Cram. 158. A. B. Demophon Linn. Syst. Pap. 47?
456. M. Sysiphe. Sysiphus Cram. 158. C. Hübn. Pot. sup. Thalpius.
457. M. Amphimache. Amphimachus Fabr. Syst. Pap. 59. Meander Cram. 12. A. B. & Licomedes 158. D.
458. M. Antimache. Amphimachus Sulz. Gesc. 14. 2. 3. Hübn. Pot. sup. Demophoon.

4. Verein, Coitus 4.

Doxocopen, Doxocopae.

Die Flügel blauschillernd aus düsterbraunem Grunde, und mit einzelnen augenähnlichen Fleckgen geziert.

459. Doxocopa Erminea Cram. 196. A. B. & 241. A. B.
460. D. Iris. Linn. Syst. Pap. 161. Hübn. Pap. 117. 118. 504.
461. D. Ilia Schiff. Verz. Pap. G. 2. Hübn. Pap. 115. 116.
462. D. Agathina Cram. 167. E. F.

463. Doxocopa Astasia. Clytie Schiff. Verz. Pap. 321. Hübn. Pap. 113. 114.

464. D. Epilais. Polyxena Cram. 54. A. B.

Dritte Familie, Familia C.

Ansehnliche, Conspicuae.

Der Körper zwar gering, aber die Flügel sehr ansehnlich.

1. Verein, Coitus 1.

Megameden, Megamedae.

Die Senken sehr lang aber fast sichelförmig ausgebuchtet.

465. Megamede Rhetenoris. Rhetenor Cram. 15. A. B.

466. M. Chalciope. Andromachus Cram. 56. A. B.

2. Verein, Coitus 2.

Brassoliden, Brassolides.

Die Flügel oben bräunlichschwarz, ockergelb bandirt, unten die Senken weißlichgrau gemengt und blaß geäugt.

467. Brassolis Anaxarete Cram. 95. A. B. & 374. A. B. Hübn. Pot. sup. Anaxarete.

468. B. Sophorae Linn. Syst. Pap. 121. Cram. 253. C. & A. B.

469. B. Berecynthia Cram. 184. B. C. Hübn. Pot. sup. Berecynthia.

470. B. Xanthis. Xanthus Linn. Syst. Pap. 122.

471. B. Cassiae Linn. Syst. Pap. 120. Cram. 106. A. & 105. A. B. Hübn. Pot. sup. Cassiae.

472. B. Cassiope Cram. 57. A. B.

473. B. Quiteria Cram. 313. A. — D. Xanthus Fabr. Mant. Pap. 296.

474. B. Invirae. Hübn. Pot. sup. Invirae.

3. Verein, Coitus 3.

Bien, Biae.

Die Senken am Aftereck fast geschwänzt; die Augenflecke undeutlich.

475. Bia Actoriaena. Actorion Linn. Syst. Pap. 26. Cram. 49. C. D. Sulz. Gesc. 19. 3. 4.

4. Verein, Coitus 4.

Mören, Moerae.

Die Senken verlängert und mit zwey augenähnlichen Flecken bezeichnet.

476. Moera Aurelia. Aurelius Cram. 168. A. B.

477. M. Phidippe. Phidippus Cram. 69. A. B.

478. M. Adonidis. Adonis Cram. 61. A. B.

479. M. Tullia Cram. 81. A. B.

480. M. Celinde Stoll. 37. 1. 1. A.

481. M. Automedaena. Automedon Cram. 41. A. B. & 389. A. B.

5. Verein, Coitus 5.

Caliginen, Caligines.

Die Flügel beyderley sehr groß, besonders aber die Senken verlängert und mit einem großen Augenfleck geziert.

482. Caligo Teucra. Teucer Linn. Syst. Pap. 44. Cram. 51. A. B.

473. C. Idomenea. Idomeneus Linn. Syst. Pap. 45. Cram. 52. B. & 390. A.

484. C. Euriloche. Eurilochus Cram. 33. A. & 34. A.

485. C. Illionea. Illioneus Cram. 52. A. Hübn. Pot. consp. Teucer.

6. Verein, Coitus 6.

Leonten, Leontae.

Die Senken größer als die Schwingen; beyderley mit etlichen ansehnlichen Augenflecken bezeichnet.

486. Leonte Nestira. Nestor Linn. Syst. Pap. 40. Cram. 19. A. B.

487. L. Deidamia. Achilles Cram. 27. A. B. & 28. A. Hübn. Pot. consp. Achilles.

488. L. Menelaë. Menelaus Linn. Syst. Pap. 20. Cram. 21. A. B. Hübn. Pot. consp. Menelaus.

489. L. Achilleja. Achilles Linn. Syst. Pap. 42. Helenor Cram. 86. A. B. & 373. C. Hübn. Pot. consp. Leonte.

490. L. Hecuba Fabr. Syst. Pap. 67. Cram. 217. A. B.

491. L. Telemache. Telemachus Linn. Syst. Pap. 41. Cram. 373. A. B. & Metellus 218. A. B.

9. Stamm, Stirps IX.

Dreaden, Oreades.

Gemmati Linn. Satyri Fabr.

Kennzeichen.

Die Streichler ziemlich rauh behaart; die Ohren zart am Ende abwärts gebogen und keulenförmig verdickt. Die Flügel mit augenähnlichen schwarzen weißkernigen Fleckgen bezeichnet. Die Stützen sehr schwach.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Dubiae.

Die Flügel groß; nur die Senken deutlich äugig gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Tänaren, Taenares.

Die Schwingen zeichenlos, die Senken mit großen blauen Augenflecken ausgezeichnet.

492. Tenaris Jaira. Jairus? Cram. 6. A. B. Hübn. Oread. dub. Jaira.

493. T. Nysa. Jairus Cram. 185. A. B. C.

2. Verein, Coitus 2.

Citháriaden, Citharaeriades.

Die Flügel nur mit haarförmigen Schüppgen besetzt, und daher ziemlich durchsichtig.

494. Citharaerias Piera Linn. Syst. Pap. 52. Cram. 291. C. D. E. H. Hübu. Oread. dub. Piera.

495. C. Cissa. Philis Cram. 387. E.

496. C. Andromeda Fabr. Syst. Pap. 107. Pireta Cram. 315. A.

497. Nereis Drur. III. 35. 4.

3. Verein, Coitus 3.

Pieriden, Pierides.

Die Flügel unterschiedlich eigenförmig und sehr zart beschüppt.

498. Pieris Rhea Fabr. Syst. Pap. 106. Dyndimene Cram. 198. F. G. Lamia Sulz Gesc. 18. 1.

499. P. Lena Linn. Pap. 206. Cram. 198. F. G.

500. P. Dracontis. Lena Cram. 291. A. B. Hübn. Oread. dub. Lena.

501. P. Philoctetis. Philoctetes Linn. Syst. Pap. 29.

Zweyte Familie, Familia B.

Streifige, Strigatae.

Beyderley Flügel mit gemeinschaftlichen Streifen und zierlichen Augfleckgen gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Euptychien; Euptychiae.

Die Flügel sehr zart, glatt, und sanftfärbig; ungleichäugig gezeichnet.

502. Euptychia Herse Cram. 10. C. D.
503. E. Clarissa Cram. 293. D. E.
504. E. Apamela.
505. E. Ocyrrhoe Fabr. Spec. Pap. 329. Hesione Sulz. Gesc. 17. 3. 4. Cissia Cram. 194. D. E. Hübn. Oread. strig. Ocyrrhoe.
506. E. Ocypete Fabr. Spec. Pap. 328. Helle Cram. 194. F. G.
507. E. Lisidice Cram. 169. C. D. & Doris 8. B. C. Hübn. Oread. strig. Lisidice.
508. E. Hermessa. Hermes Fabr. Syst. Pap. 195. Antonoë Cram. 60. E. F.
509. E. Molina. Hübn. Zutr. 105. 106.
510. E. Lydia Cram. 148. C. D.
511. E. Junia Cram. 292. D.
512. E. Libye Linn. Syst. Pap. 146. Sulz. Gesch. 17. 7.
513. E. Tolumnia Cram. 130. F. G.
514. E. Chlorimene. Chloris Cram. 293. A.
515. E. Ebusa Cram. 292. F. G. & Lea 151. C. D.
516. E. Myncea Cram. 293. C.

2. Verein, Coitus 2.

Megistonen, Megistones.

Die Flügel nur mit dunklen Linien ausgezeichnet.

517. Megisto Cymelia Cram. 132. C. D. Euritus Fabr. Syst. Pap. 194.
518. M. Argante Cram. 204. C. D.
519. M. Euridice Linn. Amoen. VI. 406. 65. & Canthus Syst. Pap. 129. Camerta Cram. 203. F. Hübn. Oread. strig. Canthe.
520. M. Acmenis.

3. Verein, Coitus 3.

Mycalesiden, Mycalesides.

Beyderley Flügel mit einem schmalen graulichweißen Streif gemeinschaftlich bezeichnet.

521. Mycalesis Evadne Cram. 222. E. & Polydecta 144. E. F.

532. M. Minea. Mineus Linn. Syst. Pap. 126. Drusia Cram. 84. C. D.

523. M. Hamerta Cram. 326. D.

524. M. Justina Cram. 326. C.

525. M. Hesione Cram. 11. C. D.

526. M. Otrea Cram. 314. A. B. Renata 326. A. & Francisca 326. E. F. Renatus Fabr. Mant. Pap. 330. Hübn. Zutr. 79. 80.

Dritte Familie, Familia C.

Ausgezeichnete, Distinctae.

Die Schwingen fast eckig und die Senken fast geschwänzt; beyderley unten schattig gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Faunen, Faunes.

Die Flügel unten gemeinschäftlich mit einer Reihe weißer runder Punkten ausgezeichnet.

527. Faunis Eumea Cram. 183. C. D. Eumeus Drur. I. 2. 3.

528. F. Echo Cram. 57. C. D.

2. Verein, Cotitus 2.

Taygetiden, Taygetides.

Beyderley Flügel unten schattig gestreift, und mit einer Reihe deutlicher Augenflecke geziert.

529. Taygetis Virgilia Cram. 96. C.

530. T. Thamyra Cram. 242. B. Hübn. Oread. marm. Thamyra.

531. Mermeria Cram. 289. E. F. & 96. B.

532. Tayg. Fatua Andromeda Cram. 96 A. & 242. A.
533. T. Celia Cram. 242. C.

3. Verein, Coitus 3.

Lethen, Lethae.

Die Flügel unten mit unförmlichen, weißpunctirten Augflecken geziert.

534. Lethe Europa Fabr. Syst. Pap. 247. Beroe Cram. 79. C. D. & Arete 313. E. F. Hübn. Oread. marm. Europa.

4. Verein, Coitus 4.

Hypnen, Hypnae.

Die Schwingen am Ende zugespizt, die Senken stumpf geschwänzt, unten beyderley weißfleckig marmorirt.

535. Hypna Clytemnestra Cram. 364. A. B.

5. Verein, Coitus 5.

Cäroen, Caeroes.

Die Schwingen sichelförmig geendet, die Senken auswärts geschwänzt.

536. Caerois Arcesilaë. Arcesilaus Cram. 294. A. B. & C. D.

6. Verein, Coitus 6.

Hipionen, Hipiones.

Die Flügel eckig, die Schwingen oben mit einem gedoppelten, großen schwarzen Augenfleck bezeichnet.

537. Hipio Constantia Cram. 133. A. B.
538. H. Leda Linn. Syst. Pap. 151. Cram. 196. C. D. & 292. A. Arcensia 292. C. Phedima 292. B. & Ismene 26. A. B. Hübn. Oread. marm. Leda.

Vierte Familie, Familia D.

Wolkige, Nubilae.

Die Flügel oben düsterfärbig, unten wolkig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Hipparchien, Hipparchiae.

Die Schwingen mit ziemlich ansehnlichen gelb umringten, die Senkeu mit kaum merklichen Augenfleckgen bezeichnet.

539. Hipparchia Fidia Linn. Syst. Pap. 138. Hübn. Pap. 147. 148.

540. H. Arachne Schiff. Verz. Pap. F. 18. Fauna Sulz. Gesch. 17. 8. 9. Hübn. Pap. 507. 509.

541. H. Actaea Esp. Pap. 57. 1. Ferula Fabr. Ent. Pap. 707. Hübn. Pap. 151. 152. 610. 611.

542. H. Cordula Fabr. Ent. Pap. 708. & Actea 705. Hübn. Pap. 149. 150. 619. 620.

543. H. Bryce Hübn. Pap. 724 — 727. Peas Esp. Pap. 112. 1.

544. H. Hippodice Hübn. Pap. 718. 719.

545. H. Zangis Fabr. Spec. Pap. 290. Agnes Cram. 325. A. B.

2. Verein, Coitus 2.

Minoen, Minoes.

Die Flügel blaß bandirt; die Schwingen mit blosen Augenflecken bezeichnet.

546. Minois Phaedra Linn. Syst. Pap. 150. Dryas Scop. carn. 429. Cram. 429. Hübn. Pap. 127 — 129.

547. M. Alcyone Schiff. Verz. F. 21. Hübn. Pap. 125. 126.

548. M. Hermione Linn. Syst. Pap. 149. Hübn. Pap. 122 — 124.

549. M. Proserpina Schiff. Verz. Pap. F. 23. Circe Fabr. Syst. 226.

550. Minois Anthe. Persephone Hübn. 710. 711. & 589. 590.

551. M. Briseis Linn. Syst. Pap. 139. Janthe Esp. Pap. 26. 1.2. & Pirata. Hübn. Pap. 130. 131. 604. 605.

552. M. Oenomais. Hübn. Oread. nub. Oenomais.

3. Verein, Coitus 3.

Eumeniden, Eumenides.

Die Flügel oben ockergelb bandirt; unten die Senken weiß gesent und zart marmorirt.

553. Eumenis Autonoe Esp. Pap. 86. 1. — 3. Hübn. Pap. 137. 138.

554. E. Aello. Hübn. Pap. 519 — 521.

555. E. Semele Linn. Syst. Pap. 148! Hippolyte Esp. Pap. 84. 4? Hübn. Pap. 143. 144! & 139. 140?

556. E. F. Tarpeja Esp. Pap. 83. 1. 2. Celamene Cram. 375. E. F. Tarpejus Fabr. Mant. Pap. 308.

4. Verein, Coitus 4.

Oeneiden, Oeneides.

Beyderley Flügel oben fleckig rostgelb, unten marmorartig grau bandirt.

557. Oeneis Norna Esp. Pap. 108. 4. Hübn. Pap. 142.

558. O. Bore Esp. Pap. 100. 1. Fortunatus Fabr. Ent. Pap. 670. Hübn. Pap. 134. — 136.

559. O. Celaeno Hübn. Pap. 152. 153.

560. O. Jutta Hübn. Pap. 614. 615.

571. O. Arethusa Schiff. Verz. Pap. F. 16. Hübn. Pap. 154. 155. & Erythia 591. 592?

5. Verein, Coitus 5.

Pyronien, Pyroniae.

Die Flügel oben oraniengelb, schwärzlichbraun gesäumt; die Schwingen mit einem zweykernigen Augfleck, die Senken kaum mit weißen Puncten gezeichnet.

562. Pyronia Tithone. Tithonus Linn. Mant. Pap. 537. Herse Schiff. Verz. Pap. F. 24. Hübn. Pap. 612. 156. 157. Amaryllis Borkh. Or. 19.

563. P. Ida Esp. Pap. 92. 2. Hübn. Pap. 158. 159.

564. P. Narica. Hübn. Pap. 704 — 707.

6. Verein, Coitus 6.

Epinephelen, Epinephelae.

Die Flügel oben graulichbraun; unten die Schwingen rostgelb, die Senken trübgrau wolkig.

565. Epinephele Janira. Linn. Syst. Pap. 156. & Jurtina 155. Hübn. Pap. 161. 162.

566. E. Eudora Esp. Pap. 45. 1. Hübn. Pap. 160. 163. 164.

567. E. Synclimene. Climene Esp. Pap. 85. 1. 2. 3. Hübn. Pap. 165. 166.

Fünfte Familie, Familia E.

Mormorirte, Marmoratae.

Beyderley Flügel, die Schwingen aber weniger als die Senken, geäugt und marmorirt.

1. Verein, Coitus 1.

Parargen, Parargae.

Die Flügel oben blaßfleckig, die Schwingen mit einem deutlichen, die Senken mit mehreren undeutlichen Augenfleckgen gezeichnet.

568. Pararge Egeria Linn. Syst. Pap. 143. Hübn. Pap. 181. 182.

569. P. Xyphia Fabr. Syst. Pap. 215. Meone Cram. 314. E. F. Hübn. Pap. 179. 180.

2. Verein, Coitus 2.

Diren, Dirae.

Die Flügel oben rostgelb gefleckt, unten mit welleuförmigen Linien und zart umringten Augenfleckgen gezeichnet.

570. Dira Roxelane. Roxelana Cram. 161. C — F.

571. D. Megaera Linn. Syst. Pap. 142. Hübn. Pap. 177. 178.

572. D. Maera Linn. Syst. Pap. 141. Hübn. Pap. 174. 175.

573. D. Clyte. Clytus Linn. Syst. Pap. 124. Cram. 86. C. D.

3. Verein, Coitus. 3.

Tisiphonen, Tisiphonae.

Die Flügel oben oraniengelb gefeldet, unten vorzüglich hübsch geäugt.

574. Tisiphone. Zelinde. Hübn. Oread. mar. Zelinde.

575. T. Pasyphae Esp. Pap. 67. 4. Salome Fabr. Mant. Pap. 419. Hübn. Pap. 167 — 169.

576. T. Tulbachii. Tulbaghia Linn. Syst. Pap. 158. Cram. 3. E. F. Hübn. Oread. mar. Tulbaghia.

4. Verein, Coitus 4.

Argen, Argae.

Die Flügel oben milchfärbig bandirt, wenig schwarz gefärbt, unten weiß, zierlich geäugt.

577. Arge Psyche. Occitanica Esp. Pap. 96. 3. 4. Hübn. Pap. 198. 199. & 694 — 697.

578. A. Amphitrite. Arge Sulz. Gesch. 16. 8. 9. Siciliae Esp. Pap. 27. 1. Hübn. Pap. 194. 195.

579. A. Inis. Thetis Hübn. Pap. 196. 197.

580. A. Clotho. Russiae Esp. Pap. 84. 1. 2. Hübn. Pap. 190. 191.

581. A. Lachesis. Nemausiaca Esp. Pap. 96. 1. 2. Hübn. Beitr. II. 3. P & Pap. 186 — 189.

582. A. Galathea Linn. Syst. Pap. 147. Hübn. Pap. 183 — 185.

5. Verein, Coitus 5.

Evonymen, Evonymae.

Die Schwingen oben mit einem weißen schiefen Bande, die Senken unten mit einem blassen geraden Streif bezeichnet.

583. Evonyme Amelia Cram. 136. B. C.

584. E. Sophonisba Cram. 295. A. B.

6. Verein, Coitus 6.

Eunicen, Eunicae.

Die Schwingen außen schwarz, blaß gefleckt; die Senken nur unten augenähnlich gezeichnet.

585. Eunica Anna Cram. 281. A. B.

586. E. Monima Cram. 387. F. G.

7. Verein, Coitus 7.

Enodien, Enodiae.

Beyderley Flügel allenthalben mit unterschiedlichen Augenflecken gezzert.

587. Enodia Andromacha. Hübn. Oread. mar. Andromacha.

588. E. Dejanira Linn. Syst. Pap. 154. Hübn. Pap. 170. 171.

589. E. Hyperanthe. Hypranthus Linn. Syst. Pap. 127. Polymeda Scop. carn. 434. Hübn. Pap. 172. 173.

Sechste Familie, Familia F.

Schattige, Umbrosae.

Die Flügel oben ziemlich glänzend schwärzlichbraun, rostfärbig bandirt, unten schattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Phorciden, Phorcides.

Die Senken gezähnt, unten zart weiß marmorirt.

590. Phorcis Scaea Hübn. Pap. 233. 234. Goante Esp. Pap. 116. 1?

591. P. Epistygne. Stygne Hübn. 639. 640.

592. P. Gorge Hübn. Pap. 502 — 595. Erynnis Esp. Pap. 121. 3.

2. Verein, Coitus 2.

Epigeen, Epigeae.

Die Flügel bunt gefränzt; unten die Senken blaß, dunkel bandirt.

593. Epigea Adyte. Hübn. Pap. 759. 760.

594. E. Euryale Esp. Pap. 116. 4. & Philomela. 118. 2. 3. Hübn. Pap. 218. 219.

595. E. Ligea Linn. Syst. Pap. 144. Hübn. Pap. 225 — 227.

596. E. Embla Thunb. Abh. XII. Griela Fabr. Ent. Pap. 737. & Ethus 680. Hübn. Pap. 228. 229. & 538. 539.

597. Medea Schiff. Verz. Pap. F. 7. Hübn. Pap. 220. — 222.

598. E. Pyrrha Schiff. Verz. Pap. F. 9. Hübn. Pap. 235. 236. 616.

3. Verein, Coitus 3.

Syngeen, Syngeae.

Die Flügel gleichfärbig befränzt, unten sehr schattig angelegt.

599. Syngea Pronoë Esp. Pap. 54. 1. Hübn. Pap. 215. — 217.

600. S. Pitho. Hübn. Pap. 574 — 577.

601. S. Alecto. Hübn. 528. 529. 515. 516. Tisiphone Esp. Pap. 121. 4. 5. 6.

4. Verein, Coitus 4.

Maricen, Maricae.

Alle Flügel glattsäumig; unten die Senken sehr dunkel gefärbt.

602. Marica Stygne. Ochsenh. Pap. VI. 54. Pyrene Esp. Pap. 116. 3. Hübn. Pap. 223. 224.

603. M. Nelo Hühn. Pap. 105. 506. Maurus Esp. Pap. 107. 3. 4.

5. Verein, Coitus 5.

Ypthimen, Ypthimae.

Die Senken unten grau, mit schwarzen Wellenlinien bezeichnet.

604. Ypthima Casse. Cassus Linn. Syst. Pap. 125. Cram. 314. C. D.

605. Y. Hippia Cram. 222. C. D.

606. Y. Manto Schiff. Verz. Pap. F. 15. Castor & Pollux Esp. Pap. 67. 2. 3. Hübn. Pap. 512. — 514.

607. Y. Cleo. Tyndarus Esp. Pap. 67. 1. Herse Borkh. Or. 33. Hübn. Pap. 209 — 212.

608. Y. Philomela. Philomelus Linn. Syst. Pap. 123. Cram. 293. G. H. Hübn. Zutr. 83. 84.

6. Verein, Coitus 6.

Melampiaden, Melampiades.

Die Schwingen unten bläsſer gefärbt als die Senken; leztere aber wie schimmlig scheinend.

609. Melampias Hyperbia. Hyperbius Linn. Syst. Pap. 130. Cram. 168. C. D.

610. M. Mnestra. Melampus Esp. Pap. 78. 2. Hübn. Pap. 540 — 543.

611. M. Rhodia. Cassiope Fabr. Mant. Pap. 417. Hübn. Pap. 626 — 629.

612. M. Janthe. Melampus Fuesl. Verz. 604. f. 6. Hübn. Pap. 624. 625. & 202.

613. M. Pharte. Hübn. Pap. 491 — 494.

615. Melamp. Arete Fabr. Mant. Pap. 418. Hübn. Pap. 231. 232.

Siebente Familie, Familia G. Gleichfärbige, Subtinctae.

Die Flügel auf beyden Flächen faſt gleich gefärbt, roſtfärbig gefleckt und ſchwarz geäugt.

1. Verein, Coitus 1. Gorgonen, Gorgones.

Alle Flügel deutlich geäugt, die roſtfärbige Flecke faſt nur die Augen umringend.

616. Gorgo Ceto. Hübn. Pap. Pap. 578. 579.
617. G. Medusa Schiff. Verz. Pap. F. 10. Hübn. Pap. 225 — 227.
618. G. Psodea. Hübn. Pap. 497 — 499.
619. G. Oeme. Hübn. Pap. 530 — 533.

2. Verein, Coitus 2. Maniolen, Maniolae.

Die Flügel, vorzüglich die Senken, bräunlich weiß geſent.

620. Maniola Phegea. Afer Esp. Pap. 83. 4. 5. Hübn. Pap. 749 — 751.
621. M. Phryne Pall. Reis. I. 60. Hübn. Pap. 709 709. 201. 202. Tircis Cram. 373. D. E.

Achte Familie, Familia H. Geſäumte, Fimbriatae.

Die Flügel unten, nahe dem Saume, erzfärbig gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1. Neonymphen, Neonymphae.

Die Senken unten auf mancherley Arten glänzend graulichſilbern gezeichnet.

622. Neonympha Helicta. Areolatus Abbot. Lepid. 13. Hübn. Oread fimb. Helicta.

623. N. Gemma. Hübn. Zutr. 7. 8.

624. N. Clerimene Stoll. 13. 2. 2. B.

625. N. Dorothea Cram. 204. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Cönonymphen, Coenoymphae.

Die Senken, nahe dem Saume, mit einer glänzenden Linie geziert.

626. Coenonympha Oedipe. Oedippus Fabr. Mant. Pap. 335. Geticus Esp. Pap. 102. 2. Pylarge Hübn. Pap. 245. 246. et 702. 703.

627. C. Hero Linn. Syst. Pap. 255. Sabaeus Fabr. Syst. Pap. 372. Hübn. Pap. 252. 253.

628. C. Dorilis Borkh. Oread. 31. Dorus Esp. Pap. 78. 1. Lizetta Cram. 373. F. G. Hübn. Pap. 247. 248.

629. C. Arcania Schiff. Verz. Pap. F. 12. Arcanius Linn. Syst. Pap. 242. Hübn. Pap. 240 — 242.

630. C. Iphis. Schiff. Verz. Pap. F. 25. Tiphon Esp. Pap. 35. 3. 4. Hübn. Pap. 249 — 251.

631. C. Corynna. Hübn. Pap. 536. 537.

632. C. Lylla. Lyllus Esp. Pap. 122. 1. Pamphile Hübn. Pap. 557. 558.

633. C. Pamphile. Pamphilus Linn. Syst. Pap. 239. Nephele Hufnag. 43. Hübn. Pap. 337 — 839.

634. C. Philoxena. Philoxenus Esp. Pap. 78. 3. Tullia Müll. Faun. 332. Hübn. Pap. 243. 244.

635. C. Leandra. Leander Esp. Pap. 89. 5. Clite Hübn. Pap. 526. 527. et 747. 748. Amaryllis Cram. 391. A. B.

636. C. Neoclidis. Satyrion Esp. Pap. 122. A. B. Philea Hübn. Pap. 254. 255.

Neunte Familie, Familia I.

Glänzende, Coruscae.

Die Flügel oben abwechselnd gefärbt, fast augenlos, sehr glänzend.

1. Verein, Coitus 1.

Callidulen, Callidulae.

Die Flügel dunkel, ansehnlich hell bandirt.

637. Callidula Evandra. Evandrus Cram. 231. F. G.
638. C. Petavia. Petavius Cram. 265. C. D.
639. C. Pyrame Stoll. 32. 3. 3. C.

2. Verein, Coitus 2.

Asteropen, Asteropae.

Die Flügel oben fast blitzend, unten kaum seidenglänzend, punktfleckig angelegt.

640. Asterope Amulia Cram. 180. C. D.
641. A. Sapphyra Hübn. Oread. corusc. Sapphyra.
642. A. Theane. Theanus Cram. 139. F.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Gentilen, Gentiles.

Kennzeichen.

Die Ohren vorwärts gebogen. Die Aerme mit Klauen, wie die Träger und Füße, besezt.

1. Stamm, Stirps I.

Agrodiäten, Agrodiaeti.

Die Streichler kahlschnauzig, die Wangen weiß gerändet, die Ohren ziemlich kurz, langkolbig. Die Stützen, vorzüglich die Aerme, kurz.

Erste Familie, Familia A.

Junge, Adolescentes.

Die Ohren ziemlich dickkolbig. Die Flügel rundlich stumpf, oben blau, unten blaß.

1. Verein, Coitus 1.

Eumäen, Eumaei.

Die Senken unten mit glänzend blaßgrünen Fleckgen bordirt.

643. Eumaeus Minyas. Hübn. Rust. adol. Minyas.

2. Verein, Coitus 2.

Nomiaden, Nomiadae.

Die Flügel oben dunkelblau, unten blaßgrau, mit schwarzen, weißlich umringten Punkten gezeichnet.

644. Nomiades Acis Schiff. Verz. Pap. N. 5. Hübn. Pap. 269 — 271.

645. N. Pheretes. Atys Hübn. Pap. 495. 496. & 548. 549.

646. N. Damon Schiff. Verz. Pap. N. 6. Biton Sulz. Gesch. 18. 9. Hübn. Pap. 275 — 277.

647. N. Damoetas Schiff. Verz. Pap. N. 7. Hübn. Pap. 266 — 268.

648. N. Erebus Knoch. Beytr. II. Pap. 4. Hübn. Pap. 260 — 262.

649. N. Alsus Schiff. Verz. Pap. N. 9. Hübn. Pap. 278. 279.

550. N. Alcon Schiff. Verz. Pap. N. 4. Arcas Esp. Pap. 34. 4. 5. Hübn. Pap. 263 — 265.

651. N. Euphemus Hübn. Pap. 257 — 259.

652. N. Arion Linn. Syst. Pap. 230. Hübn. Pap. 254 — 256.

653. N. Lysimon. Hübn. Pap. 534. 535.

3. Verein, Coitus 3.

Agriaden, Agriadae.

Die Flügel oben hellblau, unten am Saume mit rothen Fleckgen geziert.

654. Agriades Daphnis Schiff. Verz. Pap. N. 2. & Endymion N. 1. Meleager Esp. Pap. 45. 2. Hübn. Pap. 280 — 282.

655. A. Cajus Cram. 319. D. E.

656. A. Panoptes Hübn. Pap. 670 — 673. Zachaeus? Herbst. 311. 9. 10.

657. A. Argiolus Linn. Syst. Pap. 234. Acis Fabr. Mant. Pap. 687. Cleobis Esp. Pap. 40. 3. Hübn. Pap. 272 — 274.

658. A Ladon Cram. 270. D. E. & Mycilus 282. F. G.

659. A. Admetus Esp. Pap. 82. 2. 3. Hübn. Pap. 307 — 309.

660. A. Orbitulus Prunn. Lepid. 158. Meleager Hübn. Pap. 522 — 525. & 761. 762.

661. A. Corydon Schiff. Verz. Pap. N. 10. Hübn. Pap. 286 — 288.

662. A. Dorylas Schiff. Verz. Pap. 19. Hylas Esp. Pap. 45. 3. Hübn. Pap. 289 — 291.

663. A. Adonis Schiff. Verz. Pap. N. 11. Bellargus Esp. Pap. 32. 3. Hübn. Pap. 295 — 297.

664. A. Golgus Hübn. Pap. 688. 689.

665. A. Agestis Schiff. Verz. Pap. N. 13. Hübn. Pap. 303 — 306.

666. A. Eumedon Esp. Pap. 52. 2. 3. Hübn. Pap. 301. 302. & 700. 701.

667. A. Icarius Esp. Pap. 99. 4. Amandus Hübn. 283 — 285. & 752 — 755.

4. Verein, Coitus 4.

Scolitantiden, Scolitantidae.

Die Flügel oben trübblau, mit einem schwarzen Möndgen und Bördgen gezeichnet.

668. Scolitantides Battus Schiff. Verz. Pap. N. 17. Telephii Esp. 41. 2. Hübn. Pap. 328 — 330.

669. S. Hylas Schiff. Verz. Pap. N. 16. Amphion Esp. Pap. 53. 1. Hübn. Pap. 325 — 327.

5. Verein, Coitus 5.

Lycäiden, Lycaeidae.

Die Senken unten mit schimmernd grünen augenähnlichen Puncten ausgezeichnet.

670. Lycaeides Argus Linn. Syst. Pap. 232. Hübn. Pap. 316 — 318.

671. L. Aegon Schiff. Verz. Pap. N. 15. Hübn. Pap. 313 — 315.

672. L. Optilete Knoch. Beytr. I. Pap. 3. Hübn. Pap. 310 — 312.

673. L. Cyparissus Hübn. Pap. 654 — 657. Nanus Herbst. 312. 1. 2.

6. Verein, Coitus 6.

Everen, Everae.

Die Senken zart geschwänzt; alle Flügel unten blaulich weiß gefärbt, schwarz bedupft.

674. Everes Amyntas Schiff. Verz. Pap. N. 18. Tiresias Esp. Pap. 34. 1. 2. Hübn. Pap. 322 — 324.

675. E. Polysperchon Bergst. Nom. 44. 3 — 5. Tiresias Hübn. Pap. 319 — 321.

7. Verein, Coitus 7.

Hemiargen, Hemiargi.

Die Senken nur halb mit Augpuncten bezeichnet.

676. Hemiargus Bubastus Hübn. Zutr. 99. 100. Cram. 332. G. H.

677. H. Celaeus Cram. 379. K. K.

678. H. Ubaldus Cram. 390. L. M.

679. H. Enipeus.

680. H. Hanno. Hübn. Rust. adol. Hanno. Stoll. 39. 2. 2. B.

681. H. Isarchus Fabr. Ent. Hesp. 198. Camillus Cram. 300. A. B.

682. H. Larydas Cram. 282. H.

8. Verein, Coitus 8.

Lampiden, Lampidae.

Die Flügel unten voll grauer Streife, die Senken zierlich geflekt.

683. Lampides Numerius Stoll. 38. 7. 7. G.
684. L. Zethus. Alexis Stoll. 38. 3. 3. C.
685. L. Helius Cram. 201. F. G. Esra Herbst. 285. 5. 6.
686. L. Baalliston.
687. L. Boeticus Linn. Syst. Pap. 226. Hübn. Pap. 373 — 375. Boetica Fabr. Ent. Hesp. 77.
688. L. Plato Fabr. Ent. Hesp. 103.
689. L. Archius Cram. 181. C.
690. L. Celerio Fabr. Mant. Pap. 625. Celeno Cram. 31. C. D.
691. L. Aratus Cram. 365. A. B.

9. Verein, Coitus 9.

Hyreen, Hyrëi.

Die Flügel unten marmorähnlich gefleckt.

692. Hyreus Lingeus Cram. 379. F. G. Ericus Fabr. Ent. Hesp. 81.
693. H. Palemon Cram. 390. E. F.
694. H. Misenes Cram. 117. D.

10. Verein, Coitus 10.

Castalien, Castalii.

Die Flügel vom Rumpfe aus blau, übrigens weiß gefärbt, schwarz gefleckt.

695. Castalius Clyton Cram. 67. F. G.
696. C. Naxus. Coridon Cram. 340. C. D. E.
697. C. Rosimon Fabr. Syst. Pap. 341. Cassius Cram. 23. C. D.

11. Verein, Coitus 11.

Pepliphori, Pepliphori.

Die Flügel oben blau, unten weiß zierlich breit gesäumt.

698. Pepliphorus Euchylas. Hylas Cram. 363. B. F.

699. P. Cyanus Eabr. Ent. Pap. 5o. Cyanea Cram. 76. C. D.

Zweyte Familie, Familia B.

Ansäßige, Villicantes.

Die Senken fast buchtig am Aftereck; alle Flügel oben ziemlich glänzend beschuppt.

1. Verein, Coitus 1.

Jamiden, Jamidae.

Die Flügel unten zierlich bordirt.

700. Jamides Evippus. Roboris Esp. Pap. 103. 5. Hübn. Voeg. 56. 57.

701. J. Ethemon Cram. 48. D.

702. J. Bochus Cram. 391. C. D.

2. Verein, Cotitus 2.

Mileten, Mileti.

Die Senken spitzeckig verlängert, unten mit blaß umzogenen Flecken geziert.

703. Miletus Epopus Cram. 363. G. H.

704. M. Polycletus Linn. Syst. Pap. 265. Cram. 159. F. G.

705. M. Symethus Cram. 149. B. C. Stoll. 37. 3. 3. C.

3. Verein, Coitus 3.

Axiocersen, Axiocersae.

Die Flügel glänzend gelblich roth, schwärzlich braun gestreift; unten mit goldenen Puncten geschmückt.

706. Axiocerses Perion Cram. 379. B. C. Thisbe? Linn. Syst. Pap. 228.

4. Verein, Coitus 4.

Chrysophanen, Chrysophani.

Alle Flügel oben goldglänzend roth, unten mit schwarzen Puncten und gelblichrothen Fleckgen bezeichnet.

707. Chrysophanus Phlaeas Linn. Syst. Pap. 252. Hübn. Pap. 362. 363.

708. C. Timeus Cram. 186. E. F.

709. C. Helle Schiff. Verz. Pap. M. 4. Amphidamas Esp. Pap. 53. 1. Hübn. Pap. 331 — 333.

710. C. Thersamon Esp. Pap. 89. 6. Xanthe Hübn. Pap. 346 — 348.

711. C. Gordius Sulz. Gesch. 18. 7. 8. Hübn. Pap. 343 — 345.

712. C. Hyllus Cram. 43. B. C. Hylla Fabr. Spec. Pap. 466.

713. C. Hipponöe Esp. Pap. 35. 5. Lampetie Schiff. Verz. Pap. M. 8. Hübn. Pap. 356 — 359.

714. C. Chryseis Schiff. Verz. Pap. M. 3. Hübn. Pap. 337. 338. & 355.

715. C. Eurybia Ochsenh. Schm. I. 7. 37. Euridice Hübn. Pap. 339 — 342.

716. C. Virgaureae Linn. Syst. Pap. 253. Hübn. Pap. 349 — 351.

717. C. Hippothoë Linn. Syst. Pap. 254. Hübn. Pap. 352 — 354.

718. C. Circe Schiff. Verz. Pap. M. 7. Hübn. Pap. 334 — 336.

5. Verein, Coitus 5.

Candaliden, Candalidae.

Die Flügel unten weiß, wenig ausgezeichnet.

719. Candalides Xanthospilos. Hübn. Rust. adol. Xantospilos.

720. C. Phaedrus Fabr. Spec. Pap. 556. Cinyra Cram. 238. C.

6. Verein, Coitus 6.

Triopaden, Triopadae.

Alle Flügel mit schwarzen Puncten bezeichnet.

721. Tricpades Orus Cram. 332. E. F.

722. T. Eupalemon Cram. 366. A.

7. Verein, Coitus 7.

Phasen, Phases.

Die Senken mit einer Spitze am Aftereck besetzt, und unten alle Flügel silbern gezeichnet.

723. Phasis Salmoneus Cram. 341. D. E. Erosine Fabr. Mant. Pap. 506.

724. P. Palmus Cram. 341. F. G.

725. P. Nais Cram. 47. D. E.

8. Verein, Coitus 8.

Aloïden, Aloeidae.

Die Senken fast glattsäumig, unten neblig und blaß gefleckt.

726. Aloeides Thyra Linn. Syst. Pap. 227. Cram. 380. F. G.

727. A. Pierus. Cram. 243. E. F.

9. Verein, Coitus 9.

Thestoren, Thestores.

Die Senken unten besonders gefärbt, weiß gezeichnet.

728. Thestor Petalus Cram. 243. C. D.

729. T. Ballus Fabr. Mant. Pap. 729. Hübn. Pap. 360. 361. & 550.

Dritte Familie, Familia C.
Bewafnete, Armati.

Die Ohren keulenähnlich; die Schwingen stumpf, die Senken wenigstens gezähnt, meistens geschwänzt.

1. Verein, Coitus 1.
Lycen, Lyci.

Die Senken langzähnig, unten Gitter ähnlich gezeichnet.

730. Lycus Niphon. Zuträge 203. 204.
731. L. Rubi Linn. Syst. Pap. 237. Hübn. Pap. 364. 365.
732. L. Gryneus. Damon Cram. 390. C. D.

2. Verein, Coitus 2.
Strymonen, Strymones.

Die Flügel braun; unten, wenigstens die Senken, rostfärbig gefleckt, und mit weißen Linien unterbrochen gezeichnet.

733. Strymon Mopsus Hübn. Zutr. 135. 136.
734. S. Pruni Linn. Syst. Pap. 221. Hübn. Pap. 386. 387.
735. S. Betulae Linn. Syst. Pap. 220. Hübn. Pap. 383. 384.
736. S. Walbum Knoch. Beytr. II. Pap. 1. Hübn. Pap. 380. 381.
737. S. Esculi Hübn. Pap. 559. 560. & 690. 691.
738. S. Ilicis Esp. Pap. 39. 1. b. Hübn. Pap. 378. 379.
739. S. Acaciae Fabr. Mant. Pap. 655. Hübn. Pap. 743 — 746.
740. S. Melinus Hübn. Zutr. 121. 122.
741. S. Lynceus Fabr. Ent. Hesp. 73. Hübn. Pap. 692. 693.
742. S. Spini Schiff. Verz. Pap. O. 5. Hübn. Pap. 376. 377.

743. S. Beon Cram. 319. B. C. Hübn. Rust. arm. Poeas.
744. S. Pan Drur. II. 23. 4. Pann. Fabr. Ent. Hesp. 67.
745. S. Mars Fabr. Spec. Pap. 501. Acis Cram. 175. C. D.

3. Verein, Coitus 3.

Jalmenen, Jalmeni.

Die Senken zwischen zwey lappigen Zähnen, mit einem Schwänzgen besetzt.

746. Jalmenus Evagoras Hübn. Zutr. 175. 176.
747. J. Venulius Cram. 243. G.

4. Verein, Coitus 4.

Bithynen, Bithynes.

Die Flügel unten blaß und schattig grau, mit weißen Linien und rostgelben Fleckgen geziert.

748. Bithys Tyrrhenus. Erix Cram. 82. B.
749. B. Cubentus Cram. 337. F. G.
750. B. Cethegus Stoll. 38. 5. 5. E.
751. B. Vesulus Cram. 340. J. K.
752. B. Sicheus Cram. 144. C. D.
753. B. Lydus. Eryx Cram. 143. D.
754. B. Tephraeus.
755. B. Leucophaeus Hübn. Zutr. 87. 88.
756. B. Sphinx Fabr. Syst. Pap. 329. Dindymus. Cram. 46. F. G.
757. B. Strephon Fabr. Syst. Pap. 344. Cyllarus Cram. 27. C. D.
758. B. Quercus Linn. Syst. Pap. 222. Hübn. Pap. 369. 370. 368.

5. Verein, Coitus 5.

Chalyben, Chalybes.

Alle Flügel unten grün; die Senken mit einer schwarzen Linie und einem Fleckgen bezeichnet.

759. Chalybs Janias Cram. 213. D. E. Hassan Stoll. 38. 4. 4. D.

760. C. Telemus Cram. 4. D. E.

761. C. Eryx Fabr. Syst. Pap. 336. Amyntor Cram. 48. E. & Menalcas 259. A. B.

6. Verein, Coitus 6.

Tmolen, Tmoli.

Beyderley Flügel unten mit rothen, schwarz umfaßten Fleckgen besetzt.

762. Tmolus Megacles Cram. 333. E. F.

763. T. Syllidus. Silvanus Drur. II. 3. 2. 3.

764. T. Crolus Cram. 333. G. H.

765. T. Echion Linn. Syst. Pap. 224. Kleem. 7. 3. 4.

766. T. Eurytulus.

7. Verein, Coitus 7.

Oenomaen, Oenomai.

Die Flügel alle unten mit punctähnlichen blaß umzogenen Fleckgen bezeichnet; die Senken am Aftereck färbig.

767. Oenomaus Marsyas Linn. Syst. Pap. 223. Cram. 332. A. B.

768. O. Ortygnus Cram. 243. B.

769. O Eumolphus Cram. 299. G. H.

770. O Rustan Stoll. 38. 1. 1. A.

771. O Palegon Cram. 282. C. D. & Myrtillus 380. B. C.

8. Verein, Coitus 8.

Zesien, Zesii.

Alle Flügel unten bleich, und kaum deutlich bezeichnet; die Senken aber mit einem schimmernd grünen Fleckgen geziert.

772. Zesius Phaeomallus.

773. Z. Chrysomallus.

9. Verein, Coitus 9.

Oxyliden, Oxylidae.

Die Senken mit drey Schwänzgen besetzt; alle Flügel unten weiß, oraniengelb gezeichnet.

774. Oxylides Celmus Cram. 55. G. H.

775. O. Faunus Cram. 39. A. B. & 59. F. G. Hesiodus Herbst. 302. 5. 6.

10. Verein, Coitus 10.

Sithonen, Sithones.

Die Senken am Aftereck mit sonderbaren langen Lappen verlängert.

776. Sithon Nedymond Cram. 299. E. F.

777. S. Melampus Cram. 362. G. H.

11. Verein, Coitus 11.

Anteroten, Anterotes.

Die Flügel mit braunrothen, gölden sprengligen Flecken angelegt.

778. Anteros Formosus Cram. 118. G.

779. A. Achaeus Cram. 352. G. H.

12. Verein, Coitus 12.

Cupidinen, Cupidines.

Die Senken zwischen den Schwänzgen gerändet; unten voll kleiner Flecken.

780. Cupido Liger Cram. 254. E. F.

781. C. Amor Fabr. Syst. Pap. 321. Triopas Cram. 320. G. H.

782. C. Chrysus Cram. 380. D. E.

13. Verein, Coitus. 13.

Evenen, Eveni.

Alle Flügel unten goldschimmernd grün, buntfärbig bandirt.

783. Evenus Endymion Fabr. Spec. Pap. 506. Regalis Cram. 72. E. F.

784. E. Ganymedes Cram. 40. C. D. Acis Fabr. Mant. Pap. 623.

14. Verein, Coitus 14.

Thestien, Thestii.

Die Senken unten mit Querbändern fast bogig angelegt.

785. Thestius Gabrielis Fabr. Spec. Pap. 496. Gabriela Cram. 6. C. D.

786. T. Pholeus Cram. 163. D. E.

787. T. Archytes Stoll. 5. 3. 3. C.

788. T. Hyacinthus. Cram. 36. E.

789. T. Ematheon Cram. 163. D. E.

790. T. Lycabus Cram. 117. E.

15. Verein, Coitus 15.

Molen, Moli.

Alle Flügel unten braun, marmorfleckig, und die Senken am Aftereck rostfärbig.

791. Molus Phalantus Cram. 333. C. D.

792. M. Ismarus Cram. 176. F.

16. Verein, Coitus 16.

Thereen, Therei.

Alle Flügel unten braun, weiß gegittert.

793. Thereus Lausus Cram. 233. E. & Libanius 379. H. J.

17. Verein, Coitus 17.

Panthiaden, Panthiadae.

Die Flügel unten braun, weißstreifig; die Senken mit einem rothen Fleckgen bemerkt.

794. Panthiades Thallus Cram. 259. C. D.

795. P. Pelion Cram. 6. E. F.

18. Verein, Coitus 18.

Parrhasien, Parrhasii.

Alle Flügel unten schattig; die Senken fast larvenähnlich bezeichnet.

796. Parrhasius Timoleon Stoll. 32. 4. 4. D.

797. P. Arogeus Cram. 333. A. B.

798. P. Acmon. Cram. 51. C. D.

799. P. Polybetes Cram. 341. B. C.

800. P. Hemon Cram. 20. D. E.

801. P. Lisus Stoll 38. 2. 2. B.

19. Verein, Coitus 19.

Mithren, Mithrae.

Die Senken larvenähnlich bezeichnet, und mit einem schiefen blassen Streif angelegt.

802. Mithras Nautus Cram. 233. F. G.

803. M. Elis Cram. 233. D.

804. M. Metus. Meton Cram. 201. D.

805. M. Apidanus Cram. 137. F. G.

306. M. Dorimund Stoll. 37. 4. 4. D.

20. Verein, Coitus 20.

Olynthen, Olynthi.

Die Flügel unten vom Rumpfe aus blutroth; die Senken larvenähnlich bezeichnet.

807. Olynthus Inachus Cram. 36. D.

808. O. Narbal Stoll 38. 6. 6. F.

21. Verein, Coitus 21.

Brangen, Brangae.

Die Schwingen vom Rumpfe aus blutroth und mit weißen Puncten bestreut.

809. Brangas Pelops Cram. 341. A.

810. B. Caranus Cram. 332. C. D.

811. B. Dydimaon Cram. 134. A.

812. B. Syncellus Cram. 334. A. B.

813. B. Bitias Cram. 104. E.

22. Verein, Coitus 22.

Atliden, Atlidae.

Die Schwingen am Rumpfe roth, die Senken am Aftereck goldglänzend grün gefleckt.

814. Atlides Halesus Cram. 98. B. C.

815. A. Dolichus.

816. A. Atys Cram. 259. E. F.

817. A. Scamander. Atys Cram. 259. G. H.

23. Verein, Coitus 23.

Theriten, Theritae.

Die Senken am Aftereck gespalten; alle Flügel goldengrün, schwarz striemig gezeichnet.

818. Theritas Venus Fabr. Spec. Pap. 507. Imperialis Cram. 76. E. F.

819. T. Mavors.

24. Verein, Coitus 24.

Cycnen, Cycni.

Alle Flügel unten braun und, dem Aftereck zu, weißlich gestreift.

820. Cyenus Chiton Fabr. Ent. Hesp. 16. Sylenus Cram. 282. E.

821. C. Agis Herbst. 292. 5. 6.

822. C. Aetolus Cram. 340. F. G. H. Hübn. Rust. arm. Aetolus.

823. C. Phaleros Linn. Syst. Pap. 272. Battus Cram. 51. C. D. Bathis Fabr. Ent. Hesp. 49.

25. Verein, Coitus 25.

Aphnäen, Aphnaei.

Alle Flügel unten streifweise mit silberähnlichen Fleckgen geziert.

824. Aphnaeus Vulcanus Fabr. Syst. Pap. 323. Etolus. Cram. 208. E. F.

825. A. Orcas Herbs. 301. 9. 20.

26. Verein, Coitus 26.

Marmessen, Marmessi.

Beyderley Flügel unten schattig gestreift.

826. Marmessus Alcides Cram 96. D. E.

827. M. Corax Cram. 379. D. E.

828. M. Atymnus Cram. 331. D. E.

829. M. Lisias Cram. 152. F. G.

27. Verein, Coitus 27.

Iolaen, Iölai.

Die Senken sehr gestreckt am Aftereck; unten alle Flügel mit braunen Linien durchzogen.

830. Iölaus Eurisus Cram. 221. D. E. Helius Fabr. Ent. Hesp. 4.

2. Stamm, Stirps II.

Archonten, Archontes.

Equites Linn. & Fabr.

Kennzeichen.

Die Streichler ganz behaart; die Ohren dickkolbig, gebogen. Die Flügel ansehnlich; die Aerme ziemlich lang, den andern Stützen ähnlich, aber dornlos, und der Wanst frey.

Erste Familie, Familia A.

Heroische, Heroici.

Die Ohren ziemlich kurz und an der Kolbe aufgebogen. Die Senken geschwänzt.

1. Verein, Coitus 1.

Iphiclíden, Iphiclidae.

Die Senken lang und lang geschwänzt; alle Glieder streifig angelegt.

831. Iphiclides Dolicaon Cram. 17. C. D.
832. I. Antiphates Cram. 72. A. B.
833. I. Meges. Hübn. Prin. her. Meges.
834. I. Protesilaus Linn. Syst. Pap. 39. Hübn. Prin. her. Protesilaus.
835. I. Podalirius Linn. Syst. Pap. 36. Hübn. Pap. 388. 389.
836. I. Ajax Linn. Syst. Pap. 32. Marcellus Cram 98. F. G. Hübn. Prin. her. Ajax.
837. I. Aristeus Cram. 31. 8. E. F.
838. I. Sinon Fabr. Syst. Pap. 39. Protesilaus Drur. 22. 3. 4.
839. I. Pompilius Fabr. Mant. Pap. 66. Polinices Cram. 37. A. B.
840. I. Antheus Cram. 234. B. C.
841. I. Agamemnon Linn. Syst. Pap. 22? Cram. 106. C. D.

2. Verein, Coitus 2.

Jasoniaden, Jasoniadae.

Die Senken mäßig lang und ziemlich kurz geschwänzt.

842. Jasoniades Alexanor Esp. Pap. 110. 1. Polidamas Prunn. Lepid. Pap. 134.

843. J. Turnus Fabr. Syst. Pap. 41. Alcidamas Cram. 38. A. B.

844. J. Machaon Linn. Syst. Pap. 33. Hübn. Pap. 390. 391.

845. J. Xuthus Linn. Syst. Pap. 34. Cram. 73. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Euphöaden, Euphoeadae.

Beyderley Flügel ziemlich breit, braun gefärbt und gelb gefleckt.

846. Euphoeades Glaucus Linn. Syst. Pap. 9. Cram. 139. A. B.

847. E. Troilus Linn. Syst. Pap. 6. Cram. 207. A. B. C.

848. E. Chalcas Fabr. Syst. Pap. 44. Palamedes Cram. 93. A. B. Hübn. Prin. her. Chalcus.

849. E. Asterius Cram. 385. C. D. Asterias Fabr. Ent. Pap. 16.

4. Verein, Coitus 4.

Heracliden, Heraclidae.

Die Senken ziemlich kurz, aber ansehnlich und breitlappig geschwänzt.

850. Heraclides Oxilus. Cresphontes Cram. 166. A. & 165. A. B.

851. H. Menestheus Cram. 142. A. B.

852. H. Thoas Fabr. Syst. Pap. 48. Cram. 167. A. B. Hübn. Prin. her. Thoas.

853. H. Pelaus Fabr. Syst. Pap. 9. Torquatus Cram. 177. A. B.

854. H. Cresphontes Fabr. Spec. Pap. 77. Demolion Cram. 89. A. B.

855. H. Phorcas Cram. 2. B. C.

5. Verein, Coitus 5.

Laertiaden, Laertiades.

Die Flügel groß; die Senken mäßig, breitlappig geschwänzt, unten sonderbar gefleckt.

856. Laertias Ulysses Linn. Syst. Pap. 21. Cram. 121. A. B.

857. L. Diomedes Linn. Syst. Pap. 23. Cram. 122. A.

858. L. Philenor Fabr. Syst. Pap. 12. Astinous Cram. 208. A. B.

859. L. Cresus Cram. 142. A. B.

860. L. Regulus Stoll. 41. 1. 1. A.

861. L. Pammon Linn. Syst. Pap. 8. Cram. 141. B. Hübn. Prin. dom. Pammon.

862. L. Cyrus Fabr. Ent. Pap. 19.

863. L. Brutus Fabr. Spec. Pap. 50. Merope Cram. 378. D. E.

6. Verein, Coitus 6.

Menelaiden, Menelaidae.

Die Senken lappig geschwänzt; alle Flügel bräunlichschwarz gefärbt, die Schwingen blaß, die Senken weiß und roth gefleckt.

864. Menelaides Hector Linn. Syst. Pap. 2. Cram. 141. A. Hübn. Prin. her. Hector.

865. M. Romulus Cram. 43. A. Mutius Fabr. Ent. Pap. 6.

866. M. Demetrius Cram. 385. E. F.

867. M. Theseus Cram. 180. B.

868. M. Polydorus Linn. Syst. Pap. 10. Cram. 128. A. B. Aristolochiae Fabr. Syst. Pap. 3. Hübn. Prin. her. Polydorus.

869. M. Polytes Linn. Syst. Pap. 5. Cram. 265. A. B.
870. M. Alphenor Cram. 90. B. & Polytes 265. C.? Hübn. Prin. her. Stichius.
871. M. Ascanius Cram. 14. A.
872. M. Agavus Drur. III. 11. 4. Lysander Fabr. Spec. Pap. 33. Hübn. Prin. her. Agavus.

7. Verein, Coitus 7.

Achilliden, Achillidae.

Die Senken sehr breit, auch lappig, geschwänzt; auswärts färbig gefleckt.

873. Achillides Bianor Fabr. Spec. Pap. 2. Cram. 103. C.
874. A. Paris Linn. Syst. Pap. 3. Cram. 103. A. B.
875. A. Helenus Linn. Syst. Pap. 4. Cram. 153. A. B.
876. A. Severus Cram. 277. A. B. & 278. A. B. Helenus Fabr. Mant. Pap. 3.
877. A. Deiphobus Cram. 181. A. B.
878. A. Alcandor Cram. 40. A. B.
879. A. Achates Cram. 243. A. & 182. A. B.
880. A. Alcanor Cram. 166. A.

8. Verein, Coitus 8.

Idaiden, Idaidae.

Die Senken nur schwanzähnlich verlängert.

881. Idaides Codrus Cram. 179. A. B.
882. I. Nireus Cram. 378. E. F. & 187. A. B.

9. Verein, Coitus 9.

Zetiden, Zetidae.

Die Senken ziemlich lang und stumpfzackig.

883. Zetides Sarpedon Linn. Syst. Pap. 15. Cram. 122. D. E.

884. Z. Eurypylus Linn. Syst. Pap. 49. Cram 122. B. C.
885. Z. Aegistus Cram. 241. C. D.

10. Verein, Coitus 10.

Orpheiden, Orpheidae.

Die Senken mäßig lang, an beyden Seiten mit einem zierlichen Augfleck besetzt.

886. Orpheides Demoleus Linn. Syst. Pap. 46. Cram. 231. A. B. Hübn. Prin. dom. Demoleas.
887. O. Epius Fabr. Ent. Pap. 102. Erithonius Cram. 232. A. B. Hübn. Prin. dom. Erithonius.

11. Verein, Coitus 11.

Nestoriden, Nestoridae.

Die Senken sehr breit gelb bandirt, nur undeutlich mit Augflecken bezeichnet.

888. Nestorides Drusius Cram. 229. A. & 230. A.
889. N. Gambrisius Cram. 157. A. B.
890. N. Amphitrion Cram. 7. A. B.

12. Verein, Coitus. 12.

Calaiden, Calaidae.

Die Senken kurz, aber spitzzackig, fast wie geschwänzt.

891. Calaides Polycaon Cram 203.
892. C. Androgeus Cram. 16. C. D. & 350. A. B.
893. C. Piranthus Cram. 204. A. B.
894. C. Menatius. Aristeus Cram. 361. A. B.

Zweyte Familie, Familia B.

Herrschende, Dominantes.

Die Schwingen groß, die Senken ziemlich kurz und großzähnig.

1. Verein, Coitus 1.

Priamiden, Priamidae.

Gänzlich schwarz; die Brust, die Senken und der Wanst roth gefleckt.

895. Priamides Caudius. Hübn. Prin. dom. Caudius.
896. P. Hipponous. Anchises Cram. 318. A — D. Hübn Prin. dom. Anchises.
897. P. Capys. Hübn. Prin. dom. Capys.
898. P. Echemon. Hübn. Prin. dom. Echemon.
899. P. Euristeus Cram. 29. F.
900. P. Marcius Hübn. Prin. dom. Marcius. Anchises? Sulz. Gesch. 12. 4.
901. P. Tullus Cram. 277. C. D.
902. P. Anchises Linn. Syst. Pap. 11. Arbates Cram. 386. C. D. Hübn. Prin. dom. Arbates.
903. P. Brissonius. Hübn. Prin. dom. Pompejus.
904. P. Pompejus. Fabr. Mant. Pap. 37. Panthonus. Cram. 278. C. D.?
905. P. Amosis Cram. 269. A. B.
906. P. Hippason Cram. 29. E. Dimas Fabr. Ent. Pap. 47. Hübn. Prin. dom. Hippason.

2. Verein, Coitus 2.

Pariden, Paridae.

Die Schwingen oben grün gefleckt.

907. Parides Echelus. Hübn. Prin. dom. Echelus.
908. P. Aeneas Linn. Syst. Pap. 16. Eurimedes Cram. 386. E.F.
909. P. Gargasus, Aeneas Cram. 279. A — D.
910. P. Lysander Cram. 29. C. D.
911. P. Vertumnus Cram. 211. A. C.
912. P. Sessostris Cram. 211. F. G.

3. Verein, Coitus 3.

Ithobalen, Ithobali.

Die Flügel oben dunkelgrün, unten die Senken, nahe dem Saume, roth gefleckt.

913. Ithobalus Polydamas Linn. Syst. Pap. 12. Cram. 211. D. E. Hübn. Prin. dom. Polydamus.

914. I. Crassus Cram. 112. C. Hübn. Prin. dom. Crassus.

915. I. Belus Cram. 112. A. B.

916. I. Lycidas Cram. 113. A.

917. I. Erymanthus Cram. 113. C.

918. I. Numitor Cram. 113. B.

4. Verein, Coitus 4.

Troiden, Troidae.

Der Leib ziemlich groß, desgleichen die Schwingen, aber die Senken klein.

919. Troides Priamus Linn. Syst. Pap. 1. & Panthous 17. Cram. 23. A. B. & 123. A. 124. A.

920. T. Amphimedon Cram. 194. A.

921. T. Helena Linn. Syst. Pap. 19. Cram. 140. A. B.

922. T. Astenous Fabr. Ent. Pap. 58. Pompejus Cram. 25. A.

923. T. Amphrysus Cram. 219. A.

924. T. Minos Cram. 195. A.

925. T. Remus Cram. 386. A. B. & Hypolitus 10. A. B. 11. A. B. 135. A. 136. A. Hübn. Prin. dom. Hypolitus.

5. Verein, Coitus 5.

Iliaden, Iliadae.

Alle Flügel ziemlich lang, die Schwingen vom Rumpfe aus keilförmig roth gefleckt, desgleichen die Senken.

926. Iliades Polymnestor Cram. 53. A. B.

927. I. Ancaeus Cram. 222. A. B.

928. I. Laomedon Cram. 50. A. B.
929. I. Agenor. Linn. Syst. Pap. 14. Cram. 32. A. B.
930. I. Memnon Linn. Syst. Pap. 13. Cram. 91. C.
931. I. Mestor. Androgeos Cram. 91. A. B.
932. I. Protenor Cram. 49. A. B. Memnon. Fabr. Syst. Pap. 17.

6. Verein, Coitus 6.

Arisben, Arisbae.

Die Flügel alle schwärzlich braun, voll blaßfärbiger Flecken.

933. Arisbe Similis Linn. Syst. Pap. 193. Cram. 9. B. C.
934. A. Panope Linn. Syst. Pap. 196. & Dissimilis 195. Cram. 295. E. F. & 82. C. D.

7. Verein, Coitus 7.

Thaiden, Thaides.

Die Senken zackig, alle Flügel oben gelb, und mit rothen Flecken, zwischen schwarzen Zügen, bezeichnet.

935. Thais Polyxena Schiff. Verz. Pap. C. 1. Hübn. Pap. 392. 393.
936. T. Rumina Linn. Syst. Pap. 200. Hübn. Pap. 633. 634.
937. T. Medesicaste. Hübn. Pap. 632.

Dritte Familie, Familia C.

Weiße, Sapientes.

Alle Flügel glatträndig, blaßfärbig, schwarzfleckig.

1. Verein, Coitus 1.

Doriten, Dorites.

Die Senken blauäugig roth bandirt.

938. Doritis Thia Hübn. Pap. 686. 687. Pythius Esp. Pap. 117. 1 — 4.

2. Verein, Coitus 2.

Parnassiden, Parnassides.

Die Flügel oben fast ganz beschüppt, unten gänzlich kahl.

939. Parnassis Apollo Linn. Syst. Pap. 50. Hübn. Pap. 730. 731. 396. 397.

940. P. Delius Esp. Pap. 115. 5. Hübn. Pap. 649 — 652. & 684. 685.

941. P. Mnemosyne Linn. Syst. Pap. 51. Hübn. Pap. 398.

3. Stamm, Stirps III.

Andropoden, Andropoda.

Alle Glieder ziemlich schlechtförmig, die Flügel blaß und schwarz gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Fräßige, Voracia.

Die Flügel weiß, wenigsteus am Saume schwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Aporien, Aporiae.

Alle Flügel fast durchsichtig; schwarzsenig.

942. Aporia Crataegi Linn. Syst. Pap. 72. Hübn. Pap. 399. 400.

2. Verein, Coitus 2.

Mylothriden, Mylothrides.

Die Flügel mehlweiß, schwarz geründet.

943. Mylothris Arsalte. Linn. Syst. Pap. 91. Poppea Cram. 110. D.

944. M. Margarita.

945. M. Argia Fabr. Ent. Pap. 587. Cassiopea Cram. 201. A.

946. M. Monuste Linn. Syst. Pap. 80. Lyncida Cram. 131. B.

947. M. Hedyle Cram. 186. C. D.

948. M. Drusilla Cram. 110. C.

949. M. Agrippina. Lycimnia Cram. 105. E. F.

950. M. Hippo Cram. 195. B. C.

951. M. Demophile Linn. Syst. Pap. 81. Amathonte Cram. 116. A. B. & Molphea C. Hübn. Manc. vor. Demophile.

952. M. Hippomonuste. Hübn. Manc. vor Monuste.

3. Verein, Coitus 3.

Appiaden, Appiades.

Die Schwingen vom Rumpfe aus, wie auch am Saume schwarz gefleckt.

953. Appias Zelmira Cram. 320. E. F. & C. D.

954. A. Achine Cram. 338. E. F.

4. Verein, Coitus 4.

Perrhybriden, Perrhybrides.

Die Senken unten schiefstreifig, fast buntfärbig.

955. Perrhybris Eueidias. Pyrrha Cram. 63. A. B. Iphigenia Fabr. Ent. Pap. 621.

956. P. Epimedusa. Medusa Cram. 150 F.

5. Verein, Coitus 5.

Deliaden, Deliades.

Die Flügel buntfärbig, die Senken nahe an ihrer Wurze roth gefleckt.

957. Delias Tyche. Egialea. Cram. 189. D. E.

958. D. Apriate. Egialea Cram. 258. E. F.

959. D. Pasithoë Linn. Syst. Pap. 53. Porsenna Cram. 43. D. E.

960. Porsenna Cram. 352. A. B. & Thisbe 233. C.

6. Verein, Coitus 6.

Cathämien, Cathaemiae.

Die Flügel weiß und schwarz wechselnd; die Senken unten blutroth beschmutzt.

961. Cathaemia Anthyparete. Hyparete Cram. 210. A. B. & 339. E. F.

962. C. Isse Cram. 55. E. F. & 339. C. D.

963. C. Ada Cram 363. A. B.

964. C. Xantholeuca. Agathina Cram. 237. D. E.

965. C. Belisama Cram. 258. A. B. C. D.

966. C. Dorimene. Cram. 387. C. D.

967. C. Hirlanda Stoll. 35. 1. 1. A.

7. Verein, Coitus 7.

Pontien, Pontiae.

Die Senken unten, nahe dem Saume mit rothen Flecken besetzt.

968. Pontia Hyparete Linn. Syst. Pap. 92. Antonoe Cram. 187. C. D. & 320. A. B.

969. P. Eucharis Cram. 201. B. C. & 202. C. Hübn. Manc. vor. Hyparete.

870. P. Hierte. Antonoe Stoll. 33. 2. 2. Hübn. Zutr. 77. 78.

8. Verein, Coitus 8.

Belenoiden, Belenoides.

Die Senken unten gelb, mit vielen schwarzen Fleckgen gezeichnet.

971. Belenois Calypso Cram. 154. A — D.

9. Verein, Coitus 9.

Acräen, Acraeae.

Die Flügel mit dunkeln Senen und breitem schwarzen, weiß geflecktem Rand gezeichnet.

972. Acraea Eurota Fabr. Ent. Pap. 614. Mesentina Cram. 270. A. B.

973. A. Severina Cram. 338. G. H.

974. A. Nerissa Fabr. Syst. Pap. 123. Amasene Cram. 44. A. & Coronis B. C. Hübn. Manc. vor. Evagete.

975. A. Aspasia Stoll. 33. 3. 3. C.

976. A. Valeria Cram. 85. A. Hübn. Manc. vor. Valeria.

10. Verein, Coitus 10.

Anaphäiden, Anaphaeides.

Die Flügel aussen schwarz, weiß gefleckt.

977. Anaphaeis Creona Cram. 95. C. G. Cneora Fabr. Ent. Pap. 594.

978. A. Chloris Fabr. Ent. Pap. 608. Thermopyle Cram. 207. F. G. & Epaphia 207. D. E.

979. A. Coronea Cram. 68. B. C. & 361. G. H. Teutonia Sulz. Gesch. 15. 9.

11. Verein, Coitus 11.

Catophagen, Catophagae.

Die Schwingen milchweiß, schwarz gefleckt und gerändet.

980. Catophaga Paulina Cram. 110. E. F.

981. C. Gliciria Cram. 171. E. F.

982. C. Cheiranthi Hübn. Pap. 647. 648.

983. C. Brassicae Linn. Syst. Pap. 73. Hübn. Pap. 401 — 403.

984. C. Rapae Linn. Syst. Pap. 76. Hübn. Pap. 404. 405.

985. C. Bryoniae. Napaeae Esp. Pap. 116. 5. Hübn. Pap. 664. 665. 407.

986. C. Napi Linn. Syst. Pap. 77. Hübn. Pap. 406. 407.

12. Verein, Coitus 12.

Synchloen, Synchloae.

Die Senken unten grün gefleckt.

987. Synchloë Callidice Hübn. Pap. 408. 409. & 551. 52.

988. S. Autodice Hübn. Zutr. 151. 152.

989. S. S. Hellica Linn. Syst. Pap. 78. Daplidice Cram. 171. C. D. Hübn. Manc. vor Hellica.

990. S. Chloridice Hübn. Pap. 712 — 715.

991. S. Daplidice Linn. Syst. Pap. 81. Hübn. Pap. 414. 415.

992. S. Belemia Hübn. Pap. 412. 413.

993. S. Glauce Hübn. Pap. 546. 547.

Zweyte Familie, Familia B.
Sparsame, Frugalia.

Der Leib schlang, auch die Flügel ziemlich schmal und zart.

1. Verein, Coitus 1.

Euchloen, Euchloae.

Die Senken unten sehr zierlich bestäubt gefleckt.

994. Euchloë Belia Esp. Pap. 92. 1. Hübn. Pap. 417. 418.

995. E. Ausonia Hübn. Pap. 416. 582. 583.

996. E. Tagis Hübn. Pap. 565. 566.

997. E. Midea. Hübn. Manc. vor. Midea.

998. E. Cardamines Linn. Syst. Pap. 85. Hübn. Pap. 424. 425. 419. 420.

999. E. Eupheno Linn. Syst. Pap. 88. & Belia 84. Hübn. Pap. 421. 422.

1000. E. Coeneos. Aurora Cram. 299. A. B. & C. D.

2. Verein, Coitus 2.

Leptosien, Leptosiae.

Die Schwingen lang, die Senken kurz; beyderley sehr rundlich geformt.

1001. Leptosia Lathyri. Senapis Linn. Syst. Pap. 79. Hübn. Pap. 410. 411.

1002. L. Alcesta. Cram. 379. A.

1003. L. Chlorographa Hübn. Zutr.

1004. L. Brephos Hübn. Manc. vor. Brephos.

3. Verein, Coitus 3.

Aphroditen, Aphroditae.

Die Schwingen oben mit einem hell purpurrothen Endflecken geschmückt.

1005. Aphrodite Evippe. Linn. Syst. Pap. 87. Eborea Cram. 352. C. D. & Evippe 91. F. G.

1006. A. Eborea. Evippe Cram. 352 E. F. & Eborea 91. D. E.

4. Verein, Coitus 4.

Ixiaden, Ixiadem.

Die Flügel alle blaßgelb; die Schwingen oben in der äußern Hälfte schwarz, roth gefeldet; die Senken unten mit einer Reihe brauner Ringe bezeichnet.

1007. Ixias Pyrene Linn. Syst. Pap. 86. Cram. 125. A. B. Sesia Fabr. Spec. Pap. 206.

1008. I. Anexibia. Pyrene Cram. 125. C.

1009. I. Bebryce. Mariane Cram. 217. E.

1010. I. Mariane Cram. 217. C. D. & Aenippe 229. B. C.

1011. I. Aenippe Cram. 157. C. D. & 105. C. D.

5. Verein, Coitus 5.

Hebomoien, Hebomoiae.

Alle Flügel gelb; die Schwingen oben großentheils hellroth, schwarz gezeichnet; die Senken unten braunsprenglig marmorirt.

1012. Hebomoia Glaucippe Linn. Syst. Pap. 89. Cram. 164. A. B. C.

1013. H. Leucippe Cram. 36. A. B. C.

Dritte Familie, Familia C.

Flüchtige, Fugacia.

Die Ohren fast allmählig verdickt. Die Flügel unten mit silbernen Mittepuncten geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Enantien, Enantiae.

Die Senken groß, unten mit zwey Schattenstrichen schief bezeichnet.

1014. Enantia Melite Linn. Syst. Pap. 57. Cram. 153. C. D.

1015. E. Lininia Cram. 153. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Euremen, Euremae.

Die Flügel gelb, am Saume schwarz belegt.

1016. Eurema Demoditas. Delia Cram. 273. A.

1017. E. Elathea Cram. 99. C. D.

1018. E. Eudoxia Cram. 213.

1019. E. Jodutta. Agave Cram. 20. H. J.

1020. E. Phiale Cram. 27. F.

1021. E. Nise Cram. 20. K. L. & Albula 27. E. Hübn. Manc. fug. Nise.

1022. E. Hecabe Linn. Syst. Pap. 96. Cram. 124. B. C.

3. Verein, Coitus 3.

Zerenen, Zerenae.

Die Flügel hellgelb, schwarz gerandet, roth befränzt.

1023. Zerene Hyale Linn. Syst. Pap. 100. Europome Esp. Pap. 42. 1. 2. Hübn. Pap. 434. 435. & Philomene 740. 741. 602. 602.

1024. Z. Erate Esp. Pap. 119. 3.

1025. Z. Palaeno Linn. Syst. Pap. 99. Hübn. Pap. 438. 439. & Helice 440. 441.

1026. Z. Phicomone Esp. Pap. 56. 1. 2. Hübn. Pap. 436. 437.

1027. Z. Cesonia Stoll. 41. 2. 2. B.

4. Verein, Coitus 4.

Colotiden, Colotides.

Die Flügel oben röthlich gelb, wiederscheinend, schwarz geründet.

1028. Colotis Electra Linn. Syst. Pap. 101. Palaeno Cram. 14. F. G.

1029. C. Myrmidone Esp. Pap. 65. 1. 2. Hyale Cram. 351. E. F. G. H. Hübn. Pap. 432. 433.

1030. C. Edusa Fabr. Mant. Pap. 240. Hyale Schiff. Verz. Pap. E. 3. Hübn. Pap. 429 — 431.

1031. C. Aurora Esp. Pap. 83. 3. Hübn. Pap. 544. 545.

1032. C. Chrysotheme Esp. Pap. 65. 3. 4. Hübn. Pap. 426 — 428.

1033. C. Calais Cram. 351. A. B. & Palaeno 340. A. B. Amata Fabr. Syst. Pap. 143.

1034. C. Cypraea Fabr. Ent. Pap. 634. Cram. 53. C. D. & 351. C. D.

5. Verein, Coitus 5.

Abäiden, Abaeides.

Die Senken unten braunlich neblig mit schattigen Strichen.

1035. Abaeis Nicippe Cram. 210. C. D.

1036. A. Aretheusa Cram. 210. E. F.

1037. A. Brigitta Cram. 331. B. C.

6. Verein, Coitus 6.

Catopsilien, Catopsiliae.

Die Flügel aussen erhaben beschüppt, unten sehr glatt.

1038. Catopsilia Crocale Cram. 55. C. D.
1039. C. Trite Cram. 141. C. D.
1040. C. Alcmeone Cram. 141. E.
1041. C. Hilaria Cram. 339. A. B.

7. Verein, Coitus 7.

Phöbiden, Phoebides.

Die Flügel unten glatt, mit mehreren Mittefleckgen bezeichnet.

1042. Phoebis Melanippe Cram. 361. E. F. & Aricye 94. A. B.
1043. P. Jugurtha Cram. 187. E. F.
1044. P. Cypris. Cipris Cram. 99. E. F.
1045. P. Eubule Linn. Syst. Pap. 102. Cram. 120. E. F.
1046. P. Drya. Fabr. Syst. Pap. 153. Statire Cram. 120. C. D.

Vierte Familie, Familia D.

Treuliche, Fidelia.

Die Flügel fast zackig, hellfärbig, mit dunklem Mittepuncte.

1. Verein, Coitus 1.

Murtien, Murtiae.

Die Flügel oben grünlich weiß, unten gelb, zart gewässert.

1047. Murtia Minna. Alcyone Cram. 58. C. & A. B. Hübn. Manc. fug. Minna.

2. Verein, Coitus 2.

Coliaden, Coliades.

Die Flügel unten mit zertrümmerten Wellenlinien gezeichnet.

1048. Colias Sennae Linn. Syst. Pap. 103. Marcellina Cram. 163. A. B.

1049. C. Hersilia Cram. 173. C. D. Hübn. Manc. fug. Argante. 1. 2.

1050. C. Scylla Linn. Syst. Pap. 95. Cram. 12. C. D.

1051. C. Philippina Cram. 361. C. D.

1052. C. Menippe. Hübn. Manc. fid. Menippe.

1053. C. Corday. Philea Cram. 173. E. F. Hübn. Manc. fug. Argante 3. 4.

1054. C. Philea Linn. Syst. Pap. 104. Roes. IV. 3. 5.

3. Verein, Coitus 3.

Anteen, Antei.

Die Schwingen am Ende und die Senken an der Mitte geschnäbelt.

1055. Anteos Rhamni Linn. Syst. Pap. 106. Hübn. Pap. 442 — 444.

1056. A. Maerula Fabr. Spec. Pap. 222. Ecclipsis Cram. 129. A B.

1057. A. Cleopatra Linn. Syst. Pap. 105. Cram. 131. E. Hübn. Pap. 445. 446.

4. Stamm, Stirps IV.

Hypaten, Hypati.

Die Streichler groß, vorwärts gerichtet; die Ohren keulenförmig. Die Flügel eckig und zackig.

Erste Familie, Familia A.

Ernsthafte, Graves.

Die Flügel stumpfzackig; die Senken fast lappig geschwänzt.

1. Verein, Coitus 1.

Protogonien, Protogonii.

Alle Flügel oben schief gelb bandirt, unten braun marmorirt.

1058. Protogonius Fabius Cram. 90. C. D. Hübn. Cons. grav. Fabius. Hippona Fabr. Spec. Pap. 434.

Zweyte Familie, Familia B.

Strenge, Severi.

Die Flügel spitzzackig; die Senken am Senenrande verkürzt.

1. Verein, Coitus 1.

Hecaergen, Hecaërgae.

Beyderley Flügel oben braungelb gefleckt, unten die Senken neblig.

1059. Hecaërge Carinenta Cram. 108. E. F.

1060. H. Celtis Füesl. Arch. II. Hübn. Pap. 447 — 449.

5. Stamm, Stirps V.

Telchinen, Telchines.

Die Streichler schmal; die Ohren sehr spitzig. Die Flügel glattsäumig, unten großschüppig.

Erste Familie, Familia A.

Buntfärbige, Versicolores.

Die Flügel ungleich und bunt gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Corybanten, Corybantes.

Die Schwingen schief hellstreifig; die Senken am Saume schwarz, rothfleckig.

1061. Corybantes Amycus Cram. 227. D. E.

1062. C. Dardanus Cram. 17. E. F. Evalthe Fabr. Syst. Pap. 166.

1063. C. Icarus Cram. 18. A. B. Hübn. Urb. celebr. Icarus.

1064. C. Licus Cram. 223. A. B. Licas Fabr. Ent. Pap. 137.

1065. C. Syphax Fabr, Syst. Pap. 165. Harmodius Cram. 223. C. D.

1066. C. Pylades Cram. 387. A. B.

2. Verein, Coitus 2.

Athen, Athes.

Die Schwingen braun, die Senken und der Wanst anmit, gelblich weiß bandirt.

1067. Athis Palatinus Cram. 159. B. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Schreckliche, Terribiles.

Die Flügel gleichfärbig, einander ähnlich angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Eupalamiden, Eupalamidae.

Die Flügel oben schwarz, unten braun, auf beyden Flächen gleich bandweise weiß gefleckt.

1068. Eupalamides Daedalus Cram. 1. A. B. Cyparissias Fabr. Spec. Pap. 226.

2. Verein, Coitus 2.

Hämoniden, Haemonidae.

Die Schwingen schwarz vom Rumpfe aus roth bezeichnet übrigens weiß gefleckt, und die Senken weiß.

1069. Haemonides Cronis Cram. 60. C. & 178. A.

3. Verein, Coitus 3.

Cureten, Curetes.

Die Flügel oben schwarz und weiß gefeldet.

1070. Curetis Aesopus Fabr. Spec. Pap. 565. Thetis Cram. 238. D.

1071. C. Ormenus. Pasiphaë Cram. 80. E.

4. Verein, Coitus 4.

Cabiren, Cabiri.

Beyderley Flügel durchsichtig gefleckt.

1072. Cabirus Linus Cram. 257. A.

1073. C. Julettus Stoll. 9. 1.

5. Verein, Coitus 5.

Castnien, Castnii.

Alle Flügel fast gleichfärbig und zierlos.

1074. Castnius Juppiter Fabr. Mant. Pap. 794. Phidias Cram. 244. A. B.

1075. C. Pelasgus Cram. 202. D.

1076. C. Lucagus Cram. 176. G.

6. Stamm, Stirps VI.

Astycen, Astyci.

Urbicolae Linn. & Fabr.

Die Stirn breit; die Streichler dick beharrt, kurzschnauzig; die Ohren, an ihrem Kegelgen mit einem Löckgen besetzt, am Ende hackenförmig. Die Flügel ziemlich dick, sehr mäßig groß.

Erste Familie, Familia A.

Berühmte, Celebres.

Die Senken am Haarrande merklich verlängert.

1. Verein, Coitus. 1.

Pyrrhopygen, Pyrrhopygae.

Die Flügel glänzend; der Wanst am After roth.

1077. Pyrrhopyge Bixae Linn. Syst. Pap. 264. Cram. Cram. 199. C. D.

1078. P. Hyperici.

1079. P. Phidias Linn. Syst. Pap. 263. Acastus Cram. 41. C. D. & 199. E.

1080. P. Amyclas Cram. 199. F.

1081. P. Arinas Cram. 100. D.

2. Verein, Coitus 2.

Phociden, Phocidae.

Die Senken ſehr lang, am Aftereck.

1082. Phocides Cruentus. Palemon Cram. 131. F.

1083. P. Alardus Stoll. 39. 7. 7. F.

1084. P. Lisiades Cram. 152. F. G.

3. Verein, Coitus 3.

Aſtrapten, Astraptae.

Die Flügel vom Rumpfe aus ſehr glänzend gefärbt, und ſchief durch den Mitteraum weiß gefleckt.

1085. Astraptes Corytus Cram. 100. C. & 245. E.

1086. A. Pervivax. Pertinax Stoll. 35. 2.

1087. A. Narcosius Stoll. 39. 8.

1088. A. Apastus Cram. 111. D. E. Acastus Fabr. Spec. Pap. 614.

1089. A. Enotrus Cram. 364. G. H.

1090. A. Creteus Cram. 284. C. D. & Perminedes 364. E. F.

1091. A. Fulgurator Cram. 284. A. B.

1092. A. Aulestes Cram. 283. E. F. G.

1093. A. Lividus.

4. Verein, Coitus 4.

Cecropen, Cecropes.

Die Flügel mit einem faſt durchſichtigen Bande ausgezeichnet.

1094. Cecrops Neïs.
1095. C. Zarex Hübn. Zutr. 183. 184.

Zweyte Familie, Familia B.
Tapfere, Fortes.

Die Senken am Aftereck sehr verlängert.

1. Verein, Coitus 1.
Telegonen, Telegoni.

Die Senken fast geschwänzt und sehr einfach angelegt.

1096. Telegonus Talus Cram. 176. D.
1097. T. Phocus Cram. 162. F.
1098. T. Morpheus Cram. 392. G.
1099. T. Anaphus Cram. 178. F.
1100. T. Midas Cram. 63. G.

2. Verein, Coitus 2.
Goniuren, Goniuri.

Die Senken lang geschwänzt.

1101. Goniurus Simplicius Stoll. 39. 6. 6. E.
1102. G. Dorantes Stoll. 39. 9. Hübn. Urb. fort. Dorantes. Proteus Sulz. Gesch. 19. 5.
1103. G. Brachyus.
1104. G. Coelus Cram. 343. C. D.
1105. G. Catillus Cram. 260. F. G.
1106. G. Proteus Linn. Syst. Pap. 259. Cram. 260. D. E.
1107. G. Tarchon. Proteus Sulz. Gesch. 19. 1. 2.
1108. G. Eudoxus Cram. 366. G. H.
1109. G. Orion. Cram. 155. A. B.

3. Verein, Coitus 3.
Proteiden, Proteidae.

Die Senken kurz geschwänzt, unten zierlich angelegt.

1110. Proteides Mercurius Fabr. Mant. Pap. 780. Idas Cram. 260. A B.

1111. P. Zestos.

1112. P. Exadeus Cram. 260. C.

1113. P. Lyciades.

1114. P. Clonius Cram. 80. C. D.

1115. P. Renaldus Stoll. 13. 1. 1. A.

1116. P. Assaricus Cram. 261. F. G.

1117. P. Amphion.

Dritte Familie, Familia C.

Förmliche, Formales.

Die Flügel schier gemeinförmig, nur am Afterecк verlängert.

1. Verein, Coitus 1.

Thraciden, Thracidae.

Die Senken unten buntfärbig gemischt.

1118. Thracides Phidon Cram. 245. F. G.

1119. T. Salius Cram. 68. E. Hübn. Urb. form. Salius.

2. Verein, Coitus 2.

Epargyreen, Epargyrei.

Die Senken unten mit silbernen Flecken bandirt.

1120. Epargyreus Prodicus Stoll. 33. 6.

1121. E. Clarus Cram. 41. E. F. Tityrus Fabr. Ent. Pap. 268.

1122. E. Comus Cram. 391. N. O.

1123. E. Evadnes Cram. 343. G. H.

1124. E. Epitus Cram. 343. E. F.

1125. E. Brino Cram. 353. E. & 392. C. D.

1126. E. Orchamus Cram. 155. E. F.

3. Verein, Coitus 3.

Cöliaden, Coeliadae.

Die Senken unten weiß bandirt.

1127. Coeliades Forestan Cram. 391. E.
1128. C. Dubius Cram. 354. B. C.
1129. C. Chromus Cram. 284. E.

4. Verein, Coitus 4.

Taliden, Talidae.

Die Senken unten graulich und weißlich gemischt in brauner Färbung.

1130. Talides Athenion.
1131. T. Obscurus.
1132. T. Sinoïs. Sinon Cram. 342. D. E.
1133. T. Broteas Cram. 283. C. D.
1134. T. Astylos Cram. 283. A. B.
1135. T. Celaenus Cram. 393. A.
1136. T. Ramusis Cram. 342. C.

5. Verein, Coitus 5.

Telemiaden, Telemiadae.

Die Flügel gelbbraun, schwarz betropft.

1137. Telemiades Avitus Cram. 354. D.
1138. T. Epicalus. Avitus Cram. 354. E.
1139. T. Salatis Cram. 393. E.

6. Verein, Coitus 6.

Celänorrhinen, Celaenorrhini.

Die Flügel schwarzbraun, sparsam weißfleckig.

1140. Celaenorrhinus Corbulo Cram. 354. A.
1141. C. Niso Linn. Syst. Pap. 270. Daunus Cram. 126. F.
1142. C. Eligius Cram. 354. H.

1143. C. Cebrenus Cram. 178. G.
1144. C. Sergestus Cram. 74. C.
1145. C. Lucifer.
1146. C. Phaeomelas.

7. Verein, Coitus 7.

Colpoden, Colpodae.

Die Senken ziemlich kurz und sehr tiefbuchtig.

1147. Calpodes Forulus. Ladon Cram. 284. G.
1148. C. Ethlius Cram. 392. A.

8. Verein, Coitus 8.

Gegenen, Gegenae.

Die Flügel alle erdbraun, blaß gefleckt.

1149. Gegenes Pygmaeus Fabr. Syst. Pap. 401. Hübn. Pap. 458.
1150. G. Heraldus.
1151. G. Luridus.

9. Verein, Coitus 9.

Phlebodeu, Phlebodae.

Die Senken unten weißlichgrau gesennt und gefleckt.

1152. Phlebodes Pertinax Cram. 354. G.
1153. P. Saturnus Fabr. Mant. Pap. 769. Aecas Cram. 343. A. B.

Vierte Familie, Familia D.

Aeltliche, Veteres.

Alle Flügel dunkel, wellenförmig gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Achlyodeu, Achlyodae.

Die Schwingen stumpf geschnäbelt.

1154. Achlyodes Busiris Cram. 261. A. B.
1155. A. Bucolus Busiris Cram. 261. C.
1156. A. Thraso Hübn. Urb. vet. Thraso.
1157. A. Fridericus.

2. Verein, Coitus 2.

Antigonen, Antigoni.

Die Senken auswärts geeckt.

1158. Antigonus Ustus.
1159. A. Erosus Hübn. Urb. vet. Erosus.

3. Verein, Coitus 3.

Nisoniaden, Nisoniadae.

Die Flügel oben düstergrau, mit weißen Punkten bezeichnet.

1160. Nisoniades Bromius Stoll. 8. 1. C. 1. D.
1161. N. Mimas Cram. 52. E.
1162. N. Zephodes.
1163. N. Juvenis. Juvenalis Abb. Lepid. 21.
1164. N. Tages Linn. Syst. Pap. 268. Hübn. Pap. 456. 457.
1165. N. Aurispex.
1166. N. Ophion Stoll. 26. 4. 4. D.

4. Verein, Coitus 4.

Tagiaden, Tagiadae.

Die Senken unten hellfärbig, und am Rande schwarzfleckig.

1167. Tagiades Japetus Cram. 365. E. F.
1168. T. Paulinus Cram. 391. G. H.

Fünfte Familie. Familia E.

Gemeine, Vulgares.

Die Flügel schwarz, voll heller Fleckgen.

1. Verein, Coitus 1.

Pyrgen, Pyrgi.

Alle Flügel würflig weiß gefleckt; die Senken unten weiß, färbig bandirt.

1169. Pyrgus Syrichtus Fabr. Syst. Pap. 394. Orcus Cram. 334. J.

1170. P. Oilus Linn. Syst. Pap. 269. Tartarus Hübn. Pap. 716. 717.

1171. P. Orcus Cram. 334. K. L.

1172. P. Sidae Esp. Pap. 90. 3. Hübn. Pap. 468.

1173. P. Tessellum Hübn. Pap. 469. 470.

1174. P. Carthami. Alveus Hübn. Pap. 461 — 463.

1175. P. Fritillum Schiff. Verz. Pap. A. 3. Malvae Linn. Syst. Pap. 267. Hübn. Pap. 464. 465. 506.

1176. P. Alveolus. Malvae Esp. Pap. 36. 5, Hübn. Pap. 466. 467.

1177. P, Sertorius. Sao Bergst. Nom. 40. 8. 9. Hübn. Pap. 471. 472.

1178. P. Vindex Cram. 353. G. H.

2. Verein, Coitus 2.

Tharopen, Tharopes.

Beyderley Flügel wellig blau gestreift.

1179. Tharops Menander Cram. 334. C. D.

1180. T. Thersander Cram. 335. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Aetheien, Aetheii.

Die Flügel fast netzähnlich oben schwarz, unten braun angelegt.

1181. Aetheius Pretus Cram. 182. C. D.

1182. A. Archytas Stoll. 5. F.

1183. A. Meris Cram. 366. B. C.

6. Familie Familie F.

Vorsichtige, Cauti.

Die Flügel durchsichtig gefleckt in buntem Grunde; die Senken ziemlich zähnig.

1. Verein, Coitus 1.

Erycіden, Erycidae.

Alle Glieder schwarz, weiß gezeichnet, die Flügel inzwischen auch blau gefleckt und gestreift.

1184. Erycides Pigmalion. Cram. 245. A. B.

1185. E. Megalesius. Vulcanus Cram. 245. C. D.

2. Verein, Coitus 2.

Mysceln, Mysceli.

Die Flügel mit ziemlich großen durchsichtigen Fleckgen.

1186. Myscelus Nobilis Cram. 108. A. B.

1187. M. Sebaldus Cram. 342. A. B.

1188. M. Erythus Cram. 59. G.

3. Verein, Coitus 3.

Carcharodonten, Carcharodontes.

Die Flügel bunt gemischt, die Senken zackig gezähnt.

1189. Carcharodus Lavatherae Esp. Pap. 82. 4. Tages Sulz. Gesch. 19. 6. 7. Hübn. Pap. 455. 454.

1190. C. Altheae Hübn. Pap. 452. 453.

1191. C. Malvae Schiff. Verz. Pap. A. 1. Hübn. Pap. 450. 451. Alceae Esp. Pap. 51. 3.

4. Verein, Coitus 4.

Pythoniden, Pythonidae.

Die Flügel unten blau, oben grau und braun schattig.

1192. Pythonides Jovianus Cram. 392. L. M.
1193. P. Cerberus. Cerialis Cram. 392. N. O.
1194. P. Herennius Cram. 392. E. F.

5. Verein, Coitus 5.

Ephyriaden, Ephyriadae.

Die Flügel schwarz und weiß, auch durchsichtig gefleckt.

1195. Ephyriades Otreus. Cram. 328. F.
1196. E. Folus Cram. 74. F.
1197. E. Tryxus Cram. 334. G. H. Hübn. Urb. caut. Tryxus.
1198. E. Asychis Cram. 334. E. F.

7. Familie. Familia G.

Muntere, Vigilantes.

Alle Flügel schwarz und gelb wechselnd angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Scopten, Scoptae.

Die Flügel oben trübgelb, unten hellgrau, mit verschiedenen Zeichnungen bemerkt.

1199. Scoptes Alpheus Cram. 182. E. F.
1200. S. Protumnus Linn. Syst. Pap. 258. Gorgias Stoll. 33. 5. 5. D. & Jolaus Cram. 270. F. G.
1201. S. Crotopus Cram. 390. G. H.

2. Verein, Coitus 2.

Cyclopiden, Cyclopidae.

Die Flügel oben gelbfleckig, unten zierlich braun gezeichnet.

1202. Cyclopides Steropes Schiff. Verz. Pap. A. 7. Aracinthus Fabr. Mant. Pap. 809. Hübn. Pap. 475. 474.

1203. C. Brontes Schiff. Verz. Pap. A. 6. Paniscus Fabr. Syst. Pap. 377. Hübn. Pap. 475. 476.

1204. C. Silvius Knoch. Beytr. I. Pap. 1. Hübn. Pap. 641. — 644.

1205. C. Metis Linn. Syst. Pap. 245. Cram. 162. G.

1206. C. Coras Cram. 31. F.

3. Verein, Coitus 3.

Trapeziten, Trapezitae.

Die Schwingen fast durchsichtig gefleckt; die Senken unten mit silbernen Puncten geziert.

1207. Trapezites Symmomus.

4. Verein, Coitus 4.

Phemiaden, Phemiadae.

Alle Flügel oben bandartig angelegt, unten nur zerstreut schwarz bezeichnet.

1208. Phemiades Ephesus.

1209. P. Edippus Cram. 366. E.

1210. P. Epictetus Fabr. Ent. Hesp. 252. Hübn. Urb. vigil. Mys.

1211. P. Phineus Cram. 63. G.

1212. P. Augias Linn. Syst. Pap. 257.

5. Verein. Coitus 5.

Augiaden, Augiadae.

Die Flügel oben gelb, unten weiß gewürfelt.

1213. Augiades Crinisus Cram. 300. G. H.

1214. A. Arcalaus Cram. 391. I.

1215. A Comma Linn. Syst. Pap. 256. Hübn. Pap. 479 — 481.

1216. A. Sylvanus Esp. Pap. 36. 1. Hübn. Pap. 482—484.

1217. A. Helirius Cram. 60. D.
1218. A. Euribates Cram. 393. D.

6. Verein, Coitus 6.

Thymelicen, Thymelici.

Die Flügel fast ganz gelb und ungefleckt.

1219. Thymelicus Actaeon Esp. Pap. 36. 4. Hübn. Pap. 488 — 490.
1220. T. Pustula.
1221. T. Vibex.
1222. T. Venula Hübn. Pap. 665 — 669.
1223. T. Virgula Hübn. Pap. 660 — 663.
1224. T. Vitellius.
1225. T. Linea Schiff. Verz. Pap. A. 5. Thaumas Esp. Pap. 36. 2. 3. Hübn. Pap. 485 — 487.
1226. T. Puer.

7. Verein. Coitus 7.

Apausten, Apausti.

Die Flügel braun, am Saume fahlfenig.

1227. Apaustus Menes Cram. 393. H. I.

8. Verein, Coitus 8.

Brontiaden, Brontiadae.

Die Flügel hellfärbig, an den Spitzen schwarzfenig.

1228. Brontiades Procas Cram. 179. D.
1229. B. Gentius Cram. 179. C.
1230. B. Menalcas Fabr. Syst. Pap. 397. Niveus Cram. 22. C. Hübn. Urb. juv. Niveus 3. 4.
1231. B. Petrus. Hübn. Urb. juv. Niveus 1. 2.

Achte Familie, Familia H.

Schwärmende, Juvenes.

Die Flügel schwarz, hellfärbig gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Entheen, Enthei.

Die Senken länglich, gerundet; nur die Schwingen vor ihrer Spitze rostfärbig bandirt.

1232. Entheus Peleus Linn. Syst. Pap. 249. Cram. 284. F.

2. Verein, Coitus 2.

Carysten, Carysti.

Die Schwingen unten vor der Spitze färbig bandirt und mit durchsichtigen Puncten bemerkt; die Senken buntstreifig.

1233. Carystus Jolus Cram. 392. I. K.

1234. C. Hylaspes Cram. 365. I. K.

1235. C. Phyllus Cram. 176. B. C.

1236. C. Abebalus Cram. 365. G. H. & Fantosus 300. E. F.

3. Verein, Coitus 3.

Spioniaden, Spioniadae.

Die Senken unten weiß, breit braun bordig.

1237. Spioniades Artemides Cram. 391. L. M.

1238. S. Almon Cram. 261. D. E.

1239. S. Psecas Cram. 342. F. G. & Ebusus 300. C. D.

4. Verein, Coitus 4.

Phanen, Phani.

Alle Flügel voll hell durchsichtiger Streife und Flecken.

1240. Phanus Vitreus Cram. 366. D.

5. Verein, Coitus 5.

Cobalen, Cobali.

Die Schwingen weiß gefleckt, die Senken im innern Raume weiß.

1241. Cobalus Virbius Cram. 143. G.
1242. C. Nitocris Cram. 393. F. G.
1243. C. Adrastus Cram. 319. F. G.
1244. C. Pica.
1245. C. Triangularis.
1246. C. Phorcus Cram. 156. D.
1247. C. Hemes Cram. 103. F.
1248. C. Leucomelas.

6. Verein, Coitus 6.

Paramimen, Paramimi.

Die Flügel roth und weiß gefleckt.

1249. Paramimus Scurra. Hübn. Urb. juv. Scurra.
1250. P. Talaus Linn. Syst. Pap. 247. Cram. 393. C.
1251. P. Eumelus Cram. 156. E.

Zweyte Horde, Phalanx secunda.

Schwärmer, Sphinges.

Sphinges Linn. Sphinges, Sesiae & Zygaenae Fabr.

Kennzeichen.

Der Mund und die Schnauben verlängert, auch eingerollt; die Streichler ziemlich anliegend; die Ohren vorwärts gliedgenweise blätterig besetzt. Die Schwingen schmal und lang, die Senken breit und kurz, der Wanst dick und lang.

Erste Rotte, Tribus prima.

Papilioniden, Papilionides.

Kennzeichen.

Der Rüssel mäßig; die Streichler schmal und spitzig, die Ohren ihrem Ende zu merklich verdickt.

1. Stamm, Stirps I.

Zygänen, Zygaenae.

Die Streichler kurz, rauhhaarig; die Ohren am Ende kolbig. Die Schwingen dunkel gefärbt, hell gefleckt.

Erste Familie, Familia A.

Großfleckige, Circumfluae.

Die Schwingen blaßrändig, roth gefleckt; die Schenken gänzlich roth.

1. Verein, Coitus 1.

Hesychien, Hesychiae.

Die Flecke sehr groß und zusammenhängend, gelblichroth, blaßgelb umgeben.

1252. Hesychia Laeta. Hübn. Sph. 84. 35.

1253. H. Hilaris Ochs. Schm. II. 19. 29. Hübn. Sph. 123.

1254. H. Fausta Linn. Syst. Sph. 42. Hübn. Sph. 122. 27.

1255. H. Faustina Ochs. Schm. II. 19. 28. Hübn. Sph. 141. 142.

2. Verein, Coitus 2.

Agrumenien, Agrumeniae.

Die Flecke kaum zusammenreichend, purpurroth, weiß umgeben, der Grund schwarzgrün.

1256. Agrumenia Phacae. Occitanica Vill. Ent. II. 4. 21. Hübn. Sph. 106. 107.

1257. A. Onobrychis Schiff. Verz. Sph. G. 5. Hübn. Sph. 37. & 28.

1258. A. Hedysari Hübn. Sph. 36. 29.

1259. A. Melitoti Hübn. Sph. 38.

Zweyte Familie, Familia B.
Schwarzbezeichnete, Atrosignatae.

Die Schwingen mit schwarz begränzten Fleckgen geziert.

1. Verein, Coitus 1.
Eutychien, Eutychiae.

Die Schwingen schimmlig, die Fleckgen hellroth, theils schwarz umzeichnet.

1260. Eutychia Rhadamanthus Hübn. Sph. 23.

1261. E. Caffra Linn. Syst. Sph. 37. Cram. 394. F. 248. H.

2. Verein, Coitus 2.
Anthilarien, Anthilariae.

Alle Flügel schwarz, blau widerscheinend und roth gefleckt.

1262. Anthilaria Spicae Hübn. Sph. 25. Stoechadis Ochs. Schm. II. 19. 22.

1263. A. Lavandulae Esp. Sph. 41. 3. Hübn. Sph. 24.

3. Verein, Coitus 3.
Aeacen, Aeaces.

Die Flügel alle schwarz, blau wiederscheinend, und mehr weiß als roth gefleckt.

1264. Aeacis Ephialtes Linn. Syst. Sph. 36. Falcatae Schiff. Verz. Sph. G. 6. Hübn. Sph. 33.

4. Verein, Coitus 4.
Thermophilen, Thermophilae.

Die Schwingen schwärzlich grün, roth gefleckt; die Senken roth, grün gesäumt.

1265. Thermophila Aeacus Schiff. Verz. Sph. G. 8. Hübn. Sph. 22.

1266. T. Peucedani Esp. Sph. 25. 2. Hübn. Sph. 75. 76.

1267. T. Medicaginis. Hübn. Sph. 20.

1268. T. Charon. Hübn. Sph. 21.

1269. T. Viciae Schiff. Verz. Sph. G. 2. Hübn. Sph. 82. Melilothi Esp. Sph. 39. 3.

1270. T. Angelicae. Ochs. II. 19. 18. Hübn. Sph. 120. 121.

1271. T. Lonicerae Esp. Sph. 24. 1. Hübn. Sph. 7.

1272. T. Hyppocrepidis. Hübn. Sph. 32. Transalpina Esp. 16. 2.

1273. T. Filipendulae Linn. Syst. Sph. 34. Hübn. Sph. 31.

1274. T. Transalpina Hübn. Sph. 15. 19.

1275. T. Cytisi Hübn. Sph. 26.

1276. T. Orobi Hübn. Sph. 133.

1277. T. Trifolii Esp. Sph. 34. 4. 5. Hübn. Sph. 134. 135.

1278. T. Glycirrhizae Hübn. Sph. 138.

5. Verein, Coitus 5.

Lycaſten, Lycastae.

Die Schwingen ungleich roth gefleckt.

1279. Lycastes Sedi Fabr. Mant. Zyg. 4. Hübn. Sph. 132.

1280. L. Anthyllidis. Triptolemus Hübn. Sph. 96. 97.

1281. L. Bellidis. Bellis Borkh. II. Baſtard. 15. Hübn. Sph. 10.

1282. L. Loti Schiff. Verz. Sph. G. 3. Hübn. Sph. 11. Achilleae Esp. Sph. 25. 1. Fulvia Fabr. Spec. Zyg. 3.

1283. L. Exulans Esp. Sph. 41. 1. 2. Hübn. Sph. 12. 101.

1284. L. Cynarae. Esp. Sph. 43. 1. 2. Hübn. Sph. 80.

1285. L. Sarpedon. Hübn. Sph. 9. Trimaculata Esp. Sph. 40. 7. 8.

6. Verein, Coitus 6.

Meſembrynen, Mesembryni.

Die Schwingen fast durchsichtig, ihre Flecke lang.

1286. Mesembrynus Brizae Esp. Sph. 43. 3. 4. Hübn. Sph. 85.

1287. M. Scabiosae Esp. Sph. 24. 3. Hübn. Sph. 86.

1288. M. Punctum Ochs. Schm. II. 19. 7. Hübn. Sph. 119.

1289. M. Pluto Ochs. Schm. II. 19. 3. Pythia Hübn. Sph. 88.

1290. M. Minos Schiff. Verz. Sph. G. 1. Pythia Fabr. Mant. Zyg. 2.

1291. M. Erythrus. Hübn. Sph. 87.

1292. M. Rubicundus. Hübn. Sph. 137.

2. Stamm, Stirps II.

Chrysaoren, Chrysaores.

Die Streichler lang und glatt, die Ohren federähnlich, kurzfiederig. Der Leib an den mehrsten Gliedern metallglänzend.

Erste Familie, Familia A.

Ungefleckte, Immaculatae.

Alle Glieder ziemlich gleichförmig.

1. Verein, Coitus 1.

Procriden, Procrides.

Der Kopf, Rumpf, die Schwingen oben, die Stützen und der Wanst glänzend grün; die Senken, swie die Schwingen unten, grau.

1293. Procris Statices Linn. Syst. Sph. 17. Hübn. Sph. 1.

1294. P. Globulariae Hübn. Sph. 2. 3.

1245. P. Pruni Schiff. Verz. Sph. G. 12. Hübn. Sph. 4.

2. Verein, Coitus 2.

Atychien, Atychiae.

Alle Flügel, samt dem Leib schwärzlichbraun, roth gezeichnet.

1296. Atychia Infausta Linn. Syst. Sph. 43. Hübn. Sph. 5.

3. Verein, Coitus 3.

Empyreumaten, Empyreumata.

Beyderley Flügel glänzendroth; der Kopf, Rumpf und Wanst mit weißen Puncten besezt.

1297. Empyreuma Lichas Cram. 45. B.

1298. E. Pugione Linn. Syst. Sph. 45. Zutr. 41. 42.

4. Verein, Coitus 4.

Aethrien, Aethriae.

Die Flügel helldurchsichtig; Kopf, Rumpf und Wanst prächtig gefärbt.

1299. Aethria Leucaspis Cram. 52. C. D.

1300. A. Haemorrhusa. Haemorrhoidalis Stoll. 12. 1.

1301. A. Eagre. Eagrus Cram. 198. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Prächtige, Excelsae.

Alle Glieder prächtig gefärbt und sehr glänzend ausgezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Pompostolen, Pompostolae.

Der Kopf, Rumpf und Wanst, wie die Flügel fleckig bunt, goldglänzend angelegt.

1302. Pompostola Eryx Fabr. Syst. Zyg. 11. Inaurata Sulz. Gesch. 20. 4. Hübn. Chrys. gemm. Eryx.

1303. P. Rhebus Cram. 234. F.

1304. P. Hyparchus Cram. 197. C.

1305. P. Auratus Cram. 264. A. Lichas Fabr. Mant. Zyg. 34.

2. Verein, Coitus 2.

Euchromien, Euchromiae.

Der Kopf, Rumpf und Wanst matt und glänzend bunt gefleckt, desgleichen die Flügel.

1306. Euchromia Sperchia. Sperchius Cram. 146. C.
1307. E. Lethe Fabr. Syst. Zyg. 14. Eumolphus Cram. 197. D.
1308. E. Polymena Linn. Syst. Sph. 40. Cram. 13. D.
1309. E. Ira. Irus Cram. 368. A.
1310. E. Thelebe. Thelebas Cram. 150. D.
1311. E. Meonis. Meones Cram. 325. E.
1312. E. Proserpina.
1313. E. Cephea. Cepheus Cram. 197. E.
1314. E. Nyctea. Nycteus Cram. 325. F.
1315. E. Melanthe. Melanthus Cram. 248. C.

3. Verein, Coitus 3.

Cönochromien, Coenochromiae.

Der Leib roth gezeichnet; die Flügel fast durchsichtig weiß gefleckt.

1316. Coenochromia Creusa Linn. Syst. Sph. 39. Cram. 248. F.
1317. C. Cerbera Linn. Syst. Sph. 38. Hübn. Sph. 110.

4. Verein, Coitus 4.

Syntomen, Syntomes.

Die Flügel fast durchsichtig gefleckt; der Wanst mit einem gelben Fleck und Gurt besetzt.

1318. Syntomis Phegea Linn. Syst. Sph. 35. Quercus Fabr. Ent. Zyg. 6. Hübn. Sph. 99. 100.
1319. S. Collaris Fabr. Ent. Zyg. 7. Cysseus Cram. 355. B.

1320. S. Aterea. Atereus Cram. 400. A.
1321. S. Imaë. Imaon. Cram. 248. E.

5. Verein, Coitus 5.

Eutomen, Eutomes.

Die Flügel durchsichtig gefleckt; die Wanstglieder alle gleich gefärbt.

1322. Eutomis Mincea. Minceus Cram. 347. A.
1323. I. Fenestra. Fenestrata Stoll. 30. 5.

3. Stamm, Stirps III.

Glaucopen, Glaucopes.

Kennzeichen.

Die Streichler ziemlich lang und glatt, die Ohren sehr kurzfiederig; die Schwingen sehr lang, die Senken sehr klein, der Wanst an dem ersten Weichgliede, mit Luftbälgen besetzt.

Erste Familie, Familia A.

Ansehnliche, Amplae.

Die Schwingen breit, hellfleckig, beyderley Flügel unten glänzender als oben.

1. Verein, Coitus 1.

Centronien, Centroniae.

Die Senken mit einem bandähnlichen Fleck geziert.

1324. Centronia Glauca Cram. 107. E.
1325. C. Porphyria Cram. 397. E.
1326. C. Melanitis Hübn. Zutr. 93. 94.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemeine, Angustae.

Die Schwingen schmal, die Senken kurz, beyderley fast einfärbig, aber der Wanst bunt.

1. Verein, Coitus 1.

Calonoten, Calonoti.

Der Wanst auf dem Rücken glänzend gefärbt.

1327. Calonotos Phlegmon Cram. 35. H.
1328. C. Tiburtus Cram. 237. C.
1329. C. Helymus Cram. 2. D. E.
1330. C. Chrysophaeus.
1331. C. Thetis Fabr. Syst. Zyg. 8. Leneus Cram. 248. G.
1332. C. Cassandra Linn. Syst. Sph. 41. Cram. 394. G. Hübn. Glauc. enot. Cassandra.

2. Verein, Coitus 2.

Eucereen, Eucerea.

Die Schwingen mit vielen dunklen Flecken bezeichnet.

1333. Eucereon Archias Stoll. 14. 9. 10.
1334. E. Sylvius Stoll. 14. 4. 5.
1335. E. Marica Cram. 20. F. G.
1336. E. Pierus Cram. 367. E.

Dritte Familie, Familia C.

Zweydeutige, Dubiae.

Die Flügel sehr sparsam gezeichnet, und der Wanst auch fast einfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Aclytien, Aclytiae.

Der Leib ganz einfärbig, nur die Schwingen mit einem Fleck besetzt.

1337. Aclytia Halys Cram. 357. C.
1338. A. Heber Cram. 287. A.

2. Verein, Coitus 2.

Acharien, Achariae.

Die Senken am Aftereck sehr merklich verlängert, und auch der Wanst lang.

1339. Acharia Brunnus Cram. 147. C. Brunneus Fabr. Ent. Ses. 7.

1340. A. Coras Cram. 312. A.

3. Verein, Coitus 3.

Macrocnemen, Macrocnemae.

Die Füße sehr lang, deren Schiene haarig.

1341. Macrocneme Maja Fabr. Ent. Zyg. 61. Hübn. Zutr. 65. 66.

1342. M. Lades Cram. 83. E. Ladis Fabr. Spec. Zyg. 47.

1343. M. Leucosticta. Hübn. Glauc. unic. Leucosticta.

4. Verein, Coitus 4.

Pseudomyen, Pseudomyae.

Die Flügel fast durchsichtig.

1344. Pseudomya Melanthis. Melanthus Cram. 367. C.

1345. P. Tipulina. Hübn. Glauc. unic. Tipulina.

1346. P. Temenus Cram. 367. D.

1347. P. Errans. Eacus Cram. 357. B.

5. Verein, Coitus 5.

Antichloriden, Antichlorides.

Die Flügel glänzend grünlich schwarz und an ihren zusammenschließenden Ränden weißlich.

1348. Antichloris Phemonoë Hübn. Zutr. 15. 16.

1349. A. Eriphia Fabr. Ent. Zyg. 39. Hübn. Zutr. 133. 134.

1350. A. Alecton Cram. 382. D.

6. Verein, Coitus 6.

Horamaten, Horamata.

Gänzlich braun, mit gelblichem Halskragen und weißem Weichgliede.

1351. Horama Pretus Cram. 175. E. F.

Vierte Familie, Familia D.
Durchsichtige, Hyalinae.

Die Flügel durchsichtig, der Wanst buntfärbig.

1. Verein, Coitus 1.
Autochloriden, Autochlorides.

Die Flügel durchsichtig gestriemt; der Wanst grün gestreift.

1352. Autochloris Almon Cram. 224 F.

1353. A. Enagrus Cram. 248. D.

1354. A. Pheres Cram. 382. C.

2. Verein, Coitus 2.
Eunomien, Eunomiae.

Der Kopf, die Flügel, die Stützen und der Wanst roth gefleckt.

1355. Eunomia Columbina Fabr. Ent. Zyg. 57. Hübn. Zutr. 9. 10.

1356. E. Auge Linn. Syst. Sph. 46. Eagrus Cram. 198. C.

1357. E. Andromacha Fabr. Spec. Zyg. 20. Caunus Cram. 224. E.

3. Verein, Coitus 3.
Isanthrenen, Isanthrenae.

Der Leib an allen Gliedern hellgelb gefleckt, nur die Flügel allein trübgelb.

1358. Isanthrene Flavicornis Fabr. Ent. Zyg. 27. Hübn. Glauc. hyal. Incendiaria.

1359. I. Melas Cram. 45. G.

4. Verein, Coitus 4.

Pöciloſomaten, Poecilosomata.

Der Leib am Kopfe, Rumpfe und Wanſte, anderſt gefärbt.

1360. Poecilosoma Chrysis.

1361. P. Pulchra.

5. Verein, Coitus 5.

Chroſtoſomaten, Chrostosomata.

Der Leib hellfärbig, und die Flügel ſchwärzlich.

1362. Chrostosoma Echemus Cram. 367. B.

1363. C. Bromus Cram. 35. G.

1364. C. Evadnes Cram. 357. A.

4. Stamm, Stirps IV.

Sphecomorphen, Sphecomorphae.

Die Flügel ſchuppenlos; der Wanſt am andern Weichgliede ſehr verengt, am After zugeſpitzt.

1. Familie. Familia A.

Edle, Nobiles.

Der Mann am After mit einer leibslangen, feinbehaarten Borſte beſetzt.

1. Verein, Coitus 1.

Trichuren, Trichurae.

Der Leib gölden gefleckt, die Flügel braun geſäumt.

1365. Trichura Druryi. Coarctata Cram. 4 F. G. Caudata Fabr. Spec. Zyg. 43.

2. Familie Familie B.

Geringe, Exiles.

Die Flügel ganz kahl, bis an die Franzen.

1. Verein, Coitus 1.

Pseudosphecen, Pseudospheces.

Der Leib gelb, auf dem Rumpfe schwarz gezeichnet; die Flügel fast farbenspielend.

1366. Pseudosphex Polistes. Hübn. Zutr. 39. 40.

1367. P. Zethus Hübn. Zutr. 49. 50.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.
Wespenähnliche, Hymenopteroides.

Kennzeichen.

Die Streichler aufwärts gebogen, behaart; die Ohren kaum fiederig. Die Flügel theils von Schuppen entblöst; der Wanst am After mit einem bürstenähnlichen Haarbüschel besetzt.

1. Stamm, Stirps I.

Sesien, Sesiae.

Sesiae Fabr.

Die Schwingen schmal und lang, die Senken kurz und breit, beyderley ansehnlich befränzt.

Erste Familie. Familia A.

Wohlleibige, Corpulentae.

Der Leib ziemlich dick, auch die Flügel nicht sehr schmal.

1. Verein, Coitus 1.

Sphecien, Sphecidae.

Der Halskrage an den Seiten gelb; die Schwingen ungefleckt; der Wanst theils gelb.

1368. Sphecia Bembeciformis. Hübn. Sph. 98.

1369. S. Apiformis Linn. Syst. Sph. 29. Crabroniformis Schiff. Verz. Sph. F. 2. Hübn. Sph. 51. & 54.

Zweyte Familie, Familia B.
Schlängliche, Graciles.

Der Leib ziemlich dünn, und die Schwingen sehr schmal.

1. Verein, Coitus 1.
Paranthrenen, Paranthrenae.

Die Schwingen ganz dicht beschüppt; der Wanst ungleich gelbgeringt.

1370. Paranthrene Rhingiaeformis. Hübn. Sph. 41.

1371. P. Asiliformis Schiff. Verz. Sph. F. 9. Hübn. Sph. 44.

1372. P. Tineiformis. Hübn. Sph. 46.

1373. P. Brosiformis. Hübn. Sph. 116.

2. Verein, Coitus 2.
Melittien, Melittiae.

Die Schwingen theils, die Senken ganz durchsichtig; die Füße sehr buschig behaart.

1374. Melittia Anthedoniformis. Bombyliformis Cram. 400. C.

3. Verein, Coitus 3.
Bembecien, Bembeciae.

Beyderley Flügel durchsichtig; der Wanst am After fächerförmig behaart.

1375. Bembecia Hylaeiformis Lasp. Ses. 7. Apiformis Hübn. Sph. 108. 48.

1376. B. Ichneumoniformis Schiff. Verz. F. 7. Hübn. Sph. 84.

1377. B. Banchiformis. Hübn. Sph. 126.

1378. B. Empiformis Esp. Sph. 32. 1. 2. Hübn. Sph. 94.

1379. B. Tenthrediniformis Schiff. Verz. Sph. F. 6. Hübn. Sph. 52.

1380. B. Muscaeformis. Hübn. Sph. 92.

1381. B. Spheciformis Schiff. Verz. Sph. F. 10. Hübn. Sph. 77. 78.

1382. B. Scoliaeformis Borkh. Sph. 13. b. Hübn. Sph. 111.

1383. B. Tipuliformis Linn. Syst. Sph. 32. Hübn. Sph. 49.

1384. B. Melliniformis Lasb. Ses. 11.

1385. B. Vespaeformis Linn. Syst. Sph. 31. Nomadaeformis Lasb. Ses. 18. Syrphiformis Hübn. Sph. 50.

1386. B. Ophioniformis. Hübn. Sph. 127.

1387. B. Philanthiformis Lasb. Ses. 21.

1388. B. Rhagioniformis Hübn. Sph. 39. 40. Ichneumoniformis Ochs. Schm. II. 23. 11.

1389. B. Chrysidiformis Esp. Sph. 28. 4. Hübn. Sph. 53.

1390. B. Chalcidiformis. Chalciformis Esp. Sph. 47. 1. 2. Hübn. Sph. 93.

4. Verein, Coitus 4.

Synanthedonen, Synanthedones.

Die Schwingen im Mitteraum roth gezeichnet und auch am Haarrand röthlich.

1391. Synanthedon Cynipiformis Esp. Sph. 31. 3. 4. Hübn. Sph. 95.

1392. S. Oestriformis Esp. Sph. 23. 3. Hübn. Sph. 43.

1393. S. Systrophiformis Hübn. Sph. 113. Ichneumoniformis Lasb. Ses. 9.

1394. S. Megillaeformis Hübn. Sph. 114.

5. Verein, Coitus 5.

Conopien, Conopiae.

Der Wanst mit hellrothgeringten Gliedern geziert.

1395. Conopia Stomoxyformis. Hübn. Sph. 47.

1396. C. Myopaeformis. Hübn. Sph. 45. 91. Mutillaeformis Lasb. Ses. 17.

1397. Conopia Formicaeformis Lasp. Ses. 15. Nomadaeformis Hübn. Sph. 90.

1398. C. Tiphiaeformis Borkh. Sph. 13. c. Hübn. Sph. 42.

2. Stamm, Stirps II.

Apyraliden, Apyralides.

Die Flügel ziemlich breit und eckig, auch gezähnt.

Erste Familie, Familia A.

Glasfleckige, Vitratae.

Die Flügel durchsichtig gefleckt; der Wanst durchaus glatt.

1. Verein, Coitus 1.

Thyriden, Thyrides.

Die Flügel nur mit einer Reihe heller Flecken geziert, der Wanst weiß gegürtet.

1399. Thyris Fenestrina Schiff. Verz. Sph. F. 8. Hübn. Sph. 16.

2. Verein, Coitus 2.

Phostrien, Phostriae.

Die Flügel mit zwey Reihen trüber Flecken ausgezeichnet, der Wanst gleichfärbig.

1400. Phostria Temira Cram. 371. E.

1401. P. Tedea Cram. 312. G.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Echte, Legitimae.

Sesiae Fabr.

Die Streichler dick, stumpf, die Ohren vorwärts breiter, kurzblätterig, am Ende fast zurück gebogen, der Leib dick und die Flügel stark.

1. Stamm, Stirps I.

Bombylien, Bombyliae.

Der Rüssel sehr lang, die Ohren fast keulenförmig und am Ende spitzig; der Wanst büschlig behaart.

Erste Familie, Familia A.

Gemeine, Vulgares.

Die Flügel ziemlich kurz, glatträndig; der Wanst an den Seiten und am After büschlig.

1. Verein, Coitus 1.

Cephonoden, Cephonodae.

Die Flügel fast schuppenlos; der Wanst bunt.

1402. Cephonodes Hylas Fabr. Syst. Ses. 2. Picus Cram. 148. B.

1403. C. Bombyliformis Esp. Sph. 23. 2. Fuciformis Schiff. Verz. Sph. F. 1. Hübn. Sph. 56.

1404. C. Fuciformis Linn. Syst. Sph. 28. Hübn. Sph. 117. & 55.

1405. C. Pelasgus Cram. 248. B.

1406. C. Croatica Esp. Sph. 45. 2. Sesia Hübn. 136 & 89.

2. Verein, Coitus 2.

Aellopoden, Aellopodes.

Die Schwingen mit durchsichtigen weißen Linien gezeichnet; die Senken buchtig.

1407. Aellopos Titan Cram. 142. F.

1408. A. Fadus Cram. 61. C.

3. Verein, Coitus 3.

Psithyren, Psithyri.

Die Schwingen grau und schwarz bandirt; die Senken rostgelb und schwärzlich; die Haarbüschel scheckig.

1409. Psithyros Stellatarum Linn. Syst. Sph. 27. Hübn. Sph. 57.

1410. P. Belis Cram. 94. C.

1411. P. Ceculus Cram. 146. G.

1412. P. Faro Cram. 285. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Zweydeutige, Aequivocoe.

Die Flügel büchtig und zackig; der Wanst nur am After büschlig behaart.

1. Verein, Coitus 1.

Proserpinen, Proserpini.

Der Rumpfsrücke zierlich; die Schwingen dunkel bandirt, weißlich durchstrichen.

1413. Proserpinus Oenotherae Schiff. Verz. Sph. E. 1. Hübn. Sph. 58.

1414. P. Gaurae. Abb. Lep. 31.

1415. P. Gorgoniades. Gorgon Esp. Sph. 47. 5. Hübn. Sph. 124.

2. Verein, Coitus 2.

Enyonen, Enyones.

Die Schwingen am Eck fast hackenförmig, blaß und dunkel achatartig gezeichnet.

1416. Enyo Japyx Cram. 87. C.

1417. E. Pylas Cram. 206. A.

1418. E. Gorgon Cram. 142. E.

1419. E. Lyctus Cram. 225. F.

1420. E. Camertus Cram. 225. A.

1421. E. Danum Cram. 225. B.

1422. E. Phegeus Cram. 225. E.

1423. E. Anceus Cram. 355. A.

1424. E. Syces. Ficus Cram. 394. D.

3. Verein, Coitus 3.

Hemeroplanen, Hemeroplanae.

Die Schwingen stumpfeckig, achatgleichend, und im Mitteraum mit einem hellen Zeichen besezt.

1425. Hemeroplanes Pan. Cram. 216. D.
1426. H. Triptolemus Cram. 216. F.
1427. H. Plutonius. Pluto Cram. 216.
1428. H. Oielus Cram. 216. C.

4. Verein, Coitus 4.

Amplypteren, Amplypteri.

Die Schwingen am Ende buchtig; im Mitterauume glänzend gezeichnet.

1429. Amplypterus Ganascus Stoll. 35. 3. 3. B.
1430. A. Panopus. Cram. 224. A. B.
1431. A. Bubastus Cram. 149. E.

5. Verein, Coitus 5.

Nephelen, Nephelae.

Die Schwingen wolkig gestreift; die Senken dunkel.

1432. Nephele Morpheus Cram. 149. D.
1433. N. Didyma Fabr. Syst. Sph. 23. Penaeus Cram. 88. D.
1434. N. Chiron Cram. 137. E.

2. Stamm, Stirps II.

Eumorphen, Eumorphae.

Die Ohren ziemlich dünn und lang, ihr End zurück gekehrt; der Wanst lang, spizig, ganz glatt.

Erste Familie. Familia A.

Auserlesene, Elegantes.

Der Kopf, Rumpf und Wanst nicht ganz zierlos; die Flügel oben buntfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Pholen, Pholi.

Die Schwingen bräunlichgrau; die Senken schönfärbig; beyderley braunschattig, auch eckig schwarz gefleckt.

1435. Pholus Crantor Cram. 104. A.
1436. P. Licaon Cram. 55. A.
1437. P. Strigilis Fabr. Syst. Sph. 10. Cram. 106. B.
1438. P. Ficus Linn. Syst. Sph. 15. Cram. 246. E.

2. Verein, Coitus 2.

Daphniden, Daphnides.

Die Schwingen vorzüglich zierlich grün und sanft buntfleckig angelegt.

1439. Daphnis Megaeacus. Eacus Cram. 285. E.
1440. D. Hippothous Cram. 285. D.
1441. D. Nerii Linn. Syst. Sph. 5. Hübn. Sph. 63.

3. Verein, Coitus. 3.

Argeen, Argei.

Die Schwingen grün, mit blassen Linien bezeichnet; die Senken buntfärbig.

1442. Argeus Labruscae Linn. Syst. Sph. 14. Cram. 184. A. Hübn. Eum. eleg. Labruscae.
1443. A. Pandion Cram. 351. A. & Phorbas 55. B.

Zweyte Familie, Familie B.

Schiefstreifige, Obliquostriatae.

Die Schwingen auswärts von der Mitte des Haarrandes bis in die Spitze mit blassen und dunklen Streifen und Linien gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Amphionen, Amphiones.

Die Schwingen dunkel röthlich grau, schattig fleckig gestreift; die Senken roth.

1444. Amphion Nessus Cram. 107. D.

1445. A. Brennus Cram. 398. D.

2. Verein, Coitus 2.

Theretren, Theretrae.

Beyderley Flügel auswärts zackig bandirt; die Senken gelb und schwarz schattig.

1446. Theretra Equestris Fabr. Ent. Sph. 29. Nessus Cram. 226. D.

1447. T. Nechus Cram. 178. B.

1448. T. Porcellus Linn. Syst. Sph. 18. Hübn. Sph. 60.

1449. T. Tersa Fabr. Syst. Sph. 36. Cram. 397. C.

3. Verein, Coitus 3.

Hippotionen, Hippotiones.

Die Schwingen ausserhalb schief weiß bandirt und braun gestreift, auch weiß gesent; die Senken sanft roth gefleckt.

1450. Hippotion Celerio Linn. Syst. Sph. 21. Roes. IV. 8.

1451. H. Ocys. Celerio Cram. 125. E. Hübn. Sph. 59.

4. Verein, Coitus 4.

Isoplen, Isoplae.

Die Schwingen braun, ausserhalb schief blaß und dunkel gestreift; die Senken roth.

1452. Isoples Eson Cram. 226. C.

1453. I. Alecto Linn. Syst. Sph. 20. Cram. 137. D.

1454. I. Neoptolemus Cram. 301. F.

1455. I. Theylia Linn. Syst. Sph. 24. Cram. 226. E. F.

5. Verein, Coitus 5.

Xylophanen, Xylophanae.

Die Schwingen schief holzfärbig gestreift; die Senken schwärzlich schattig.

1456. Xylophanes Anubus Cram. 128. C.
1457. X. Lycetus Cram. 61. D.
1458. X. Gortys. Gordius Cram. 367. A.
1459. X. Cajus Cram. 146. F.
1460. X. Drancus Cram. 132. F.

6. Verein, Coitus 6.

Oreen, Orei.

Die Schwingen abwechslend färbig gestreift; die Senken schwarz und färbig bandirt.

1461. Oreus Gnoma Fabr. Syst. Sph. 32. Butus Cram. 152. A.
1462. O. Acteus Cram. 248. A.
1463. O. Elpenor Linn. Syst. Sph. 17. Hübn. Sph. 61.
1464. O. Amadis Cram. 394. C.
1465. O. Licastus Cram. 381. A.

3. Stamm, Stirps III.

Deilephilen, Deilephilae.

Die Ohren auswärts ein wenig dicker; die Flügel schief schattig bandirt.

Erste Familie. Familia A.

Blaßsennige, Pallidovenosae.

Die Schwingen braunschattig gefleckt und gestreift; die Senken schwarz, roth bandirt; der Wanst an den Weichen schwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Duponen, Dupones.

Die Schwingen nach der Länge, wie nach der Quere bandirt, blässer gesent; die Senken blaßgrau und rosenroth.

1466. Dupo Vitis Linn. Syst. Sph. 16. Cram. 268. E.

1467. D. Jussieuae. Vitis Cram. 267. C. Fasciatus Sulz. Gesch. 20. 1. Hübn. Eum. eleg. Jussieuae.

2. Verein, Coitus 2.

Phryxen, Phryxi.

Die Schwingen fast ganz weiß gesent; der Wanst auf dem Rücken und an den Seiten schwarz und weiß würflig gezeichnet.

1468. Phryxus Livornica Petiver. Gazoph. 12. 9. Esp. Sph. 8. 4. Lineata Fabr. Syst. Sph. 18. Koechlini Fuesl. Arch. I. Daucus Cram. 125. D. Hübn. Sph. 112. & 65.

1469. P. Caicus Cram. 125. F.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemeine, Populares.

Die Schwingen nach der Quere schattig bandirt; die Senken mittedurch roth.

1. Verein, Coitus 1.

Hylen, Hylae.

Die Schwingen am Senenrand wolkig gefleckt; der Wanst an den Seiten mit schwarzen und weißen Würfeln geziert.

1470. Hyles Galii Schiff. Verz. Sph. C. 2. Hübn. Sph. 64.

1471. H. Opheltes Cram. 285. B.

1472. H. Zygophylli Ochs. II. 25. 10. Hübn. Sph. 125.

1473. H. Hippophaës Esp. Sph. 38. 1. 2. Hübn. Sph. 109.

1474. H. Nicea Prunn. Lep. pedem. 173. Hübn. Sph. 115.

1475. H. Euphorbiae Schiff. Verz. Sph. C. 1. Hübn. Sph. 66.

2. Verein, Coitus 2.

Thaumen, Thaumae.

Die Schwingen nur neblig gefleckt und gestreift; der Wanst sparsam würflig gezeichnet.

1476. Thaumas Vespertilio Esp. Sph. 22. 3. Hübn. Sph. 103. 104.

1477. T. Capensis Linn. Syst. Sph. 10. Aeas Cram 226. A. Hübn. Eum. eleg. Capensis.

1478. T. Cecrops Cram. 226. B.

3. Verein, Coitus 3.

Chromen, Chromes.

Die Schwingen bandweise eckig gefleckt; die Senken gelb, schwarz gesäumt.

1479. Chromis Erotus Cram. 104. B.

4. Verein, Coitus 4.

Clanen, Clanes.

Die Flügel ziemlich breit; trübfärbig, schwärzlich querstreifig.

1480. Clanis Nicobarensis Schwarz Beytr. I. 1.

1481. C. Phalaris Cram. 149. A.

1482. C. Achemenides Cram. 225. C. & 267. A. B.

4. Stamm, Stirps IV.

Manducken, Manducae.

Alle Glieder sehr ansehnlich; der Rüssel stark; die Augen groß; die Flügel gestriemt; der Wanst bunt.

Erste Familie, Familia A.

Leichte, Leves.

Der Rüssel lang; alle Glieder ziemlich schlänglich.

1. Verein, Coitus 1.

Hyloicen, Hyloici.

Alle Glieder weißlichgrau, schwarz gezeichnet, die Schwingen gerad- und wellenweise-striemig; die Senken schwärzlichschattig.

1483. Hyloicus Pinastri Linn. Syst. Sph. 22. Hübn. Sph. 67.
1484. H. Coniferarum Abb. Lep. 42.
1485. H. Menephron Cram. 285. A.
1486. H. Pamphilius Cram. 394. E.
1487. H. Hylaeus Cram. 107. C.
1488. H. Hasdrubal Cram. 246. F.

2. Verein, Coitus 2.

Erinnyen, Erinnyes.

Die Schwingen bräunlich grau, zackig schwarz gestriemt; die Senken rostfärbig, schwarz gesäumt.

1489. Erinnyis Ello Linn. Syst. Sph. 13. Cram. 301. D.
1490. E. Oenotrus Cram. 301. C.
1491. E. Scyron Cram. 301. E.
1492. E. Alope Cram. 301. G.
1493. E. Caricae Linn. Syst. Sph. 11. Cacus Fabr. Spec. Sph. 15. Cram. 46. E.

Zweyte Familie, Familia B.

Schwere, Ponderosae.

Alle Glieder ziemlich dick und kurz, zierlich gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Acherontien, Acherontiae.

Der Rüssel sehr kurz; die Ohren am Ende mit einem Federgen besezt; der Rücke des Rumpfes larvenähnlich gefleckt; die Franzen der Flügel kurz.

1494. Acherontia Atropos Linn. Syst. Sph. 9. Hübn. Sph. 68.
495. Chionanthi Abb. Lep. 34.

1496. A. Morta. Atropos Cram. 237. A.

2. Verein, Coitus 2.

Cocytien, Cocytii.

Der Rüssel lang; der Rumpf fast ungezeichnet; der Wanst halb gelb gefleckt.

1497. Cocytius Jatrophae Fabr. Syst. Sph. 8. Medor Cram. 394. A. & Hydaspes 118. A.

1498. C. Rustica Fabr. Syst. Sph. 15. Cram. 301. A.

1499. C. Forestan Cram. 394. B.

3. Verein, Coitus 3.

Phlegethontien, Phlegethontii.

Der Rumpf ganz zeichenlos; der Wanst aber ganz mit gelben Flecken geziert.

1500. Phlegethontius Cluentius Cram. 78. B. & 126. A.

1501. P. Lucetius Cram. 301. B.

1502. P. Hannibal Cram. 216. A.

1503. P. Carolina Linn. Syst. Sph. 7. Hübn. Mand. obsc. Carolina.

1504. P. Paphus Cram. 216. B.

4. Verein, Coitus 4.

Agrien, Agrii.

Die Senken und der Wanst roth und schwarz bandirt.

1505. Agrius Anchemolus Cram. 224. C.

1506. A. Convolvuli Linn. Syst. Sph. 6. Hübn. Sph. 70.

1507. A. Cingulatus. Cingulata Fabr. Syst. Sph. 29. Convolvuli Cram. 225. D.

5. Verein, Coitus 5.

Lethien, Lethiae.

Die Schwingen nur ausserhalb zackenstriemig; die Senken bandirt.

1508. Lethia Ligustri Linn. Syst. Sph. 8. Hübn. Sph. 69. & 143.
1509. L. Prini Abb. Lep. 35.
1510. L. Drupiferarum Abb. Lep. 36.
1511. L. Kalmiae Abb. Lep. 37.
1512. L. Gordius Cram. 247. B. (Ocellatus)

5. Stamm, Stirps V.

Smerinthen, Smerinthi.

Der Kopf klein, fast verborgen; der Rüssel sehr zart und kurz; die Streichler klein; die Ohren gebogen. Die Flügel eckig gerändet; die Aerme dick und eigenfärbig behaart.

Erste Familie, Familia A.

Zähnige, Dentati.

Der Rumpf zierlos; die Flügel gezackt oder gezähnt.

1. Verein, Coitus 1.

Colacen, Colaces.

Die Schwingen eineckig, mit glänzendem Mittezeichen; die Senken blaß.

1513. Colax Apulus. Cram. 88. E.

2. Verein, Coitus 2.

Polyptychen, Polyptychi.

Die Flügel vielbuchtig oder zackig; schattig bandirt und schwärzlich gestreift.

1514. Polyptychus Dentatus Cram. 125. G.
1515. P. Timesius Stoll. 40. 1.
1516. P. Juglandis Abb. Lep. 29. Hübn. Amorph. dent. Juglandis.
1517. P. Populi Linn. Syst. Sph. 2. Hübn. Sph. 74.
1518. P. Quercus Schiff. Verz. Sph. A. 2. Hübn. Sph. 118. & 71.

Zweyte Familie, Familia B.
Eckige, Angulati.

Der Rumpf färbig ausgezeichnet; die Flügel stumpfeckig, sanftschattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.
Paonien, Paoniae.

Die Senken oben mit einem Pfauenfleck bezeichnet.

1519. Paonias Salicis. Ocellata Linn. Syst. Sph. 1. Hübn. Sph. 73.

1520. P. Myops Abb. Lepidopt. 26.

1521. P. Excaecatus. Excaecata. Abb. Lep. 25.

2. Verein, Coitus 2.
Mimanten, Mimantes.

Die Streichler ziemlich mäßig. Die Schwingen tiefbuchtig und stumpfeckig, bandweise angelegt.

1522. Mimas Tiliae Linn. Syst. Sph. 3. Hübn. Sph. 72.

Dritte Familie, Familia C.
Hackige, Uncinati.

Die Schwingen schnabelkrum; die Senken scharfeckig.

1. Verein, Coitus 1.
Oten, Oti.

Die Schwingen schattig gestreift; die Senken am Aftereck dunkel.

1523. Otus Choerilus Cram. 247. A.

1524. O. Myron Cram. 247. C.

Dritte Horde, Phalanx tertia.
Schiefer, Phalaenae.

Phalaenae Attaci & Bombyces Linn. Bombyces, Cossi & Hepiali Fabr.

Kennzeichen.

Der Kopf klein; der Rüssel zart und kurz; die Streichler normlos; die Ohren dünn fast borstenförmig aber siederig. Der Rumpf langhaarig; die Flügel ansehnlich; die Stützen klein; der Wanst ziemlich dick.

Erste Rotte, Tribus prima.
Sphingoiden, Sphingoides.

Kennzeichen.

Kopf, Rumpf und Wanst fast glatt behaart, letzterer schlechter gefärbt. Die Schwingen mit Wasserlinien bezeichnet, die Senken auch ohne Zeichnung.

1. Stamm, Stirps I.
Dimorphen, Dimorphae.

Der Rumpf zierlich behaart. Die Flügel den Senen nach gezeichnet.

Erste Familie, Familia A.
Zweygattige, Hybrides.

Die Flügel ansehnlich, fast gleich gezeichnet und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.
Syssphingen, Syssphinges.

Die Flügel mit einem Mondzeichen und ziemlich geraden Linien bezeichnet.

1525. Syssphinx Molina Cram. 396. B. & 302. E. F.

2. Verein, Coitus 2.
Endromen, Endromes.

Die Flügel mit einem Mondzeichen und sehr krummen Linien bezeichnet.

1526. Endromis Versicolora Linn. Syst. Phal. 32. Hübn. Bom. 1. 2.

Zweite Familie, Familia B.
Eulenähnliche, Noctuaeformes.

Die Schwingen schmal, die Senken kurz; erstere undeutlich leztere kaum gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Brachionychen, Brachionychae.

Die Schwingen den Senen nach schwarzstriemig: die Aerme oben an den Langern mit einer großen Klaue bewafnet.

1527. Brachionycha Nubeculosa Esp. Bom. 48. 6. Centrolinea Fabr. Mant. Bom. 149. Hübn. Bom. 34.

1528. B. Cassinia Schiff. Verz. Bom. P. 1. Sphinx Esp. Bom. 49. 2. Hübn. Bom. 5. 6.

2. Verein, Coitus 2.
Oxicesten, Oxicestae.

Die Schwingen mit spitzzackigen weißen Streifen bezeichnet und strahlig gefärbt.

1529. Oxicesta Sericina Hübn. Beytr. II. 1. 9. & Bom. 7. Austera Borkh. III. 166.

1530. O. Geographica Fabr. Mant. Noc. 216. Hübn. Bom. 259.

3. Verein, Coitus 3.
Drymonien, Drymoniae.

Die Schwingen fast mit einem Zahn am Haarrande ausgezeichnet, schattig bandirt und mit Wellenlinien geziert.

1531. Drymonia Crenosa Hübn. Bom. 12. Crenata Esp. Bom. 47. 3. 4.

1532. D. Chaonia Schiff. Verz. Bom. A. 7. Hübn. Bom. 10. 11.

1533. D. Querna Schiff. Verz. Bom. A. 5. Hübn. Bom. 9.

1534. Drymonia Dodonaea Schiff. Verz. Bom. A. 6. Hübn. Bom. 8.

2. Stamm, Stirps II.

Ptilodonten, Ptilodontes.

Die Schwingen am Harrande durch eine zahnähnliche, zierlich behaarte Vorragung ausgezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Ausgewischte, Extersae.

Die Schwingen ohne, oder mit undeutlichen Mittezeichen.

1. Verein, Coitus 1.

Pheosien, Pheosiae,

Die Schwingen der Länge nach splitterförmig gezeichnet und schattig gefärbt.

1535. Pheosia Dictaea Linn. Syst. Phal. 60. Hübn. Bom. 22.

1536. P. Dictaeoides Esp. Bom. 84. 3. Hübn. Bom. 23. 24.

2. Verein, Coitus 2.

Spatalien, Spataliae.

Die Schwingen buntfärbig gefleckt.

1537. Spatalia Argentina Schiff. Verz. Bom. R. 2. Hübn. Bom. 17.

1538. S. Bicolora Schiff. Verz. Bom. A. 3. Hübn. Bom. 18.

3. Verein, Coitus 3.

Odontosien, Odontosiae.

Die Schwingen gezähnelt, dunkel und blaß bunt angelegt.

1539. Odontosia Palpina Linn. Syst. Phal. 64. Hübn. Bom. 16.

1540. Odontosia Plumigera Schiff. Verz. Bom. P. 2. Hübn. Bom. 17.

1541. O. Carmelita Esp. Bom. 91. 1. Hübn. Bom. 21.

1542. O. Camelina Linn. Syst. Phal. 80. Hübn. Bom. 19.

1543. O. Cucullina Schiff. Verz. Bom. R. 8. Hübn. Bom. 20. Cuculla Esp. Bom. 71. 1.

4. Verein, Coitus 4.

Ochrostigmaten, Ochrostigmata.

Die Schwingen mit einem blassen Mondfleckgen zwey Wellenlinien und einem Spitzstreifgen gezeichnet.

1544. Ochrostigma Austera Schiff. Verz. Bom. A. 9. Hübn. Bom. 15.

1545. O. Melagona Borkh. Gesch. III. 157.

Zweyte Familie, Familia B.

Scheinmondige, Inlunatae.

Die Schwingen mit einem dunkeln Mondzeichen im Mittezeichen.

1. Verein, Coitus 1.

Notodonten, Notodontae.

Die Flügel ziemlich glatträndig mit einem hellen dunkelkernigen Mondfleckgen gezeichnet.

1546. Notodonta Nesea Cram. 305. C.

1547. N. Ziczac Linn. Syst. Phal. 61. Hübn. Bom. 26.

1548. N. Tritophus Schiff. Verz. Bom. R. 6. Hübn. Bom. 27.

1549. N. Dromedarius Linn. Syst. Phal. 62. Hübn. Bom. 28.

1550. N. Torva Hübn. Bom. 29.

1551. N. Trepida Esp. Bom. 57. 1. Hübn. Bom. 30.

1552. N. Longara Stoll. 18. 3. G.

2. Verein, Coitus 2.

Phaleren, Phalerae.

Der Rücke des Rumpfes zierlich gezeichnet, nebst Hals und Kopf gelb; die Schwingen fast glänzend weißlichgrau, aussen zierlich gelb angelegt.

1553. Phalera Bucephaloides Ochs. Schm. 41. 7. Hübn. Bom. 267. 268.

1554. P. Bucephala Linn. Syst. Phal. 31. Hübn. Bom. 194. 195.

3. Stamm, Stirps III.

Andrien, Andriae.

Der Kopf, der Rumpf, die Stütze und der Wanst sehr wohl behaart; die Flügel dunkel gezeichnet und schattig angelegt.

Erste Familie, Familia A.

Geflickte, Sartae.

Die Schwingen mit unterschiedenen, unterbrochenen Zeichnungen und Anlagen besezt.

1. Verein, Coitus 1.

Terasien, Terasia.

Die Flügel mit hellen Zackenstriemen gezeichnet, die kaum unterbrochen sind.

1555. Terasion Fagi Linn. Syst. Phal. 30. Hübn. Bom. 31.

2. Verein, Coitus 2.

Hopliten, Hoplites.

Die Schwingen fleckweise gestriemt und gefärbt; die Senken nur am Aftereck gezeichnet.

1556. Hoplitis Terrifica Schiff. Verz. Bom. S. 1. Mihlhauseri Fabr. Syst. Bom. 70. Vidua Knoch. Beytr. I. Phal. 9.

1557. H. Meone Cram. 306. A.

Zweyte Familie, Familia B.
Zackenstriemige, Dislineatae.

Der Kopf, Rumpf, Stützen und Wanst schwarz bezeichnet, mit Punkten oder Flecken, die Flügel mit zarten Linien.

1. Verein, Coitus 1.
Harpyien, Harpyiae.

Der Rumpf mit schwarzen Punkten, die Flügel mit Blitzstriemen gezeichnet.

1558. Harpyia Erminea Esp. Bom. 19. 12. Hübn. Bom. 35.

1559. H. Vinula Linn. Syst. Phal. 29. Hübn. Bom. 243. & 34.

2. Verein, Coitus 3.
Harpyiaden, Harpyiades.

Der Rumpf mit einem rostgelb und stahlblauen Bändgen, die Flügel mit geraden schwarzen, und zackigen, rostigen grauen Linien gezeichnet.

1560. Harpyias Furcula Linn. Syst. Phal. 51. Hübn. Bom. 39.

1561. H. Bifida Borkh. Gesch. III. 139. Hübn. Bom. 38.

1562. H. Bicuspis Borkh. Gesch. III. 141. Hübn. Bom. 36.

4. Stamm, Stirps IV.
Platyptericen, Platypterices.

Der Leib schlang, die Flügel groß; die Schwingen mehr gezeichnet als die Senken; beyderley doch fast gleich gefärbt.

Erste Familie, Familia A.
Gerundete, Rotundatae.

Die Flügel gerundet, die Schwingen glänzend gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Eucleen, Eucleae.

Beyderley Flügel dunkel gesäumt; die Schwingen sehr eigen zierlich gefleckt.

1563. Euclea Ruffa Linn. Syst. Add. 13. Spinula Schiff. Verz. Bom. T. 6. Bankiana Fabr. Syst. Pyr. 1. Compressa Spec. Bom. 94. Hübn. Bom. 40.

1564. E. Aemilia Cram. 397. P.

1565. E. Cippe. Cippus Cram. 53. E.

2. Verein, Coitus 2.

Idalien, Idaliae.

Die Flügel silbergrau gestreift, glänzend weiß gefärbt.

1566. Idalia Regina Cram. 272. A.

Zweyte Familie, Familia B.

Gestichelte, Falcatae.

Die Schwingen am Ende krumm zugespizt.

1. Verein, Coitus 1.

Ancistroten, Ancistrotae.

Die Flügel schief gezeichnet, gelb gefärbt.

1567. Ancistrota Plagia Hübn. Zutr. 213. 214.

1568. A. Flavifuscula. Flavaria Cram. 287. F.

2. Verein, Coitus 2.

Drepanien, Drepaniae.

Die Flügel mit gebogenen blassen Linien bezeichnet.

1569. Drepania Uncula Hübn. Bom. 45. Uncinula Borkh. Gesch. III. 14. 15.

1570. D. Hamula Schiff. Verz. Bom. T. 4. Hübn. Bom. 46. 47.

1571. D. Unguicula Hübn. Bom. 48. Sicula Esp. 74. 4. 5. Cultraria Fabr. Syst. Phal. 9.

3. Verein, Coitus 3.

Syssauren, Syssaurae.

Beyderley Flügel mit gewellten, dunklen Linien bezeichnet.

1572. Syssaura Falcula Schiff. Verz. Bom. T. 2. Hübn. Bom. 44.

1573. S. Sicula Schiff. Verz. Bom. T. 1. Curvatula Borkh. Gesch. III. 9. 10. Hübn. Bom. 42. 43. Falcataria Linn. Syst. Phal. 202.

1574. S. Zerbina Cram. 287. E.

1575. S. Honesta Cram. 302. C. D.

1576. S. Drepanula.

4. Verein, Coitus 4.

Oxytenen, Oxytenes.

Die Schwingen scharf zugespizt; alle Flügel, von einer Spitze zur andern, mit einem Strich gezeichnet.

1577. Oxytenis Peregrina Cram. 305. A.

1578. O. Modestia Cram. 272. C. D.

1579. O. Lamis Cram. 367. G.

Dritte Familie, Familia C.

Gezähnte, Dentatae.

Die Flügel gezähnt und gebuchtet.

1. Verein, Coitus 1.

Draconipteriden, Draconipterides.

Die Schwingen am Franzenrande bordenähnlich gezeichnet.

1580. Draconipteris Mirabilis Cram. 272. B.

1581. D. Harpagula Esp. Bom. 73. 1. 2. Hübn. Bom. 41.

2. Verein, Coitus 2.

Prionien, Prioniae.

Die Schwingen mit zwey dunklen Linien bezeichnet und blaß gewässert.

1582. Prionia Lacertula Schiff. Verz. Bom. T. 5. Hübn. Bom. 49. 50. Lacertinaria Linn. Syst. Phal. 204.

3. Verein, Coitus 3.

Teratopteriden, Teratopterides.

Die Senken theils stumpf, seitwärts fast geschwänzt; alle Flügel wolkig.

1583. Teratopteris Harpago. Angulata Cram. 61. E. Argulata Fabr. Mant. Bom. 29.

5. Stamm, Stirps V.

Echidnen, Echidnae.

Der Leib klein; die Flügel groß, sonderbar gezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Geschwänzte, Caudatae.

Die Senken geschwänzt; die Schwingen mit einem durchsichtigen Mittefleck gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Dysdämonien, Dysdaemoniae.

Die Schwingen eckig und buchtig; die Senken von ihrer Mitte her stumpf geschwänzt.

1584. Dysdaemonia Boreas Cram. 70. B.

2. Verein, Coitus 2.

Eudämonien, Eudaemoniae.

Die Senken vom Aftereck aus sehr lang, ruderförmig geschwänzt.

1585. Eudaemonia Semiramis Cram. 13. A.

586. E. Uroarge. Argus Stoll. 27. 1.

3. Verein, Coitus 3.

Tropäen, Tropaeae.

Die Senken vom Aftereck aus breit und lang krumm geschwänzt. Alle Flügel mit einem breitlich runden Fleck geziert.

1587. Tropaea Luna Linn. Syst. Phal. 5. Cram. 2. A.

1588. T. Selene. Luna Cram. 31. B. A. Hübn. Lep. Echid. caud. Selene.

Zweyte Familie, Familia B.

Mondfleckige, Lunatae.

Die Senken gerundet; beyderley Flügel mit einem großen durchsichtigen Mondfleck geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Antheräen, Antheraeae.

Die Schwingen fast sichelförmig; mit einem rundlich langen färbig eingefaßten Mondfleck geziert, wie auch die Senken.

1589. Antheraea Mylitta Drur. Ins. II. 5. 1. Paphia Cram. 146. A.

1590. A. Paphia Linn. Syst. Phal. 4. Cram. 148. A. & 147. A. B.

1591. A. Jana Cram. 396. A.

2. Verein, Coitus 2.

Aglien, Agliae.

Die Flügel fast gemeinförmig, mit einem rundlichen Mondfleck geziert.

1592. Aglia Tau Linn. Syst. Phal. 8. Hübn. Bom. 51. 52.

1593. A. Cytherea Fabr. Syst. Bom. 5. Cram. 302. A. B. Hübn. Lep. Echid. comm. Cytherea.

1594. A. Tirrhaea Cram. 46. A.

Dritte Familie, Familia C.

Gemeinförmig, Communiformes.

Die Flügel gemeinförmig; unterschieden gezeichnet und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Dirphyen, Dirphyae.

Die Schwingen im Mitteraume mit einem gabligen weißen Strich bezeichnet.

1595. Dirphia Tarquinia. Tarquinius Cram. 4. B. C. & Tarquinia A. Hübn. Lep. Echid. comm. Tarquinius & Tarpejus.

1596. D. Acidalia. Tarquinia Cram. 367. F.

1597. D. Speciosa Cram. 107. B.

1598. D. Agis Cram. 30. F.

2. Verein, Coitus 2.

Citheronien, Citheroniae.

Die Schwingen ziemlich schmal, die Senken kurz; beyderley blaß gefleckt.

1599. Citheronia Regia Abb. Lep. 61. Regalis Fabr. Ent. Bom. 93. Laocoon Stoll. 42. 2. Cram. 117. B. C.

1600. C. Anassa. Laocoon Cram. 117. A.

1601. C. Phoronea Cram. 239. C. & A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Eaclen, Eaclae.

Die Flügel ziemlich groß, gemeinförmig; mit einem weißen Mittepunkt und einem gemeinschaftlichen dunklen Streif gezeichnet.

1602. Eacles Imperatoria Abb. Lep. 55. Imperialis Stoll. 42. 1.

1603. E. Penelope Cram. 45. A.

1604. E. Acheloë. Achelous Cram. 111. A.

1605. E. Cynira Cram. 152. C.
1606. E. Eulalia Stoll. 12. 2.

Vierte Familie, Familia D.
Verbergende, Recondentes.

Die Schwingen unten, die Senken oben mit einem zierlichen Fleck gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Imbrasien, Imbrasiae.

Die Schwingen fast gesichelt; die Senken spitzeckig; erstere mit einem durchsichtigen Zeichen, leztere mit einem rundlichlangen färbigen Fleck geziert.

1607. Imbrasia Epimethea Cram. 176. A.

2. Verein, Coitus 2.
Bunäen, Bunaeae.

Die Senken rundlich; die Schwingen mit einem durchsichtigen Fleckgen, die Senken mit einem färbigen Fleck geziert.

1608. Bunaea Caffra. Caffraria Stoll. 31. 2. 2. C.
1609. B. Alcinoe Cram. 322. A. B.

3. Verein, Coitus 3.
Teleen, Teleae.

Die Schwingen buchtig mit einem einfachen, die Senken mit einem zusammengesezten zierlichen Fleck gezeichnet.

1610. Telea Polypheme. Polyphemus Cram. 5. A. B.

4. Verein, Coitus 4.
Automeren, Automeres.

Die Schwingen unten, die Senken oben mit einem Pfauenfleck geziert.

1611. Automeris Janus Cram. 64. A. B.

1612. A. Armidia Cram. 356. A.
1613. A. Salmonea Cram. 162. A. & 395. A.
1614. A. Liberia Cram. 268. F. G.
1615. A. Irene Cram. 249. B. C.
1616. A. Jucunda Cram. 249. A. & 356. B. C.
1617. A. Egeas Cram. 64. C.
1618. A. Metea Cram. 304. A.
1619. A. Arminia Cram. 356. D.

5. Verein, Coitus 5.

Gamelien, Gameliae.

Die Schwingen sehr merklich geschnäbelt; und die Senken nur oben mit einem Pfauenfleck geziert.

1620. Gamelia Abasia Cram. 344. B. C. & A.
1621. G. Abas Cram. 77. A. B.
1622. G. Irmina Cram. 355. C. D.

6. Verein, Coitus 6.

Hyperchirien, Hyperchiriae.

Die Schwingen schartig; nur die Senken oben groß-äugig bezeichnet.

1623. Hyperchiria Nausica Cram. 303. B. C. & 249. D. E.
1624. H. Jo Cram. 303. F. G. & D. E.

Fünfte Familie, Familia E.

Gespiegelte, Speculares.

Die Flügel sehr lang und sonderbar geformt, die Schwingen am Ende mit augenähnlichen Fleckgen gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Attacen, Attaci.

Die Flügel im Mitteraume mit einem großen eckigen durchsichtigen Fleck geziert.

1625. Attacus Atlas Linn. Syst. Phal. 1. Cram. 381. C. 382. A.

1626. A. Talas. Atlas Cram. 9. A.

1627. A. Aurota Cram. 8. A.

1628. A. Hesperus Linn. Syst. Phal. 2. Cram. 68. A.

2. Verein, Coitus 2.

Samien, Samiae.

Die Mittezierde aller Flügel sehr nachläßig, aber am Ende der Schwingen ein deutliches schwarzes Augenfleckgen.

1629. Samia Cynthia Cram. 39. A.

1630. S. Cecropia Cram. 42. A. B.

1631. S. Promethea Cram. 76. A. B. & 75. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Rhescynten, Rhescyntes.

Die Schwingen nur am Ende zierlich zackenstriemig.

1632. Rhescyntis Erythrinae Fabr. Spec. Bom. 9. Armida Cram. 197. A.

1633. R. Cassandra Cram. 197. B.

1634. R. Sylla Cram. 240. A.

1635. R. Hippodamia Cram. 126. B.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Wahre, Verae.

Der Kopf und der Rumpf sehr weich und artig behaart; die Schwingen kaum bunter als die Senken.

1. Stamm, Stirps I.

Heräen, Heraeae.

Der Hals weißlich gefärbt; die Flügel mit großen zierlichen Flecken besezt.

Erste Familie, Familia A.
Ansehnliche, Speciosae.

Beyderley Flügel mit einem Pfauenfleck geziert.

1. Verein, Coitus 1.
Pavonien, Pavoniae.

Die Schwingen am Ende blutroth befleckt; alle vier Flügel mit gleichen, blosen Pfauenflecken geziert.

1636. Pavonia Pyri Schiff. Verz. Bom. B. 1. Major Linn. Syst. Phal. 7. Hübn. Bom. 56.

1637. P. Spini Schiff. Verz. Bom. B. 2. Media Esp. Bom. 3. 1. Hübn. Bom. 55.

1638. P. Carpini Schiff. Verz. Bom. B. 3. Minor Linn. Syst. Phal. 7. Hübn. Bom. 53. 54.

2. Verein, Coitus 2.
Heniochen, Henioche.

Die Flügel mit ungleich. dreyfach umringten Pfauenflecken geziert.

1639. Heniocha Appollonia Cram. 250. A.

Zweyte Familie, Familia B.
Scheinbare, Dilucidae.

Die Schwingen mit einem zierlichen Fleck ausgezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Saturnien, Saturniae.

Die Schwingen mit einem breitlich runden, schwarzen, durchsichtig bezeichneten Mittefleck geziert.

1640. Saturnia Maja Drur. II. 24. 3. Proserpina Fabr. Syst. Bom. 17.

2. Verein, Coitus 2.
Parathyriden, Pharathyrides.

Die Schwingen zierlich kahl gefleckt; die Senken ungefleckt.

1641. Parathyris Perspicilla Stoll. 16. 3.
1642. P. Cedonulli Cram. 346. A. B.
1643. P. Pandiona Cram. 397. J.

2. Stamm, Stirps II.

Hypogymnien, Hypogymniae.

Die Flügel fast haarförmig beschüppt und unscheinbar gezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Schmalschüppige, Subsquammatae.

Die Flügel ohne alle zierliche Zeichnung.

1. Verein, Coitus 1.

Lipariden, Liparides.

Alle Flügel sparsam beschüppt, einfärbig.

1644. Liparis Morio Linn. Syst. Phal. 66. Hübn. Bom. 231. 232.
1645. L. Eleuteria Stoll. 36. 12.
1646. L. Diaphane Cram. 360. A.
1647. L. Spectra. Festiva Cram. 71. C.

2. Verein, Coitus 2.

Ocneriен, Ocneriae.

Die Schwingen mit trüben Mittezeichen und Wellenlinien gezeichnet.

1648. Ocneria Rubea Schiff. Verz. Bom. C. 2. Hübn. Bom. 240. 61.
1649. O. Detrita Esp. Bom. 44. 6. Hübn. Bom. 58. 59.
1650. O. Pilumnia Cram. 307. D.

3. Verein, Coitus 3.

Paidien, Paidiae.

Klein; die Flügel beyderley mit einem dunklen Mittezeichen und Punkten bezeichnet; bräunlich weiß.

1651. Paidia Murina Hübn. Beitr. II. 3. K. 2. Bom. 62.

1652. P. Senex Hübn. Bom. 236. 237.

1653. P. Munda. Mundana Linn. Syst. Phal. 17. Hübn. Bom. 63. 64. Demarriana Cram. 360. M.

1654. P. Sulphurea. Sulphuralis Cram. 348. E. & Lepidaria 371. K.

3. Stamm, Stirps III.

Leucomen, Leucomae.

Alle Glieder fast zeichenlos, schittern weiß bekleidet.

Erste Familie, Familia A.

Weise, Albae.

Die Flügel kaum gezeichnet; ziemlich rein weiß.

1. Verein, Coitus 1.

Larien, Lariae.

Die Ohren braun gefiedert; die Stützen schwarz gezeichnet.

1655. Laria Salicis Linn. Syst. Phal. 46. Hübn. Bom. 70.

1656. L. Nivosa Schiff. Verz. Bom. D. 1. V nigrum Fabr. Syst. Bom. 73. Hübn. Bom. 71.

1657. L. Candida. Nivea Cram. 321. B.

1658. L. Begga Cram. 355. A.

1659. L. Caenosa Hübn. Bom. 218.

2. Verein, Coitus 2.

Euprocten, Euproctes.

Die Flügel sehr sparsam bezeichnet; die Streichler und der After färbig.

1660. Euproctis Auriflua Schiff. Verz. Bom. D. 4. Hübn. Bom. 68. 69.

1661. E. Chrysorrhoea Linn. Syst. Phal. 45. Hübn. Bom. 67.

1662. E. Argyrorrhoea.

Zweite Familie, Familia A.

Gewellte, Undatae.

Die Flügel mit schwarzen wellenförmigen Strichen gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Porthetrien, Porthetriae.

Die Männer klein; deren Flügel breit; die Schwingen mit einem winkligen schwarzen Mittezeichen bezeichnet.

1663. Porthetria Lunatra. Lunata Cram. 369. C.

1664. P. Dispar Linn. Syst. Phal. 44. Hübn. Bom. 75. 76.

1665. P. Beatrix Stoll. 40. 2.

1666. P. Brotea Cram. 322.

2. Verein, Coitus 2.

Lymantrien, Lymantriae.

Der Leib gezeichnet; der Wanst fast buntfärbig.

1667. Lymantria Monacha Linn. Syst. Phal. 43. Hübn. Bom. 74.

1668. L. Eremita Hübn. Bom. 246.

3. Verein, Coitus 3.

Epicomen, Epicomae.

Die Flügel ziemlich groß; die Schwingen mit einem schwarzen Mittefleck und Randfleckgen bezeichnet; die Senken gelb und schwarz.

1669. Epicoma Tristis Zutr. 217. 218.

1670. E. Dubia Hübn. Bom. 261.

4. Stamm, Stirps IV.

Dasychiren, Dasychirae.

Die Schwingen mit einem blassen Mittefleck, schattigen Bändern und düsteren Wellenlinien gezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Buntfärbige, Coloratae.

Die Männer breitflüglig, buntfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Gynäphoren, Gynaephorae.

Die Schwingen am Eck mit einem weißen Fleck bezeichnet.

1671. Gynaephora Antiqua Linn. Syst. Phal. 56. & Gonostigma 57. Hübn. Bom. 77. 235.

1672. G. Recens Linn. Syst. Phal. 57. p. 811. Gonostigma Esp. Bom. 56. 6. Hübn. Bom. 78.

1673. G. Netrix Cram. 307. B.

1674. G. Selenitica Esp. Bom. 88. 2. Hübn. Bom. 79. 80.

1675. G. Altrix Cram. 307. E.

Zweyte Familie, Familia B.

Weißlichgraue, Canescentes.

Die Schwingen schwärzlich und weißlich gezeichnet, grau gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Orgyjen, Orgyjae.

Beyde Geschlechter ziemlich gleichend gemeinförmig, die Schwingen wolkig angelegt.

1676. Orgyja Fascelina Linn. Syst. Phal. 55. Hübn. Bom. 81.

1677. O. Achatina Abb. Lepid. 77.

1678. O. Tephra Hübn. Dasyc. vulg. Tephra.

1679. O. Abietis Schiff. Verz. Bom. G. 2. Hübn. Bom. 82. 83.

1680. O. Pudibunda Linn. Syst. Phal. 54. Hübn. Bom. 84. 85.

5. Stamm, Stirps V.

Melalophen, Melalophae.

Der Kopf und der Rücke sammtähnlich schwarz behaart; die Schwingen mit blassen Linien bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Gewisse, Certae.

Die Schwingen aussen fast bunt gezeichnet und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Pygären, Pygaerae.

Die Schwingen am Ende fast spitzeckig; die Senken auch bezeichnet.

1681. Pygaera Timon Hübn. Bom. 86.

1682. P. Torrefacta Abb. Lepidopt. 76.

2. Verein, Coitus 2.

Ichthyuren, Ichthyurae.

Die Flügel rundlich; die Afterklappen fischschwanzähnlich.

1683. Ichthyura Anastamosis Linn. Syst. Phal. 53. Hübn. Bom. 87.

1684. I. Curtula Linn. Syst. Phal. 52. Hübn. Bom. 89.

1685. I. Anachoreta Schiff. Verz. Bom. H. 3. Hübn. Bom. 88.

1686. I. Reclusa Schiff. Verz. Bom. H. 4. Hübn. Bom. 90.

6. Stamm, Stirps VI.

Lithosien, Lithosiae.

Der Rüssel merklich lang; die Streichler desgleichen nnd glatt; die Ohren fast borstengleich. Die Flügel sehr sparsam ausgezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Schabenähnliche, Tineiformes.

Die Schwingen schmal und lang, die Senken breit und kurz.

1. Verein, Coitus 1.

Setinen, Setinae.

Klein, schabenähnlich, weißlichgrau.

1687. Setina Sembris. Hübn. Bom. 222.

1688. S. Ephemera. Ephemerella Schiff. Verz. Tin. D. 9. Hübn. Bom. 66.

2. Verein, Coitus 2.

Achroten, Achroiae.

Die Schwingen bräunlichgrau; die Senken bräunlichweiß.

1689. Achroia Cinercola Hübn. Bom. 91.

1690. A. Petreola. Petronella Cram. 372. R.

1691. A. Saxeola Hübn. Zutr. 141. 142.

3. Verein, Coitus 3.

Ethmien, Ethmiae.

Die Schwingen mit schwarzen Punkten besezt, grünlich glänzend grau gefärbt; der Wanst röthlichgelb.

1692. Ethmia Pyrausta Pall. Reis. I. Anh. 20.

4. Verein, Coitus 4.

Apistosien, Apistosiae.

Die Schwingen düster, die Senken schattig gefärbt. Der Kopf, Rumpf oder Wanst rostgelb ausgezeichnet.

1693. Apistosia Judas Hübn. Zutr. 51. 52.

1694. A. Umber Cram. 15. F.
1695. A. Liboria Cram. 345. D.

5. Verein, Coitus 5.

Trichromien, Trichromiae.

Die Schwingen am Ende bleich, sonst düstern gefärbt.

1696. Trichromia Capyia. Capys Cram. 56. E.
1697. T. Onytes Cram. 165. E.

6. Verein, Coitus 6.

Atolmen, Atolmes.

Die Flügel ganz graulich schwarz; desgleichen auch die Stützen.

1698. Atolmis Rubricollis Linn. Syst. Phal. 113. Hübn. Bom. 94.
1699. A. Flavicapilla.

7. Verein, Coitus 7.

Asoten, Asotae.

Alle Flügel braun, aussen blaß gefärbt; die Schwingen mit weißen Fleckgen und schwarzen Punkten gezeichnet.

1700. Asota Jabensis. Javana Cram. 274. C.
1701. A. Zatima Cram. 381. F.

Zweyte Familie, Familia B.

Zünslerähnliche, Pyraliformes.

Die Schwingen sehr schmal und stumpf; die Senken sehr breit und schief.

1. Verein, Coitus 1.

Eligmen, Eligmae.

Die Schwingen ganz bunt angelegt; die Senken nur am Ende ausgezeichnet.

1702. Eligma Narcissis Cram. 73. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Oeonisten, Oeonistes.

Die Schwingen wenig gezeichnet; die Senken gänzlich zeichenlos.

1703. Oeonistis Entelliola. Entella Cram. 208. D.

1704. O. Quadra Linn. Syst. Phal. 114. Hübn. Bom. 101. 102.

3. Verein, Coitus 3.

Pelosien, Pelosiae.

Die Schwingen am Senenrande rostig, übrigens lehmfärbig; die Senken blaß.

1705. Pelosia Muscerda Hufn. Verz. 73. Hübn. Bom. 103. Pudorina Esp. Noc. 47. 4. 5. Perlella Fabr. Ent. Tin. 21.

1706. P. Helveola Ochs. Schm. 37. 6. Hübn. Bom. 95.

1707. P. Depressa Esp. Noc. 14. 3. Ochreola Hübn. Bom. 96.

1708. P. Griseola. Hübn. Bom. 97.

1709. P. Plumbeola. Complana Linn. Syst. Phal. 115. Hübn. Bom. 100.

4. Verein, Coitus 4.

Eilemen, Eilemae.

Die Schwingen fast einfärbig; die Senken am Senenrande schwärzlich gefärbt.

1710. Eilema Caniola Hübn. Bom. 220.

1711. E. Paleola Hübn. Bom. 221.

1712. E. Unita Schiff. Verz. Noc. C. 2. Hübn. Bom. 93.

1713. E. Luteola Schiff. Verz. Noc. C. 3. Lutosa Esp. Noc. 14. 8. 9. Lutarella Linn. Syst. Phal. 155. Hübn. Bom. 92.

5. Verein, Coitus 5.

Systrophen, Systrophae.

Beyderley Flügel fast gleicher Färbung.

1714. Systropha Aureola Hübn. Bom. 98. Unita Esp. Noc. 14. 6. 7.

1715. S. Cereola Hübn. Bom. 99.

1716. S. Cygneola.

Dritte Familie, Familia C.

Spannerförmige, Geometriformes.

Die Flügel beyderley ziemlich breit und lang, auch bunt gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Tyrien, Tyriae.

Die Schwingen dunkel gefärbt, hell gefleckt; die Senken blaß.

1717. Tyria Jacobaeae. Linn. Syst. Phal. 111. Hübn. Bom. 112.

1718. T. Modesta Cram. 115. C.

2. Verein, Coitus 2.

Ophthalmiden, Ophthalmides.

Die Schwingen fast äugig gezeichnet; die Senken nur blaßfärbig.

1719. Ophthalmis Lincea Cram. 228. B.

1720. O. Punctigera Linn. Syst. Phal. 15. Hilaria Cram. 113. F.

1721. O. Phedonia Cram. 347. C.

3. Verein, Coitus 3.

Miltochristen, Miltochristae.

Die Schwingen zart schwarz gezeichnet, die Senken zeichenlos, beyderley roth.

1722. Miltochrista Rubicunda Schiff. Verz. Noc. C. 10. Rosea Fabr. Syst. Bom. 109. Hübn. Bom. 111.

4. Verein, Coitus 4.

Cybosien, Cybosiae.

Die Schwingen mit schwarzen Punkten bemerkt, färbig gerändet; die Senken grau.

1723. Cybosia Eborina Schiff. Verz. Noc. C. 5. Eborea Esp. Noc. 14. 4. 5. Mesomella Linn. Syst. Phal. 356. Hübn. Bom. 266. & 104.

5. Verein, Coitus 5.

Endrosen, Endrosae.

Alle Flügel mit schwarzen Punkten auf den Senen bezeichnet.

1724. Endrosa Roscida Schiff. Verz. Noc. C. 7. Hübn. Bom. 106. 107.

1725. E. Aurita Esp. Noc. 15. 1. 2. Irrorella Sulz. Gesch. 23. 10. Hübn. Bom. 108.

1726. E. Ramosa Fabr. Ent. Bom. 179. Hübn. Bom. 109. 110.

6. Verein, Coitus 6.

Mänaden, Maenades.

Die Schwingen den Senen nach zusammenhängend gefleckt.

1727. Maenas Vocula Stoll. 31. 5.

1728. M. Zaide Stoll. 36. 6.

7. Verein, Coitus. 7.

Arginen, Arginae.

Die Schwingen mit blaß und schattig umringten Punkten gezeichnet; die Senken gefleckt.

1729. Argina Pylotis Fabr. Syst. Bom. 100. Cribraria Cram. 208. G. Hübn. Hipocr. sup. Pylotis.

1730. A. Crotalariae Fabr. Syst. Bom. 90. Syringa Cram. 5. C. D.

Vierte Familie, Familie D.
Gemeine, Vulgares.

Die Schwingen schmal, einfältig bezeichnet; die Senken breit, nachläßig gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.
Utetheisen, Utetheisae.

Die Schwingen mit schwarzen und rothen Fleckgen bezeichnet; die Senken fleckig gesäumt.

1731. Utetheisa Bella Linn. Syst. Phal. 348. Cram. 109. C. D.

1732. U. Ornatrix Linn. Syst. Phal. 110. Cram. 166. C. D.

1733. U. Pulchra Schiff. Verz. Noc. C. 9. Pulchella Linn. Syst. Phal. 349. Hübn. Bom. 113.

2. Verein, Coitus 2.
Crameren, Crameriae.

Der Rumpf und die Schwingen in schwarzem Grund goldroth und weiß gefleckt.

1734. Crameria Amabilis Drur. II. 13. 3.

1735. C. Nobilis. Nobilitella Cram. 264. G.

1736. C. Cloeckneri Cram. 348. A.

1737. C. Subtilis. Punctella Cram. 372. L. Pastulella Fabr. Mant. Tin. 16.

3. Verein, Coitus 3.
Coracien, Coraciae.

Die Flügel beyderley schwarz.

1738. Coracia Lugubris Hübn. Bom. 17. 4.

1739. C. Ciliaris Ochs. Schm. 17. 4. Hübn. Bom. 216.

4. Verein, Coitus 4.
Cosciniен, Cosciniae.

Die Schwingen mit schwarzen Punkten an der Quersene und dem Franzenrande bezeichnet.

1740. Coscinia Chrysocephala Hübn. Bom. 251.

1741. C. Cyrilli. Candida Cyr. Ent. 18. Hübn. Bom. 19.

1742. C. Cribrum Linn. Syst. Phal. 76. Hübn. Bom. 120. 121.

5. Verein, Coitus 5.

Spiriden, Spiriden.

Die Schwingen auf und zwischen den Senen schwarz gestricht; die Senken gelb.

1743. Spiris Grammica Linn. Syst. Phal. 75. Hübn. Bom. 122. 123.

6. Verein, Coitus 6.

Diacrisien, Diacrisiae.

Alle Flügel mit einem schwärzlich rothen Fleckgen bezeichnet und roth gesäumt.

1744. Diacrisia Russula Linn. Syst. Phal. 71. Hübn. Bom. 124. 125.

7. Stamm, Stirps VII.

Hypocriten, Hipocritae.

Die Streichler schmal, ziemlich lang; die Schwingen lang, die Senken kurz.

Erste Familie, Familia A.

Schwärmerförmige, Sphingiformes.

Die Flügel ziemlich klein, fast lanzenförmig, sehr unterschieden.

1. Verein, Coitus 1.

Creatonoten, Creatonota.

Der Leib auf dem Rücken gänzlich fleischroth; die Schwingen schwarz gezeichnet.

1745. Creatonotos Interrupta Linn. Syst. Phal. 116. Sulz. Ges. 22. 3. Francisca Fabr. Ent. Bom. 228.

1746. C. Psamas Cram. 234. G.

2. Verein, Coitus 2.

Empusen, Empusae.

Der Leib buntfärbig; die Schwingen blaß und braun angelegt.

1747. Empusa Admirabilis Cram. 103. G.

1748. E. Vitrea Cram. 276. C.

1749. E. Lutosa.

1750. E. Hippia Stoll. 12. 8.

1751. E. Tybris Cram. 92. D.

1752. E. Scyton Cram. 99. B.

3. Verein, Coitus 3.

Halysidoten, Halysidotae.

Die Schwingen kettenähnlich lehmbraun gezeichnet, blaßgelb gefärbt.

1753. Halisidota Tesselaris Abb. Lep. 75.

1754. H. Catenula. Hübn. Hipocr. glauc. Catenulata.

1755. H. Alsus Cram. 113. E.

4. Verein, Coitus 4.

Cacoethen, Cacoethae.

Die Flügel blaßfleckig, brandfärbig; der Wanst blaßrändig.

1756. Cacoethes Polidamon Cram. 237. B.

5. Verein, Coitus 5.

Automolen, Automoles.

Die Flügel röthlich roſtgelb und ſchwarzſtreifig angelegt.

1757. Automolis Sypilus Cram. 99. A.

1758. A. Meteus Cram. 347. B.
1759. A. Bifascia. Bifasciata Cram. 252. F.
1760. A. Justina Cram. 383. E.

6. Verein, Coitus 6.

Caryatiden, Caryatides.

Die Schwingen schief bandirt; die Senken gesäumt.

1761. Caryatis Rutila. Rutilus Cram. 382. B.
1762. C. Phileta Drur. III. 22. 5.

7. Verein, Coitus 7.

Dysauxen, Dysauxae.

Die Schwingen blaß gefleckt, braun gefärbt; die Senken gelb.

1763. Dysauxes Ancilla Linn. Syst. Phal. 93. Obscura Fabr. Mant. Bom. 217. Hübn. Bom. 114 & 225.
1764. D. Confamula. Hübn. Bom. 226. 227. Punctata Fabr. Spec. Bom. 157.

8. Verein, Coitus 8.

Zatrephen, Zatrephae.

Die Schwingen blaß gefleckt, roth besprengt; die Senken blaßroth.

1765. Zatrephes Nitida Cram. 274. F.
1766. Z. Crocas Cram. 126. E.
1767. Z. Hermia Cram. 185. F.
1768. Z. Sanguinolenta Cram. 252. A.
1769. Z. Dorothea Cram. 397. K.
1770. Z. Ilus Cram. 92. E.

9. Verein, Coitus 9.

Pelochyten, Pelochytae.

Die Flügel lehmfärbig; der Rumpf und Wanst mit schwarzen Punkten bezeichnet.

1771. Pelochyta Arontes Cram. 382. E.
1772. P. Vidua Cram. 264. C.
1773. P. Helops Cram. 72. C.

10. Verein, Coitus 10.

Rhodogastrien, Rhodogastriae.

Die Flügel schattig blaß gefärbt; der Wanst rosenroth.

1774. Rhodogastria Melanthus Cram. 286. B.
1775. R. Mauritia Cram. 345. B.
1776. R. Amasis Cram. 206. B.

11. Verein, Coitus 11.

Hypsen, Hypsae.

Die Schwingen an ihrer Wurzel mit schwarzen Punkten bemerkt; die Senken schattig grau gesäumt.

1777. Hypsa Silvandra Cram. 369. D.
1778. H. Heliconia Linn. Syst. Phal. 112. Esp. Noc. 60. 5.
1779. H. Monycha Cram. 131. C.

12. Verein, Coitus 12.

Damaliden, Damalides.

Die Schwingen nächst ihrer Wurzel gelb und schwarz gezeichnet; die Senken gelb, schwarz gefleckt.

1780. Damalis Caricae Fabr. Syst. Noc. 23. Alciphron Cram. 133. E. Hübn. Hypocr. vulg. Caricae.
1781. D. Ficus Fabr. Syst. Noc. 22. Alciphron Cram. 262. A. B.

13. Verein, Coitus 13.

Euplocien, Euplociae.

Die Flügel beyderley am Rande weiß gesent und gefältelt.

1782. Euplocia Membliare. Mempliaria Cram. 269. C. D.

14. Verein, Coitus 14.

Neocheren, Neocherae.

Die Flügel weiß, ansehnlich schwarz gefleckt; der Leib jedoch gelb gefärbt.

1783. Neochera Eugenia Cram. 398. M.

1784. N. Dominia Cram. 263. A. B.

15. Verein, Coitus 15.

Chalcosien, Chalcosiae.

Der Leib metallfärbig; desgleichen die Schwingen den Senen nach.

1785. Chalcosia Pectinicornis Linn. Syst. Sph. 44.
Tiberina Cram. 32. C. D.

1786. C. Hesperina. Hesparia Cram. 56. C.

16. Verein, Coitus 16.

Eudmoen, Eudmoae.

Die Schwingen den Senen nach und schief gestricht; der Wanst auf dem Rücken roth.

1787. Eudmoe Delumbis. Arné Cram. 15. E.

17. Verein, Coitus 17.

Melanchroien, Melanchroiae.

Die Flügel schwarz, theils weißlich gesent, weiß gefleckt und gefränzt.

1788. Melanchroia Leontia Stoll. 34. 6.

1789. M. Cephise Cram. 381. E.

1790. M. Aterea Cram. 370. F.

1791. M. Ernestina Cram. 369. F.

8. Stamm, Stirps VIII.

Callimorphen, Callimorphae.

Der Leib zierlich bunt gestreift; die Flü gel unterschieden gezeichnet und gefärbt.

Beyderley Flügel fast gleicher Färbung.

1714. Systropha Aureola Hübn. Bom. 98. Unita Esp. Noc. 14. 6. 7.

1715. S. Cereola Hübn. Bom. 99.

1716. S. Cygneola.

Dritte Familie, Familia C.

Spannerförmige, Geometriformes.

Die Flügel beyderley ziemlich breit und lang, auch bunt gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Tyrien, Tyriae.

Die Schwingen dunkel gefärbt, hell gefleckt; die Senken blaß.

1717. Tyria Jacobaeae. Linn. Syst. Phal. 111. Hübn. Bom. 112.

1718. T. Modesta Cram. 115. C.

2. Verein, Coitus 2.

Ophthalmiden, Ophthalmides.

Die Schwingen fast äugig gezeichnet; die Senken nur blaßfärbig.

1719. Ophthalmis Lincea Cram. 228. B.

1720. O. Punctigera Linn. Syst. Phal. 15. Hilaria Cram. 113. F.

1721. O. Phedonia Cram. 347. C.

3. Verein, Coitus 3.

Miltochristen, Miltochristae.

Die Schwingen zart schwarz gezeichnet, die Senken zeichenlos, beyderley roth.

1722. Miltochrista Rubicunda Schiff. Verz. Noc. C. 10. Rosea Fabr. Syst. Bom. 109. Hübn. Bom. 111.

4. Verein, Coitus 4.

Cybosien, Cybosiae.

Die Schwingen mit schwarzen Punkten bemerkt, färbig gerändet; die Senken grau.

1723. Cybosia Eborina Schiff. Verz. Noc. C. 5. Eborea Esp. Noc. 14. 4. 5. Mesomella Linn. Syst. Phal. 356. Hübn. Bom. 266. & 104.

5. Verein, Coitus 5.

Endrosen, Endrosae.

Alle Flügel mit schwarzen Punkten auf den Senen bezeichnet.

1724. Endrosa Roscida Schiff. Verz. Noc. C. 7. Hübn. Bom. 106. 107.

1725. E. Aurita Esp. Noc. 15. 1. 2. Irrorella Sulz. Gesch. 23. 10. Hübn. Bom. 108.

1726. E. Ramosa Fabr. Ent. Bom. 179. Hübn. Bom. 109. 110.

6. Verein, Coitus 6.

Mänaden, Maenades.

Die Schwingen den Senen nach zusammenhängend gefleckt.

1727. Maenas Vocula Stoll. 31. 5.

1728. M. Zaide Stoll. 36. 6.

7. Verein, Coitus. 7.

Arginen, Arginae.

Die Schwingen mit blaß und schattig umringten Punkten gezeichnet; die Senken gefleckt.

1729. Argina Pylotis Fabr. Syst. Bom. 100. Cribraria Cram. 208. G. Hübn. Hipocr. sup. Pylotis.

1730. A. Crotalariae Fabr. Syst. Bom. 90. Syringa Cram. 5. C. D.

Erste Familie, Familia A.

Gläsige, Vitreae.

Die Flügel großentheils durchsichtig, übrigens braun.

1. Verein, Coitus 1.

Diopten, Dioptes.

Die Flügel beyderley durchsichtig und gelb gefleckt.

1792. Dioptis Cyma. Hübn. Zutr. 17. 18.
1793. D. Meone Cram. 71. F.
1794. D. Perdica Cram. 178. E.

2. Verein, Coitus 2.

Hyalurgen, Hyalurgae.

Die Flügel ganz fensterähnlich; der Leib zierlich gezeichnet.

1795. Hyalurga Fenestrigera. Fenestrata Linn. Syst. Phal. 9. Egeon Cram. 59. B.

3. Verein, Coitus 3.

Hyelosien, Hyelosiae.

Die Schwingen theilweise, die Senken gänzlich durchsichtig gefeldet.

1796. Hyelosia Pyrrhorhoea. Hübn. Zutr. 43. 44.
1797. H. Clio. Tiresias Cram. 400. B.
1798. H. Diaphane. Diaphana Drur. III. 22. 4.
1799. H. Aglaura Cram. 263. F.

4. Verein, Coitus 4.

Cistidien, Cistidiae.

Der Krage gelb; die Flügel bandweiße durchsichtig; der Wanst gelb geringt.

1800. Cystidia Stratonice Cram. 398. K.

5. Verein, Coitus 5.

Dysphanien, Dysphaniae.

Der Leib trübgelb geringt; die Flügel bandweise trüb durchsichtig gefleckt.

1801. Dysphania Numenia. Numana Cram. 227. A. & 228. A.

1802. D. Cyane Cram. 267. D.

6. Verein, Coitus 6.

Euschematen, Euschemates.

Der Leib fast ganz gelb; die Flügel mit ziemlich durchsichtigen blauen Flecken besezt.

1803. Euschema Militaris Linn. Syst. Phal. 12. Cram. 29. B. Roes. IV. 6. 3.

1804. E. Palmyra Stoll. 36. 1.

7. Verein, Coitus 7.

Dysschematen, Dysschemates.

Die Flügel mit bandähnlichen blaßfärbigen Flecken und weißen Randpunkten gezeichnet.

1805. Dysschema Tiresias Cram. 85. A.

1806. D. Hypoxantha Hübn. Zutr. 191. 192.

1807. D. Catilina Cram. 79. E. F.

Zweyte Familie, Familia B.

Bunte, Variegatae.

Die Flügel buntfärbig gefleckt; desgleichen der Leib.

1. Verein, Coitus 1.

Pericopiden, Pericopides.

Beyderley Flügel bandähnlich bunt gefleckt, und mit weißen Punkten besezt.

1808. Pericopis Zerbina Stoll. 40. 3. 3. A.

1809. P. Eurocilia Cram. 178. C.
1810. P. Turbida. Tricolora Cram. 263. E.
1811. P. Tricolora Sulz. Gesch. 22. 5.

2. Verein, Coitus 2.

Josien, Josiae.

Die Flügel rostfärbig gestreift; der Wanst desgleichen.

1812. Josia Megaera. Hübn. Hypocr. tin. Megaera.
1813. J. Ligula. Hübn. Hypocr. tin. Ligula. Fulvia Cram. 251. F. Jesuita Fabr. Ent. Bom. 229.

3. Verein, Coitus 3.

Phäochlänen, Phaeochlaenae.

Die Schwingen braun, blaß bandähnlich gezeichnet; die Senken im innern rostgelb.

1814. Phaeochlaena Privigna Hübn. Zutr. 195. 196.
1815. P. Priverna Cram. 166. E.
1816. P. Tendinosa Hübn. Zutr. 89. 90.
1817. P. Mononeura Hübn. Hypocr. tin. Mononeura.
1818. P. Medarda Cram. 345. F.

4. Verein, Coitus 4.

Ephialtien, Ephialtiae.

Die Flügel bandähnlich bunt gefleckt, in schwarzem Grunde.

1819. Ephialtias Monilis Hübn. Hypocr. tin. Monilis.
1820. E. Abrupta. Hübn. Hypocr. tin. Abrupta.

5. Verein, Coitus 5.

Epidesmen, Epidesmae.

Die Schwingen ausserhalb mit einem rostgelben Bande geziert.

1821. Epidesma Pyrrho. Glauca Cram. 368. D.
1822. E. Ursula Cram. 345. E.

1823. E. Militta Cram. 370. I.
1824. E. Caenea Drur. III. 21. 3.

6. Verein, Coitus 6.

Leucopsumiden, Leucopsumides.

Der Kopf nnd Hals röthlich gelb; die Schwingen mit einem bandähnlichen weißen Fleck beſezt.

1825. Leucopsumis Collaris Drur. III. 21. 2.
1826. L. Circe Cram. 263. D. 274. E.
1827. L. Glaucopis Cram. 322. D.

7. Verein, Coitus 7.

Calodesmen, Calodesmae.

Die Flügel gemeinſchaftlich purroth bandirt.

1828. Calodesma Amica Cram. 370. H.

8. Verein, Coitus 8.

Agyrten, Agyrtae.

Die Flügel faſt durchſichtig ſtreifig blau und weiß gefeldet.

1829. Agyrta Auxo Linn. Syst. Sph. 33. Hübn. Hypocr. tin. Auxo. Micilia Cram. 228. G.
1830. A. Caelestina Cram. 345. G.

9. Verein, Coitus 9.

Cyclosien, Cyclosiae.

Der Leib ganz hellblau; die Flügel mit weißen Flecken kreisförmig bezeichnet.

1831. Cyclosia Panthona Cram. 322. C.
1832. C. Aletta Cram. 396. C.

10. Verein, Coitus 10.

Eucyanen, Eucyanae.

Der Leib blau; die Schwingen und Senken ſehr unterſchieden weiß bandirt.

1833. Eucyane Celadon Cram. 132. E.
1834. E. Eusebia Cram. 369. G. H.
1835. E. Glauca Cram. 107. E.

11. Verein, Coitus 11.

Esthematen, Esthemates.

Der Rumpf zierlich weiß gezeichnet; die Flügel strahlig und bandig, blau und weiß gefleckt.

1836. Esthema Dichroa Hübn. Hipocr. superb. Dichroa. Bicolora Sulz. Gesch. 22. 6. Cram. 143. A.
1837. E. Papilionaris Drur. II. 2. 4. Cram. 29. A. Venaria Fabr. Syst. Phal. 38.

12. Verein, Coitus 12.

Ephestriden, Ephestrides.

Die Flügel gelb gefeldet; der Wanst gestreift.

1838. Ephestris Melaxantha. Hübn. Hypocr. superb. Melaxantha.
1839. E. Vinosa Drur. I. 23. 4.
1840. E. Myrrha Cram. 29. G. Hübn. Hypocr. tin. Abscissa.

13. Verein, Coitus 13.

Nyctemeren, Nyctemerae.

Die Flügel weiß und weißfleckig schwarz gesäumt.

1841. Nyctemera Hesperia Cram. 251. B. A.
1842. N. Cafra Drur. III. 5. 1.
1843. N. Nerina Drur. III. 5. 2.
1844. N. Coleta Cram. 368. H.
1845. N. Famula Cram. 228. D.
1846. N. Atralba. Tripunctaria Linn. Syst. Phal. 226. Cram. 22. E.
1847. N. Lacticinia Cram. 128. E.

14. Verein, Coitus 14.

Deilemeren, Deilemerae.

Der Leib gelb; die Schwingen braun; die Senken weiß.

1848. Deilemera Evergista Cram. 369. E.

15. Verein, Coitus 15.

Braccen, Braccae.

Die Schwingen braun, weiß gefleckt; die Senken gelb, schwarz gefleckt.

1849. Bracca Bajula. Bajularia Cram. 172. C.

16. Verein, Coitus 16.

Aleteen, Aletees.

Der Leib sehr zierlich gezeichnet; die Flügel gelb, weißfleckig schwarz gesäumt.

1850. Aletis Helcita. Linn. Syst. Pap. 94. Drur. III. 29. 4.

17. Verein, Coitus 17.

Composien, Composiae.

Der Leib und die Flügel voll weißer Fleckgen.

1851. Composia Credula Fabr. Syst. Bom. 94. Sybaris Cram. 71. E.

18. Verein, Coitus 18.

Cosmethiden, Cosmethides.

Der Kopf gelb; der Leib bunt; die Flügel mit gelben und weißen Flecken geziert.

1852. Cosmethis Zemire Cram. 367. J.

1853. C. Barbara Cram. 368. B.

19. Verein, Coitus 19.

Epistemen, Epistemae.

Die Flügel bandweise hellfärbig auch weißfleckig, die Senken und der Wanst färbiger.

1854. Episteme Lectrix Linn. Syst. Phal. 89. Cram. 192. C.

20. Verein, Coitus 20.

Heraclien, Heracliae.

Die Schwingen grünglänzend schwarz, blaß gefleckt, die Senken und der Wanst roth.

1855. Heraclia Euphemia Cram. 345. A.

1856. H. Dominula Linn. Syst. Phal. 90. Hübn. Bom. 117. 118.

1857. H. Placentia Abb. Lep. 65.

21. Verein, Coitus 21.

Euplagien, Euplagiae.

Die Schwingen grünglänzend braun, blaß gestreift; die Senken roth.

1858. Euplagia Hera Linn. Syst. Phal. 91. Hübn. Bom. 116.

1859. E. Virgo Linn. Syst. Phal. 39. Abb. Lep. 62.

1860. E. Dione. Abb. Lep. 63.

1861. E. Phyllira Abb. Lep. 64.

1862. E. Ceramica. Figurata Drur. II. 12. 4.

9. Stamm, Stirps IX.

Hypercompen, Hypercompae.

Die Streichler rauhhaarig; die Flügel ziemlich gemeinförmig; die Schwingen schmäler aber länger als die Senken; beyderley fleckig.

Erste Familie, Familia A.

Färbige, Coloreae.

Alle Glieder färbig; theils bunt abwechslend.

1. Verein, Coitus 1.

Euprepien, Euprepiae.

Die Schwingen röthlichweiß, voll brauner Flecken; die Senken weißlichroth, schwarz gefleckt.

1863. Euprepia Pudica. Esp. Bom. 84. 1. & 87. 4. Hübn. Bom. 269. 134..

1864. E. Gratiosa. Fasciata Vill. Ent. 5. 4. Esp. Bom. 87. 1. & 33. 3. Hübn. Bom. 133.

2. Verein, Coitus 2.

Eucharien, Eucharіae.

Die Schwingen schwarz, mit gelbsäumigen weißen Bändern geziert; die Senken rosenroth, schwarz gefleckt.

1865. Eucharia Hebe Linn. Syst. Phal. 40. Hübn. Bom. 129.

1866. E. Casta Esp. Bom. 92. 8. & 33. 2. Hübn. Bom. 219. & 137.

1867. E. Sangarida Cram. 381. D. Mopsa Drur. III. 3. 3.

3. Verein, Coitus 3.

Zooten, Zootae.

Die Schwingen braun, fast nezförmig weiß gestreift; die Senken gelblichroth, blaulichschwarz gefleckt.

1868. Zoote Caja Linn. Syst. Phal. 38. Hübn. Bom. 131. 130. & 162.

1869. Z. Flavia Amst. Magaz. Ent. II. 1. 11. Cram. 397. O. Hübn. Bom. 132.

4. Verein, Coitus 4.

Parasemien, Parasemiae.

Die Schwingen unterbrochen gelb gestreift; die Senken schwarz gefleckt.

1870. Parasemia Plantaginis Linn. Syst. Phal. 42. Hübn. Bom. 127, 128.

1871. P. Lapponica Thunb? Festiva Borkh. III. 56. Hübn. Bom. 247. & 230.

5. Verein, Coitus 5.

Pericallien, Pericalliae.

Die Schwingen braun, sparsam gelb gefleckt; die Senken oraniengelb, schwarz gefleckt.

1872. Pericallia Matrona. Matronula Linn. Syst. Phal. 92. Hübn. Bom. 239. 138.

6. Verein, Coitus 6.

Hyphoraien, Hyphoraiae.

Die Schwingen braun, mit reingelben Flecken; die Senken röthlichgelb, mit schwarzen Flecken gezeichnet; der Wanst gelb.

1873. Hyphoraia Civica Hübn. Beyt. II. 3. F. 1. E. Bom. 140. 141. Maculania Lang. Verz. 708. 709. Curialis Borkh. III. 57.

1874. H. Aulica Linn. Syst. Phal. 68. Hübn. Bom. 139.

7. Verein, Coitus 7.

Epicallien, Epicalliae.

Die Schwingen schwarz, weißfleckig; die Senken gelb schwarzfleckig; der Wanst roth.

1875. Epicallia Villica Linn. Syst. Phal. 41. Hübn. Bom. 136.

8. Verein, Coitus 8.

Haploen, Haploae.

Die Schwingen schwärzlichbraun, weißlichgelb gefeldet; die Senken röthlichgelb.

1876. Haploa Clymene. Brown. Ill. of. Zool. 38. Hübn. Bom. 135.

1877. H. Pasinuntia Cram. 367. H.

9. Verein, Coitus 9.

Rhyparien, Rhypariae.

Die Schwingen gelb, schmutzig gefleckt; die Senken roth, schwarz gefleckt.

1878. Rhyparia Purpurea Linn. Syst. Phal. 67. Hübn. Bom. 142. & 229.

1879. R. Zerah Cram. 397. G.

10. Verein, Coitus 10.

Arctien, Arctiae.

Die Schwingen düsterfärbig, schwarz gefleckt; die Senken hellfärbig; der Wanst roth.

1880. Arctia Fuliginosa Linn. Syst. Phal. 95. Hübn. Bom. 143.

1881. A. Maculosa Schiff. Verz. Bom. E. 10. Hübn. Bom. 144. 145.

1882. A. Arge Drur. I. 18. 3.

1883. A. Parasita Hübn. Bom. 146. 228.

1884. A. Nais Drur. I. 7. 3.

Zweyte Familie, Familia B.

Bleiche, Pallidae.

Alle Glieder bleich, theils zart schwarz gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Ecpantherien, Ecpantheriae.

Die Schwingen pantherähnlich bezeichnet; der Wanstrücke gelb, schwarz gefleckt.

1885. Ecpantheria Scribonia Stoll. 41. 3. Ocularia Fabr. Ent. Bom. 59.

1886. E. Cunigunda Cram. 344. D. E.

1887. E. Lantanae Fabr. Ent. Bom. 95. Icasia Cram. 181. E.

1888. E. Eridane Eridanus Cram. 68. G. Hübn. Hyperc. exsig. Eridane.

1889. E. Orsa Cram. 143. F.

1890. E. Assimilis. Maculosa Cram. 370. B.

2. Verein, Coitus 2.

Estigmenen, Estigmenae.

Die Schwingen mit schwarzen Punkten bezeichnet; der Wanst gelb, auf dem Rücken.

1891. Estigmene Acria Abb. Lep. 67.

1892. E. Menthastri Schiff. Verz. Bom. F. 2. Hübn. Bom. 152. 153.

1893. E. Urticae Esp. Bom. 83. 2. Hübn. Bom. 151.

1894. E. Lactinea Cram, 133. D. Sanguinolenta Fabr. Mant. Bom. 181.

1895. E. Lubricipeda Linn. Syst. Phal. 69. Hübn. Bom. 155. 156.

1896. E. Isabella Abb. Lep. 66.

1897. E. Echo Abb. Lep. 68.

1898. E. Luctifera Schiff. Verz. Bom. F. 4. Hübn. Bom. 147.

3. Verein, Coitus 3.

Cycnien, Cycniae.

Die Flügel kalckfärbig, mit einzelnen schwarzen Punkten bezeichnet, die Aerme an der Schulter und Wehre gelb.

1899. Cycnia Sordida Hübn. Bom. 151. Semicana Esp. Noc. 110. 5.

1900. C. Mendica Linn. Syst. Phal. 47. Hübn. Bom. 148. 149.

1901. C. Egena. Rustica Hübn. Bom. 150.

1902. C. Cunea Drur. I. 18. 4.

1903. C. Budea.

1904. C. Tenera Hübn. Zutr. 3. 4.

10. Stamm, Stirps X.

Lachneiden, Lachneides.

Der Rumpf sehr reichhaarig, einfärbig; die Flügel rundlich, glatträndig, der Wanst mäßig dick.

Erste Familie, Familia A.
Breitärschige, Pygiacae.

Die Flügel dünn beschüppt, grau oder braun; der Wanst am After breit.

1. Verein, Coitus 1.
Thaumetopöen, Thaumetopoeae.

Die Nase groß, treppenähnlich; die Schwingen mit schwarzen Wellenlinien gezeichnet, grau gefärbt; der Wanst am After beschüppt.

1905. Thaumetopoea Processionea Linn. Syst. Phal. 37. Hübn. Bom. 159. 160.

1906. T. Pityocampa Schiff. Verz. Bom. L. 11. Hübn. Bom. 161.

2. Verein, Coitus 2.
Megalopygen, Megalopygae.

Die Flügel fast zeichnunglos; der Wanst am After sehr dick behaart.

1907. Megalopyge Lanifera. Lanata Cram. 265. F. G.

1908. M. Nuda Cram. 306. B.

3. Verein, Coitus 3.
Dasysomaten, Dasysomata.

Der Leib sehr haarig; die Flügel braun; auf den Schwingen mit einem weißen Punkt bezeichnet;

1909. Dasysoma Catax Linn. Syst. Phal. 27. Hübn. Bom. 168.

1910. D. Eueria Knoch. Beitr. I. 2. 6. 7. Hübn. Dom. 166. 167.

1911. D. Lanestris Linn. Syst. Phal. 28. Hübn. Bom. 169. 170.

Zweyte Familie, Familia B.
Gemeine, Vulgares.

Die Flügel beyderley ansehnlich; der Wanst mäßig behaart.

1. Verein, Coitus 1.

Pachygastrien, Pachygastriae.

Die Schwingen mit einem weißen Punkt und auch die Senken mit einem breiten hellen Streif bezeichnet.

1912. Pachygastria Trifolii Schiff. Verz. Bom. K. 4. Hübn. Bom. 171.

1913. P. Spartii Hübn. Bom. 173. & 224.

1914. P. Quercus Linn. Syst. Phal. 222. Hübn. Bom. 172. & 225.

1915. P. Medicaginis Ochs. Schm. 42. 11. Hübn. Bom. 264.

2. Verein, Coitus 2.

Metanastrien, Metanastriae.

Die Schwingen mit geraden blassen Linien bezeichnet.

1916. Metanastria Hyrtaca Cram. 249. Lusca Fabr. Mant. Bom. 49. Laricis Hübn. Beytr. II. 2. O. & 3. M.

1917. M. Aconyta Cram. 131. A. Quadricincta Fabr. Mant. Bom. 44.

1918. M. Rubi Linn. Syst. Phal. 21. Hübn. Bom. 174.

3. Verein, Coitus 3.

Hylesien, Hylesiae.

Die Schwingen ungleich schattig gestreift, schlecht gefärbt.

1919. Hylesia Phadima Cram. 395. F.

1920. H. Boarmia. Obsoleta Cram. 304. C.

1921. H. Orasia Cram. 395. D.

1922. H. Canitia Cram. 304. D.

4. Verein, Coitus 4.

Phricodien, Phricodiae.

Die Schwingen mit am Haarrande sich nähernden Streifen gezeichnet.

1923. Phricodia Avia Cram. 307. A.
1924. P. Rustica Cram. 305. B.
1925. P. Hircia Cram. 30. G. & Chalcas 303. A.
1926. P. Polybia Cram. 369. B. A.
1927. P. Eumidide Cram. 395. C. B.

5. Verein, Coitus 5.

Periphoben, Pheriphobae.

Die Flügel bandweise abwechslend gelb und braun gefärbt; der Wanst schwarz, gelb geringt.

1928. Periphoba Amalia Cram. 383. B.
1929. P. Dumeti Linn. Syst. Phal. 26. Hübn. Bom. 164.

6. Verein, Coitus 6.

Lemonien, Lemoniae.

Die Schwingen nur mit einem schwarzen Punkt bezeichnet; der Wanstrücke bis auf die Gliederränder schwarz.

1930. Lemonia Taraxaci Schiff. Verz. Bom. L. 7. Hübn. Bom. 165. 166.

7. Verein, Coitus 7.

Plateien, Plateiae.

Die Flügel groß, streifweise weißlich gemischt; die Stützen eigenfärbig.

1931. Plateia Somniculosa Cram. 100. A. B.
1932. P. Ebale. Ebalus Cram. 50. G.

8. Verein, Coitus 8.

Eupteroten, Eupterotae.

Die Flügel sehr ansehnlich, und mit färbigen Linien gezeichnet.

1933. Eupterote Fabia Cram. 250. B.

1934. E. Petosiris Cram. 397. D.

9. Verein, Coitus 9.

Epien, Epiae.

Die Schwingen ausserhalb mit dunklen Linien und weißen Flecken daran gezeichnet.

1935. Epia Domina Cram. 304. B.

10. Verein, Coitus 10.

Diaphonen, Diaphonae.

Die Schwingen mit dunklen und hellen Linien sehr einfach bezeichnet.

1936. Diaphone Elegans Fabr. Ent. Bom. 109. Sylviana Stoll. 40. 4.

1937. D. Populi Linn. Syst. Phal. 34. Hübn. Bom. 163.

1938. D. Crataegi Linn. Syst. Phal. 48. Hübn. Bom. 162.

11. Stamm, Stirps XI.

Eutrichen, Eutrichae.

Die Schwingen lang, die Senken kurz; beyderley fast zähnig geründet.

Erste Familie, Familia A.

Rechte, Justae.

Die Flügel deutlich gezähnt, und wellig gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Cosmotrichen, Cosmotrichae.

Die Schwingen mit weißen Mittezeichen und schiefen dunklen Strichen bemerkt.

1939. Cosmotriche Potatoria Linn. Syst. Phal. 23. Hübn. Bom. 182. 183.

1940. C. Lobulina Schiff. Verz. Bom. K. 6. Hübn. Bom. 180.

1941. C. Lunigera Esp. Bom. 22. 5. 6. Hübn. Beytr. II. 1. L. & Bom. 181.

2. Verein, Coitus 2.

Tolypen, Tolypae.

Die Flügel glatträndig, blaß gesent und mit blassen Wellenlinien gezeichnet.

1942. Tolype Orsiloche Cram. 383. F. & 46. D.

1943. T. Velleda Stoll. 41. 4. Abb. Lep. 52.

1944. T. Riphea Cram. 395. E.

3. Verein, Coitus 3.

Lasiocampen, Lasiocampae.

Die Flügel fast glatträndig; nur die Schwingen mit zackigen Bändern gezeichnet.

1945. Lasiocampa Capensis Linn. Syst. Phal. 10. Pityocampa Cram. 304. E. F Hübn. Eutr. just. Pityocampa.

1946. L. Pini Linn. Syst. Phal. 24. Hübn. Bom. 184. 185.

1947. L. Bibula. Bibiana Cram. 359. D.

1948. L. Hirta Cram. 358. A.

4. Verein, Coitus 4.

Chrostogastrien, Chrostogastriae.

Der Kopf und Hals braun; die Schwingen mit einem weißen Punkt und dunklen Streif gezeichnet; der Wanst roth.

1949. Chrostogastria Pruni Linn. Syst. Phal. 22. Hübn. Bom. 186.

5. Verein, Coitus 5.

Phyllodesmen, Phyllodesmae.

Beyderley Flügel sehr kerbig und großzähnig; auch der Wanst sehr groß.

1950. Phyllodesma Phidonia Cram. 397. N.

1951. P. Quercifolia Linn. Syst. Phal. 18. Hübn. Bom. 187. 188.

1952. P. Populifolia Schiff. Verz. Bom. I. 5. Hübn. Bom. 189. & 254.

1953. P. Ilicifolia Linn. Syst. Phal. 19. Betulifolia Esp. Bom. 7. 2. 3.

1954. P. Tremulifolia. Ilicifolia Esp. Bom. 8. 1. 2. Hübn. Bom. 191. 192.

6. Verein, Coitus 6.

Mimallonen, Mimallones.

Die Schwingen zähnig; die Senken zackig; beyderley ähnlich gezeichnet und gefärbt.

1955. Mimallo Verago Cram. 162. D. E. & 306. D. E.

1956. M. Amilia Cram. 265. D. E.

1957. M. Aegina Cram. 384. D. E.

7. Verein, Coitus 7.

Euglyphiden, Euglyphides.

Die Flügel ziemlich gemeinförmig; aber sehr kerbig gerändet und gleichend zackenstriemig angelegt.

1958. Euglyphis Claudia Cram. 383. A.

1959. E. Lucilla Cram. 399. A.

Zweite Familie, Familia A.

Verstellte, Simulatae.

Die Schwingen buchtig, die Senken rundlich, beyderley glatträndig.

1. Verein, Coitus 1.

Bombycen, Bombyces.

Die Flügel blaßbraun bandirt, weiß gefärbt.

1960. Bombyx Mori Linn. Syst. Phal. 33. Hübn. Bom. 271. 272. 193. & 273.

1961. B. Penthica. Lugubris Drur. III. 21. 5.

12. Stamm, Stirps XII.

Trichoden, Trichodae.

Die Flügel glatträndig; der Wanst ziemlich lang.

Erste Familie, Familia A.

Stumpfige, Hebescentes.

Die Flügel ziemlich gemeinförmig; nur die Schwingen deutlich gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Aidoen, Aidoes.

Die Senken geröthet; der Wanst blutroth.

1962. Aidos Amanda Cram. 383. D. C.

2. Verein, Coitus 2.

Mesoceliden, Mesocelides.

Die Flügel beyderley im Mitteraume mit einem weißen Fleck geziert.

1963. Mesocelis Monticola. Montana Cram. 356. E.

3. Verein, Coitus 3.

Antarctien, Antarctiae.

Der Kopf, Rumpf und die Schwingen färbig, die Senken und der Wanst bläßlich.

1964. Antarctia Brunnea.

1965. A. Fusca Cram. 307. G.

1966. A. Metabus Cram. 74. D.

1967. A. Flava. Flavata Cram. 307. C.

4. Verein, Coitus 4.

Rhabdosien, Rhabdosiae.

Die Flügel beyderley fast durchsichtig, den Senen nach färbig und dem Rande nach schattig.

1968. Rhabdosia Vaninia Cram. 356. G.

1969. R. Tharops Cram. 359. A.

5. Verein, Coitus 5.

Aselgien, Aselgiae.

Die Schwingen unterbrochen gestreift, blaß buntfärbig.

1970. Aselgia Agresta Cram. 306. A.

1971. A. Silveria Cram. 359. B. C.

6. Verein, Coitus 6.

Malacosomaten, Malacosomata.

Die Schwingen mit zwey fast geraden Linien gezeichnet; die Senken zeichenlos; beyderley fast bunt gefränzt.

1972. Malacosoma Loti Ochs. Schm. 42. 43. Hübn. Bom. 256. 257.

1973. M. Castrensis Linn. Syst. Phal. 36. Hübn. Bom. 177. 178.

1974. M. Neustria Linn. Syst. Phal. 35. Hübn. Bom. 179. 180.

1975. M. Disstria. Neustria Abb. Lep. 59.

1976. M. Franconica Schiff. Verz. Bom. L. 6. Hübn. Bom. 175. 176.

Zweyte Familie, Familia B.

Längliche, Elongatae.

Die Schwingen gestreckt; die Senken kurz.

1. Verein, Coitus 1.

Anisoten, Anisotae.

Die Schwingen mit einem weißen Mittepunkt und blassen Band gezeichnet.

1977. Anisota Pellucida Abb. Lep. 58.
1978. A. Stigma Abb. Lep. 56.
1979. A. Senatoria Abb. Lep. 57.

2. Verein, Coitus 2.

Strebloten, Streblotae.

Die Ohren krauslich gebogen; die Schwingen schlänglich gezeichnet.

1980. Streblote Panda. Cristata Cram. 398. I. Repanda Hübn. Bom. 274. 275.
1981. S. Clarissa Stoll. 34. 3.
1982. S. Ornanda. Ornata Cram. 306. G.

3. Verein, Coitus 3.

Nygmien, Nygmiae.

Die Schwingen im Mitteraume mit einem dunklen Punkt bemerkt.

1983. Nygmia Arenacea Linn. Syst. Phal. 65. Icilia Stoll. 35. 5. Drur. I. 18. 1.
1984. N. Helladia Cram. 398. H.
1985. N. Albina Cram. 398. E.

13. Stamm, Stirps XIII.

Heteromorphen, Heteromorphae.

Ihre Gestalt nähert sich gemeiner Eulen ihrer sehr täuschend.

Erste Familie, Familia A.

Schattige, Umbrosae.

Die Schwingen schattig schlechtfärbig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Olistherien, Olistheriae.

Beyderley Flügel zwischen den Senen streifig angelegt.

1986. Olistheria Vaninia Cram. 356. G.
1987. O. Zatima Cram. 381. F.

2. Verein, Coitus 2.

Disphragiden, Disphragides.

Die Schwingen im Mitteraume blaß gefleckt, und am Eck schwarz gezeichnet.

1988. Disphragis Tharis Cram. 308. D.
1989. D. Caeruleocephala Linn. Syst. Phal. 59. Hübn. Bom. 196.

3. Verein, Coitus 3.

Mesoscien, Mesosciae.

Die Schwingen mit einem großen eckigen Band beschattet.

1990. Mesoscia Semois Cram. 308. F.
1991. M. Pusilla Cram. 395. G.

Zweyte Familie, Familia B.

Befleckte, Contaminatae.

Die Schwingen mit mehrern schmuzigen Flecken besetzt.

1. Verein, Coitus 1.

Dyspessen, Dyspessae.

Die Schwingen klein gefleckt; die Senken grau gefärbt.

1992. Dyspessa Pantherina Hübn. Beytr. II. 1. X und Bom. 157. 158.
1993. D. Tessera. Guttata Drur. III. 22. 1.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Bohrende, Fodicantes.

Der Rumpf hoch gewölbt; die Flügel ziemlich dick gesent, sonderbar angelegt; der Wanst lang, glatt.

1. Stamm, Stirps I.

Teredinen, Teredines.

Die Ohren ziemlich groß; die Streichler stumpf, fast glatt. Die Flügel fast gemeinförmig.

Erste Familie, Familia A.

Dicke, Crassae.

Die Ohren fiederig. Der Rumpf fast ganz glatt; die Flügel am Ende gerundet, rindenfärbig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Xyleuten, Xyleutae.

Der Leib groß, am Rumpfe hinten wülstig; die Flügel schattig bandirt und zart gestriemt.

1994. Xyleutes Crassa Drur. III. 2. 1.
1995. X. Cossus Linn. Syst. Phal. 63. Hübn. Bom. 198.
1996. X. Terebra Schiff. Verz. Bom. N. 2. Hübn. Bom. 197.
1997. X. Strix Linn. Syst. Phal. 82. Cram. 145. A.

2. Verein, Coitus 2.

Hypopten, Hypoptae.

Die Flügel unterbrochen gewebähnlich gezeichnet; der Wanst ganz blaßfärbig.

1998. Hypopta Ambigua Hübn. Zutr. 145. 146.
1999. H. Tristis Drur. III. 21. 1.
2000. H. Thrips Hübn. Bom. 265.
2001. H. Caestrum Hübn. Bom. 199.
2002. H. Ziliante Cram. 384. C.

3. Verein, Coitus 3.

Stygien, Stygiae.

Der Rumpf und die Schwingen gelb, die Senken und der Wanst schwarz angelegt.

2003. Stygia Terebellum. Australis Latr. Ins. p. 215. Hübn. Bom. 244.

Zweite Familie, Familia B.
Schlange, Graciles.

Der Leib und die Flügel lang, alles blaßfärbig.

1. Verein, Coitus 1.
Morpheiden, Morpheides.

Die Ohren umgebogen. Beyderley Flügel, doch die Schwingen mehr als die Senken, gewebähnlich gestrichelt.

2004. Morpheis Pyracmon Cram. 287. B.

2005. M. Scalaris Fabr. Syst. Hep. 4. Asylas Cram. 137. C.

2. Verein, Coitus 2.
Zeuzeren, Zeuzerae.

Die Flügel voll grauer Tröpfgen.

2006. Zeuzera Arundinis Hübn. Bomb. 200. 201.

3. Verein, Coitus 3.
Latagien, Latagiae.

Der Rumpf und die Flügel, am zahlreichsten die Schwingen tropfig blau gefleckt.

2007. Latagia Aesculi Linn. Syst. Phal. 83. Hübn. Bom. 202.

4. Verein, Coitus 4.
Trosien, Trosiae.

Der Rumpf mit rohen Fleckgen, die Schwingen mit einer Reihe schwarzer Punkte gezeichnet.

2008. Trosia Tricolora Fabr. Mant. Bom. 69. Stoll. 34. 1. A. 1.

2009. T. Dimas Cram. 59. C.

5. Verein, Coitus 5.

Chalcidicen, Chalcidicae.

Der Leib und beyderley Flügel fleckig oder ganz glänzend.

2010. Chalcidica Hyphonoë Cram. 154. B.

2011. C. Minea. Mineus Cram. 131. D.

6. Verein, Coitus 6.

Sigen, Sigae.

Die Flügel beyderley mit einem muschelförmigen weißen Fleck geziert und grün gefärbt.

2012. Siga Liris Cram. 63. F. & 262. E.

2. Stamm, Stirps II.

Hepiolen, Hepioli.

Die Ohren kurz und fiederlos. Der Rumpf strakhaarig. Die Flügel fast gleichförmig zugespitzt; der Wanst sehr fein bekleidet.

Erste Familie, Familia A.

Hinfällige, Caducae.

Die Ohren sehr kurz. Ihre ganze Beschaffenheit sehr zärtlich und hinfällig.

1. Verein, Coitus 1.

Draconien, Draconiae.

Die Flügel sehr breit und zackig, voll sonderbarer Flecken.

2013. Draconia Peripheta Cram. 131. G.

2. Verein, Coitus 2.

Letoen, Letoes.

Die Schwingen voll silberner Flecken; die Senken einfärbig.

2014. Leto Venus Cram. 286. C. D.

3. Verein, Coitus 3.

Histien, Histiae.

Die Flügel sehr lang und spitzig, der Wanst bunt.

2015. Histia Flabellicornis Fabr. Syst. pag. 838. Rhodope Cram. 30. E.

4. Verein, Coitus 4.

Gorgopen, Gorgopes.

Die Flügel beyderley lantzetförmig, gleichfärbig.

2016. Gorgopis Libania Cram. 356. F.

2017. G. Humuli Linn. Syst. Phal. 84. Hübn. Bom. 203. 204.

5. Verein, Coitus 5.

Gazoryctren, Gazoryctrae.

Die Schwingen glänzend perlfärbig gefleckt.

2018. Gazoryctra Ganna Hübn. Bom. 215.

2019. G. Jodutta Schiff. Verz. Bom. O. 6. Flina. Hübn. Bom. 210. 211. Obliguus Fabr. Ent. Hep. 5.

2020. G. Hecta Linn. Syst. Phal. 85. Hübn. Bom. 208. & 258.

6. Verein, Coitus 6.

Triodien, Triodiae.

Die Schwingen mit entgegen geneigten weisen Streifen gezeichnet.

2021. Triodia Sylvina Linn. Syst. Phal. 87. Hamma Schiff. Verz. Bom. O. 2. Hübn. Bom. 207. & 252.

2022. T. Lupulina Linn. Syst. Phal. 86. Hübn. Bom. 205. 206. Crux Fabr. Mant. Hep. 6.

7. Verein, Coitus 7.

Pharmaciden, Pharmacides.

Die Schwingen mit vielen dunklen, blaßumkriesenen Fleckgen streifweiß gezeichnet.

2023. Pharmacis Ento. Hübn. Bom. 213.

2024. P. Flina Schiff. Verz. Bom. O. 3. Velleda Hübn. Bom. 283. 284.

2025. P. Carna Schiff. Verz. Bom. O. 7. Hübn. Bom. 214.

Vierte Horde, Phalanx quarta.

Eulen, Noctuae.

Noctuae Linn. Noctuae & Hyblaeae Fabr.

Kennzeichen.

Der Mund und die Nase in einem ziemlich langen Rüssel vereint; die Streichler mit einer dünnen stumpfen Schnauze besetzt; die Ohren dünn, ziemlich lang, besonders dem Ende zu sehr zart, abwärts fast fiederig. Der Krage und die Deckgen ansehnlich; der Rücke des Rumpfes dicht mit schuppenähnlichen Haaren bedeckt; die Flügel ansehnlich befränzt; die Stützen dornig bewehrt und der Wanst wohl bekleidet.

Erste Rotte, Tribus prima.

Spinnerähnliche, Bombycoides.

Der Kopf, der Rumpf, die Stützen und der Wanst rauhlich behaart; die Flügel unansehnlich; die Schwingen mit kaum deutlicher Kugel-, Nieren- und Wellen-Zeichnung bemerkt.

1. Stamm, Stirps I.

Apatelen, Apatelae.

Die Streichler kurz, an den Lippen schwarz bezeichnet; die Schwingen ziemlich schmal, blaßfärbig, schattig- und schwärzlichgrau wellenstreifig angelegt; die Senken fast zeichenlos.

Erste Familie, Familia A.
Sonderbare, Mirae.

Die Ohren halb deutlich befiedert. Der Rücke ziemlich glatt; die Schwingen sehr schmal, die Senken sehr kurz; der Wanst aber lang.

1. Verein, Coitus 1.
Exäerten, Exaeretae.

Die Schwingen senenstriemig und wellig graubunt angelegt.

2026. Exaereta Ulmi Schiff. Verz. Noc. A. 1. Strigula Fabr. Syst. Bom. 72. Cassinia Esp. Bom. 49. 4. 5. Hübn. Noc. 554. & 1.

Zweyte Familie, Familia B.
Gleichende, Perconformes.

Der Rumpf glatt; die Flügel mäßig breit und lang; die Schwingen fast stumpf, doch zähnig geründet und mit schwarzen Pfeilstriemen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Hybomen, Hybomae.

Der Leib schlang; die Schwingen hell gefleckt, aber schattig gegründet.

2027. Hyboma Strigosa Schiff. Verz. Noc. T. 15. Favillacea Esp. Noc. 48. 4. Hübn. Noc. 2.

2028. H. Unicornis Abb. Lep. 86.

2. Verein, Coitus 2.
Triänen, Triaenae.

Die Schwingen fast nur mit einem psi- und pfeilförmigen Zeichen schwarz bemerkt, weißlichgrau gefärbt.

2029. Triaena Psi Linn. Syst. Phal. 135. Tridens Schiff. Verz. Noc. B. 1. Hübn. Noc. 4.

2030. T. Cuspis Hübn. Noc. 504.

2031. T. Tridens Esp. Noc. 36. 5. Psi Schiff. Verz. Noc. B. 2. Hübn. Noc. 5.

2032. T. Tritona Hübn. Zutr. 107. 108.

2033. T. Teligera.

3. Verein, Coitus 3.

Jocheären, Jocheaerae.

Die Schwingen mit ziemlich deutlichen Mitteflecken, wie auch mit Pfeilstriemen, bezeichnet und buntlich grau gefärbt.

2034. Jocheaera Alni Linn. Syst. Phal. 134. Degener Schiff. Verz. Noc. E. 4. Hübn. Noc. 3.

4. Verein, Coitus 4.

Acronicten, Acronictae.

Die Streichler, Deckgen, Flügel und Stützen nur unterbrochen schwarz bemerkt; alle Glieder weiß gefärbt.

2035. Acronicta Leporina Linn. Syst. Phal. 109. Bradyporina Hübn. Noc. 570. 571.

2036. A. Bradyporina. Leporina Schiff. Verz. Noc. B. 8. Fabr. Spec. Bom. 94. Hübn. Noc. 15. 16.

Dritte Familie, Familia C.

Mitähnliche, Consimiles.

Die Schwingen mit deutlichen Mitteflecken und Wellenstreifen grau angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Colocasien, Colocasiae.

Die Ohren mäßig befiedert. Der Rumpfsrücke erhoben behaart; die Schwingen wechslend bräunlich- und weißlichgrau angelegt.

2037. Colocasia Coryli Linn. Syst. Phal. 50. Hübn. Noc. 17. 18.

2038. C. Scoriacea Esp. Bom. 83. 4. 5. Capreae Hübn. Noc. 19.

2. Verein, Coitus 2.

Pharetren, Pharetrae.

Die Schwingen mit mehreren Pfeilstriemen unterbrochen schwarz bezeichnet und schattig grau gefärbt.

2039. Pharetra Auricoma Schiff. Verz. Noc. B. 6. Hübn. Noc. 8.

2040. P. Menyanthidis Esp. Noc. 65. 5. Hübn. Noc. 6. 7.

3. Verein, Coitus 3.

Arctomyscen, Arctomysces.

Die Schwingen fast nur mit gemeinen Mittelflecken und dunklen wie mit hellen Wellenstriemen bezeichnet.

2041. Arctomyscis Aceris Linn. Syst. Phal. 137. Hübn. Noc. 13. 14.

2042. A. Euphorbiae Schiff. Verz. Noc. B. 4. Hübn. Noc. 12.

2043. A. Esulae Hübn. Noc. 613.

2044. A. Euphrasiae Borkh. Noc. 104. Pepli Hübn. Noc. 614.

2045. A. Cyparissiae Hübn. Noc. 529. 615.

2046. A. Megacephala Schiff. Verz. Noc. B. 5. Hübn. Noc. 10. 11.

2. Stamm, Stirps II.

Diphtheren, Diphtherae.

Der Kopf, Rumpf, die Flügel, Stützen und der Wanst ansehnlich bezeichnet und bunt gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Vorzügliche, Praecipuae.

Kopf, Rumpf und Schwingen blaßfärbig; letztere deutlich und manigfältig schwarz gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Pantheen, Pantheae.

Die Ohren fiederig. Die Schwingen, wie der Kopf und Rumpf weiß, bandartig zackig schwarz gestriemt.

2047. Panthea Coenobita Esp. Bom. 82. 2. & 37. 7. Hübn. Noc. 508 & Bom. 72. 73.

2. Verein, Coitus 2.

Euglyphien, Euglyphiae.

Der Rumpf und die Schwingen glänzend, zierlich bunt bezeichnet, blaßfärbig.

2048. Euglyphia Elegans. Festiva Fabr. Syst. Bom. 79. Hieroglyphica Cram. 147. D. Hübn. Diph. fest. Elegans.

3. Verein, Coitus. 3.

Momen, Momae.

Die Schwingen wie der Kopf und Rumpf blaßfärbig und unterbrochen wellig schwarz bezeichnet.

2049. Moma Ludifica Linn. Syst. Phal. 143. Hübn. Noc. 580. 581.

2050. M. Aprilina Linn. Syst. Phal. 138. Hübn. Noc. 22.

2051. M. Astur Cram. 120. B.

4. Verein, Coitus 4.

Polygrammaten, Polygrammatae.

Die Schwingen liternähnlich schwarz beschrieben.

2052. Polygrammate Hebraicum Hübn. Zutr. 25. 26.

3. Stamm, Stirps III.

Jaspidien, Jaspidiae.

Der Rumpf höckerig erhoben bekleidet. Die Flügel zähnig; die Schwingen mit einer sehr bogigen Linie, außer dem nierenförmigen Fleck und übrigens scheckig bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.
Hellfärbige, Clarocoloratae.

Kopf, Rumpf und Schwingen hell oder blaß gefärbt, schwarz und weiß bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Diacopen, Diacopae.

Der Rumpf braunrändig; die Schwingen nur mit einem eckigen Mittebändgen und Randsaum bezeichnet.

2053. Diacope Celsii. Celsia Linn. Syst. Phal. 77. Hübn. Noc. 72. 73.

2. Verein, Coitus 2.
Pöcilien, Poeciliae.

Die Schwingen mit unterbrochenen schwarzen, weiß umzogenen Mittefleckeu und Wellenstreifen schwarz bezeichnet, sanft schattig weißlichgrün gefärbt.

2054. Poecilia Runica Schiff. Verz. Noc. F. 1. Hübn. Noc. 71.

2055. P. Glandifera Schiff. Verz. Noc. E. 2. Lichenis Fabr. Mant. Noc. 252. Hübn. Noc. 24.

3. Verein, Coitus 3.
Metachrosten, Metachrostes.

Die Schwingen mit grauen Fleckgen, in weißlichbraunem Grunde angelegt.

2056. Metachrostis Par. Hübn. Noc. 516.

2057. M. Perla Schiff. Verz. Noc. E. 3. Hübn. Noc. 25.

2058. M. Velox Hübn. Noc. 515.

Zweite Familie, Familia B.
Trübfärbige, Nubilae.

Der Kopf, Rumpf und die Schwingen trübscheckig, sparsam schwarz und weiß gezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Polymixeen, Polymixees.

Rumpf und Schwingen hell und dunkel gefleckt, sehr bunt gemischt gefärbt.

2059. Polymixis Polymita Linn. Syst. Phal. 180. Seladonia Fabr. Ent. Noc. 188. Ridens Hübn. Noc. 20.

2060. P. Ligustri Schiff. Verz. Noc. E. 1. Hübn. Noc. 21.

2. Verein, Coitus 2.

Euthalen, Euthalae.

Die Schwingen innen fast pfeilstriemig, sattfärbig, grünlich scheinend.

2061. Euthales Spoliatricula Schiff. Verz. Noc. U. 5. Algae Fabr. Syst. Noc. 103. Hübn. Noc. 26.

2062. E. Calligrapha Borkh. Noc. 70. Hübn. Noc. 530.

2063. E. Fraudatricula Hübn. Noc. 28.

2064. E. Raptricula Schiff. Verz. Noc. U. 4. Pomula Borkh. Noc. 79. Hübn. Noc. 29.

2065. E. Mendacula Hübn. Noc. 520.

3. Verein, Coitus 3.

Cryphien, Cryphiae.

Die Schwingen dunkel, undeutlich schwarz und weiß bezeichnet.

2066. Cryphia Receptricula. Strigula Borkh. Noc. 78. Hübn. Noc. 27.

2067. C. Nana Hübn. Zutr. 53. 54.

Dritte Familie, Familia C.

Bunte, Variae.

Die Schwingen stumpf, fast winklig bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Lithacodien, Lithacodiae.

Die Schwingen schwarz und weiß fleckig bezeichnet, aber buntfärbig.

2068. Lithacodia Bellicula Hübn. Zutr. 85. 86.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.
Gemeine, Genuinae.

Der Krage und die Deckgen ansehnlich. Die Schwingen sehr mannigfältig bezeichnet und gefärbt; die Senken hingegen fast nur blaßfärbig.

1. Stamm, Stirps I.
Miselien, Miseliae.

Der Rücke des Rumpfes zierlich scheckig; die Schwingen desgleichen, mit ziemlich verformten Mittefleck bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.
Ausgezeichnete, Distinctae.

Die Schwingen mit einem fast schiefen Nierenfleck, die Senken mit einer dunklen Wellenlinie bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Meganephrien, Meganephriae.

Der Rumpf färbig, schwarz bezeichnet; die Schwingen mit einem großen Nierenfleck besetzt, bunt gemischt.

2069. Meganephria Oxiocanthae Linn. Syst. Phal. 165. Hübn. Noc. 31.

2070. M. Bimaculosa Linn. Syst. Phal. 184. Hübn. Noc. 32.

2071. M. Oleagina Schiff. Verz. Bom. M. 2. Hübn. Noc. 33.

2. Verein, Coitus 2.
Lamprosticten, Lamprostictae.

Der Rumpf weiß, grau und schwarz scheckig bezeichnet; die Schwingen desgleichen mit zierlichen Flecken und Streifen angelegt, bunt gemischt.

2072. Lamprosticta Culta Schiff. Verz. Noc. F. 4. Hübn. Noc. 34.

3. Verein, Coitus 3.

Cermen, Cermae.

Die Schwingen abwechslend weiß und grau gefärbt, mit schwarzen Wellenlinien bezeichnet.

2073. Cerma Cora Hübn. Zutr. 59. 60.

4. Verein, Coitus 4.

Harmodien, Harmodiae.

Die Schwingen dunkel gefärbt zerstreut weiß gefleckt.

2074. Harmodia Compta Schiff. Verz. Noc. F. 5. Hübn. Noc. 33.

2075. H. Conspersa Schiff. Verz. Noc. F. 6. Hübn. Noc. 52.

2076. H. Conserta. Concinna Hübn. Noc. 51.

5. Verein, Coitus 5.

Melanchren, Melanchrae.

Die Schwingen mit einem blassen Nierenfleck und düstern Wellenlinien bezeichnet.

2077. Melanchra Persicariae Linn Syst. Phal. 142. Hübn. Noc. 64.

2. Stamm, Stirps II.

Amphipyren, Amphipyrae.

Alle Glieder glatt und glänzend. Die Schwingen mit kaum erkennbaren Mittelflecken und Zackenstriemen bezeichnet, die Senken fast zeichenlos und einfärbig.

Erste Familie, Famila A.
Vortreffliche, Eminentes.

Der Rumpf ziemlich glatt, desgleichen die Flügel; die Schwingeu dunkel, die Senken hell gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.
Thalpophilen, Thalpophilae.

Die Schwingen mit blassen Mitteflecken und Zackenlinien bezeichnet, grünlichgrau gefärbt; die Senken grau gesäumt, gelb gefärbt.

2078. Thalpophila Texta Esp. Noc. 29. 5. 6. Connexa Hübn. Noc. 548. & 109.

2079. T. Prospicua. Sericina Esp. Noc. 29. 4. Hübn. Noc. 108.

2. Verein, Coitus 2.
Pyroiden, Pyroides.

Die Schwingen dunkel gefärbt, zackenstriemig blaß bezeichnet, die Senken metallfärbig.

2080. Pyrois Cinnamomea Borkh. Noc. 91. Conica Esp. Noc. 92. 4. Perfusa Hübn. Noc. 37.

2081. P. Pyramidea Linn. Syst. Phal. 181. Hübn. Noc. 36.

2082. P. Perflua Fabr. Mant. Noc. 280. Pyramidina Esp. Noc. 113. 2. Hübn. Noc. 35.

3. Verein, Coitus 3.
Phosphilen, Phosphilae.

Die Schwingen halb dunkel, halb hell und schattig gestreift; die Senken grau, blaß bezeichnet.

2083. Phosphila Turbulenta Hübn. Zutr. 67. 68.

2084. P. Ursipes.

4. Verein, Coitus 4.
Scotophilen, Scotophilae.

Die Schwingen eisenfärbig, mit schwarzen Punkten, statt Mitteflecken bezeichnet, die Senken blaß metallschimmernd gefärbt.

2085. Scotophila Livida Schiff. Verz. Noc. Q. 13. Hübn. Noc. 38.

2086. S. Tetra Fabr. Mant. Noc. 31. Hübn. Noc. 39.

2087. S. Tragopogonis Linn. Syst. Phal. 177. Hübn. Noc. 40.

5. Verein, Coitus 5.

Athetiden, Athetiden.

Die Schwingen mit dunklen Mittezeichen und Wellenstreifen bezeichnet.

2088. Athetis Dasychira Hübn. Noc. 634.

2089. A. Palustris Hübn. Noc. 367.

2090. A. Caliginosa Hübn. Noc. 474.

2091. A. Cubicularis Schiff. Verz. Noc. G.6. Hübn. Noc. 417.

6. Verein, Coitus 6.

Euxoen, Euxoae.

Die Schwingen schattig weißlichgrau, schwarz striemig; die Senken fast weiß.

2092. Euxoa Nivens. Decora Schiff. Verz. Noc. Q. 15. Hübn. Noc. 45.

2093. E. Candelisequa Schiff. Verz. Noc. G. 5. Hübn. Noc. 493. & 397.

Zweyte Familie, Familia B.

Zweifelhafte, Ancipites.

Die Schwingen bleyfärbig, blaßstreifig und blaßfleckig gezeichnet; die Senken trüb gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Rhyacien, Rhyaciae.

Die Schwingen nebst den Mittezeichen mit vier blassen Wellenlinien bezeichnet.

2094. Rhyacia Lucipeta Schiff. Verz. Noc. G. 2. Hübn. Noc. 41.

2095. R. Birivia Schiff. Verz. Noc. G. 3. Hübn. Noc. 631. & 42.

2. Verein, Coitus 2.

Epipsilien, Epipsiliae.

Die Schwingen mit blassen, schwärzlich bemerkten Mittesflecken und Wellenlinien gezeichnet.

2096. Epipsilia Latens Hübn. Noc. 419.

2097. E. Pyrophila Schiff. Verz. Noc. G. 4. Hübn. Noc. 43.

2098. E. Ignicola Hübn. Nac. 546.

2099. E. Multangula Hübn. Noc. 116.

2100. E. Fimbriola Esp. Noc. 114. 3. Hübn. Noc. 603.

2101. E. Eruta Hübn. Noc. 623.

3. Stamm, Stirps III.

Polien, Poliae.

Der Rumpf und die Schwingen bläßlichgrau, mit abstechenden Farben gemengt; die Senken schattig.

Erste Familie, Familia A.

Gelbsprenglige, Flavispersae.

Die Schwingen undeutlich mit Mittesflecken und Wellenstreifen gezeichnet, gelbsprenglig gemengt.

1. Verein, Coitus 1.

Mimeten, Mimetae.

Die Schwingen blaulichgrau neblig, kaum gelb gemischt.

2102. Mimetes Nubilosa Hübn. Noc. 402.

2103. M. Caesia Schiff. Verz. Noc. O. 9. Hübn. Noc. 60.

2104. M. Xanthocyanea Hübn. Noc. 640. 641.

2. Verein, Coitus 2.

Xanthopasten, Xanthopastes.

Die Schwingen bräunlichgrau gemengt, hell gelb gezeichnet.

2105. Xanthopastis Timais Cram. 275. B.

2106. X. Xanthomista Hübn. Noc. 647.

2107. X. Flavicincta Schiff. Verz. Noc. H. 2. Hübn. Noc. 46.

2108. X. Dysodea Schiff. Verz. Noc. H. 5. Chrysozona Borkh. Noc. 113. Hübn. Noc. 47.

2109. X. Flavivibica. Polymita Schiff. Verz. Noc. H. 4. Serena Esp. Noc. 87. 4. Filigrama Ochs Nachtr. 73. S. Hübn. Noc. 48.

3. Verein, Coitus 3.

Eumichtiden, Eumichtides.

Die Schwingen abwechslend buntstreifig, gelb gemischt.

2110. Eumichtis Lichenea Hübn. Noc. 562. 563.

Zweyte Familie, Familia B.

Grauscheckige, Canovariae.

Die Schwingen hellgrau gefärbt, dunkel und weißlich gewölkt.

1. Verein, Coitus 1.

Cheren, Cherae.

Die Schwingen schattig gestreift, weißlich bezeichnet.

2111. Chera Serratilinea Ochs. Nachtr. 74. 8. Polyodon Hübn. Noc. 365.

2112. C. Fugax Ochs. Nachtr. 67. S. Lucernea Hübn. Noc. 44.

2113. C. Renigera Hübn. Noc. 384.

2114. C. Templi Thunb. Ins. Suec. Hübn. Noc. 373.

2. Verein, Coitus 2.

Antitypen, Antitypae.

Die Schwingen voll schwarzer Zeichnungen, auf weißlichgrauem Grunde, vorzüglich im Mitteraum.

2115. Antitype Chi Linn. Syst. Phal. 136. Hübn. Noc. 49.

2116. A. Cappa Hübn. Noc. 447.

4. Stamm, Stirps IV.

Achatien, Achatiae.

Kopf und Rücke zierlich behaart; die Schwingen mit gekernten Mitteflecken und theils zackigen Wellenlinien achatähnlich angelegt; die Senken aber und der Wanst schlecht gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Schlechte, Sublestae.

Die Schwingen mit einer kleinzackigen blassen Linie nächst dem Franzenrande bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Raphien, Raphiae.

Die Schwingen grau, außerhalb weißlich gefärbt und schwärzlich bezeichnet.

2117. Raphia Hybris Hübn. Noc. 518.

2118. R. Connexa Borkh. Noc. 148. Elota Hübn. Noc. 462.

2119. R. Saliceti Borkh. Noc. 266. Viminalis Fabr. Mant. Noc. 160. Stricta Esp. Bom. 84. 5. Scripta Hübn. Noc. 50.

2. Verein, Coitus 2.

Parastichten, Parastichtes.

Die Schwingen ockerbraun, schwärzlich schattig und schwarz bezeichnet, am Nierenfleck mit zwey weißen Pünktgen besetzt.

2120. Parastichtis Hepatica Linn. Syst. Phal. 169. Characterea Hübn. Noc. 133. & Implexa Noc. 414.

2121. P. Didyma Esp. Noc. 47. 7. Secalina Hübn. Noc. 420.

2122. P. P. Vilis. Leucosticta Esp. Noc. 807. & Nictitans Noc. 47. 6. Hübn. Noc. 619. 620. & 511.

2123. P. Suspecta Hübn. Noc. 633.

3. Verein, Coitus 3.

Oligien, Oligae.

Die Schwingen mit fast verfinsterten Flecken und Streifen gezeichnet.

2124. Oligia Strigilis Linn. Syst. Phal 161. Praeduncula Schiff. Verz. Noc. U. 2. Hübn. Noc. 95.

2125. O. Furuncula Schiff. Verz. Noc. U. 3. Bicolor Borkh. Noc. 85. Hübn. Noc. 545.

2126. O. Latruncula Schiff. Verz. Noc. U. 1. Hübn. Noc. 94.

2127. O. Vinctuncula Hübn. Noc. 96.

2128. O. Erratricula Hübn. Noc. 537.

Zweyte Familie, Familia B.

Färbige, Coloreae.

Der Rumpf wie die Schwingen fattfärbig; letztere mit blassen Flecken und Wellenlinien blaß bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Atyphen, Atyphae.

Die Schwingen bräunlichgelb, schwärzlichgrau schattig angelegt.

2129. Atypha Pulmonaris Esp. Noc. 72. 5. Hübn. Noc. 98.

2130. A. Argillacea Hübn. Noc. 590.

2131. A. Ochroleuca Schiff. Verz. Noc. T. 4. Hübn. Noc. 92.

2. Verein, Coitus 2.

Epien, Epiae.

Die Schwingen sehr sanftfärbig und zartstreifig.

2132. Epia Echii Borkh. Noc. 67. Brecciaeformis Esp. Noc. 49. 5. Hübn. Noc. 90.

2133. E. Silenes Hübn. Noc. 653.

3. Verein, Coitus 3.

Panoliden, Panolides.

Die Schwingen ziemlich schief bezeichnet und bunt: scheckig gefärbt.

2134. Panolis Flammea Schiff. Verz. Noc. T. 3. Piniperda Esp. Noc. 46. 1. 2. Flamma Fabr. Mant. Noc. 198. & Spreta Bom. 139. Hübn. Noc. 91.

2135. P. Beltis Cram. 396. I.

4. Verein, Coitus 4.

Mamestren, Mamestrae.

Die Schwingen gänzlich schattig angelegt, nur end: wärts mit einem hellen Blitzstreifen bezeichnet.

2136. Mamestra Pisi Linn. Syst. Phal. 172. Hübn. Noc. 429.

2137. M. Unaminis Hübn. Noc. 482. & 556.

2138. M. Leucophaea Schiff. Verz. Noc. O. 5. Fulminea Fabr. Mant. Bom. 210. Bimaculosa Esp. Noc. 53. 1. & Ravida Bomb. 46. 1. 2. Hübn. Noc. 80.

5. Verein, Coitus 5.

Tholeren, Tholerae.

Die Schwingen gleichgrau, nur mit blassen Zeich: nungen bemerkt.

2139. Tholera Cespitis Schiff. Verz. Noc. O. 2. Hübn. Noc. 428.

2140. T. Furva Schiff. Verz. Noc. N. 21. Hübn. Noc. 407.

2141. T. Extrema Hübn. Noc. 414.

Dritte Familie, Familia C.

Blaßsenige, Pallidovenosae.

Die Schwingen weißlich gesent bey färbigem Grunde und zwischen den Senen schwärzlich bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Triphassen, Triphassae.

Die Schwingen buntsenig, porphyrähnlich befleckt und gefärbt.

2142. Triphassa Stalachtis Hübn. Zutr. 149. 150.

2. Verein, Coitus 2.

Lycophotien, Lycophotiae.

Die Schwingen weißsenig und zart weiß gezeichnet, satt bräunlichroth gefärbt.

2143. Lycophotia Porphyrea Schiff. Verz. Noc. O. 17. Artemisia Cram. 396. G. Hübn. 473. & 93.

2144. L. Lidia Cram. 396. D.

2145. L. Cuprea Schiff. Verz. Noc. Y. 3. Haematitedea Esp. Noc. 103. 4. Hübn. Noc. 62.

2146. L. Graminis Linn. Syst. Phal. 73. Tricuspis Esp. Bom. 68. 2. 3. Hübn. Noc. 480. 481.

2147. L. Sannio Cram. 399. D.

3. Verein, Coitus 3.

Neuronien, Neuroniae.

Die Schwingen blaßsenig, und an den gewöhnlichen Flecken und Streifen zierlich schwarz ausgezeichnet.

2148. Neuronia Popularis Fabr. Syst. Bom. 71. Graminis Schiff. Verz. Noc. O. 3. Lolii Esp. Bom. 48. 1. 2. Hübn. Noc. 59.

2149. N. Perplexa Schiff. Verz. Noc. N. 23. Filograma Esp. Noc. 51. 4. Hübn. Noc. 89.

4. Verein, Coitus 4.

Crinoen, Crinones.

Die Schwingen blaßfenig, dunkelſtriemig und mit glänzend weißen Flecken geziert.

2150. Crino Sommeri. Hübn. Achat. ven. Sommeri.

2151. Clara Cram. 400. L. & 311. B.

5. Verein, Coitus 5.

Hadenen, Hadenae.

Die Schwingen faſt netzähnlich hell und ſchwarz gezeichnet.

2152. Hadena Typica Linn. Syst. Phal. 186. Venosa Hübn. Noc. 61.

2153. H. Saponariae Borkh. Noc. 152. Typica Schiff. Verz. Noc. O. 4. Hübn. Noc. 58.

2154. H. Abjecta Hübn. Noc. 539.

2155. H. Praedita Hübn. Noc. 595.

2156. H. Dianthi Hübn. Noc. 587.

2157. H. Capsincola Schiff. Verz. Noc. P. 6. Hübn. Noc. 57.

2158. H. Cucubali Schiff. Verz. Noc. P. 5. Rivularis Fabr. Mant. Noc. 241. Hübn. Noc. 56.

6. Verein, Coitus 6.

Callopiſtrien, Callopistriae.

Die Schwingen faſt eckig, ſonderlich zierlich gezeichnet und lieblich gefärbt.

2159. Callopistria Pteridis Fabr. Ent. Noc. 269. Hübn. Noc. 65.

2160. C. Lagopus Fabr. Syst. Bom. 45. Juventina Cram. 400. N.

Vierte Familie, Familia D.

Gemeine, Communes.

Die Schwingen bläßlich und dunkel bezeichnet, sanft bunt gemischt, gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Trigonophoren, Trigonophorae.

Auf den Schwingen fast dreyeckig angelegt, mit blassen Flecken und dunklen Streifen ausgezeichnet.

2161. Trigonophora Meticulosa Linn. Syst. Phal. 132. Hübn. Noc. 67

2162. T. Scita. Hübn. Noc. 475. & 68.

2163. T. Amethystina Hübn. Noc. 597. 598.

2164. T. Lucipara Linn. Syst. Phal. 187. Hübn. Noc. 55.

2165. T. Empyrea. Flammea Esp. Bom. 53. 3. Hübn. Noc. 646. & 63.

2166. T. Focula Cram. 383. G. H.

2167. T. Commelinae Abb. 95. Androgea Cram. 310 D.

2168. T. Chalcedonia Hübn. Noc. 404.

2. Verein, Coitus 2.

Dichonien, Dichoniae.

Die Schwingen verworren bezeichnet und vermischt gefärbt.

2169. Dichonia Operosa. Areola Esp. Noc. 62. 4. Lithoriza Borkh. Noc. 140. Hübn. Noc. 398.

2170. D. Proxima Hübn. Noc. 409.

2171. D. Distans Hübn. Noc. 522. 523.

2172. D. Convergens Schiff. Verz. Noc. P. 8. Hübn. Noc. 84.

2173. D. Protea Schiff. Verz. Noc. P. 7. Hübn. Noc. 406.

2174. D. Aeruginea Hübn. Noc. 374.

3. Verein, Coitus 3.

Euroiden, Euroides.

Die Schwingen ziemlich deutlich mit den gewöhnli-

chen Flecken und Streifen bezeichnet und im Grunde färbig gemischt.

2175. Eurois Herbida Schiff. Verz. Noc. O. 22. Egregia Esp. Noc. 40. 7. Hübn. Noc. 76 & 505.

2176. E. Tullia Cram. 400. E.

2177. E. Speciosa Hübn. Noc. 491.

2178. E. Tincta Ochs. Nachtr. 74. S. Hepatica Schiff. Verz. Noc. O. 16. Hübn. Noc. 77.

2179. E. Advena Schiff. Verz. Noc. L. 15. Tincta Borkh. Noc. 219. Hübn. Noc. 81.

2180. E. Occulta Linn. Syst. Pbal. 147. Hübn. Noc, 79.

2181. E. Nebulosa Hufn. n. 103. Typica Esp. Noc. 94. 2. Hübn. Noc. 78.

4. Verein, Coitus 4.

Aethrien, Aethriae.

Die Schwingen sehr deutlich fleckig und streifig bezeichnet, heiter blaulichgrau gefärbt.

2182. Aethria Serena Schiff. Verz. Noc. P. 4. Placida Esp. Noc. 87. 5. 6. Hübn. Noc. 54.

2183. A. Glauca Hübn. Noc. 410.

5. Verein, Coitus 5.

Barathren, Barathrae.

Die Schwingen erdfärbig gemischt, wie bestäubt.

2184. Barathra Brassicae Linn. Syst. Phal. 163. Hübn. Noc. 88. & Anceps Schiff. Verz. Noc. N. 22. Hübn. Noc. 484.

2185. B. Albicolon Ochs. Nachtr. 77. S. Hübn. Noc. 542. 533.

6. Verein, Coitus 6.

Astrapeten, Astrapetes.

Die Schwingen zwischen den Mittelflecken fast zahnförmig, gezeichnet und nahe am Rande blitzzackig gestreift.

2186. Astrapetis Dentina Schiff. Verz. Noc. O. 8. Hübn. Noc. 408.

2187. A. Remissa Hübn. Noc. 423.

2188. A. Distincta Hübn. Achat. vulg. Distincta.

2189. Contigua Schiff. Verz. Noc. O. 7. Spartii Borkh. Noc. 147. a. Hübn. Noc. 609. & 85.

2190. A. Genistae Borkh. Noc. 147. b. Hübn. Noc. 611. 612.

2191. A. Valida Hübn. Noc. 606. — 608.

2192. A. Satura Schiff. Verz. Noc. P. 2. Porphyrea Esp. Noc. 66. 5. Hübn. Noc. 75.

2193. A. Gemina Hübn. Noc. 483.

2194. A. Achates Hübn. Noc. 498. & 610

7. Verein, Coitus 7.

Diataraxien, Diataraxiae.

Die Schwingen blutfärbig, mit hellem Fleck und hellen Striemen.

2195. Diataraxia Splendens Hübn. Noc. 400.

2196. D. Fibrosa Hübn. Noc. 385.

2197. D. Temera Hübn. Noc. 393.

2198. D. Leucostigma Hübn. Noc. 375.

2199. D. Oleracea Linn. Syst. Phal. 171. Hübn. Noc. 87.

2200. D. Aliena Hübn. Noc. 441.

2201. D. Suasa Schiff. Verz. Noc. O. 18. Hübn. Noc. 426.

2202. D. Chenopodii Schiff. Verz. Noc O. 6. Hübn. Noc. 86.

8. Verein, Coitus 8.

Tracheen, Tracheae.

Die Schwingen zierlich angelegt, rauhlich grün gefleckt, sonst glatt.

2203. Trachea Atriplicis Linn. Syst. Phal. 173. Hübn. Noc. 83.

9. Verein, Coitus 9.

Hapalien, Hapaliae.

Die Schwingen unstet zart bezeichnet, fast gänzlich blaß gefärbt.

2204. Hapalia Praecox Linn. Syst. Phal. 174. Praeceps. Schiff. Verz. Noc. O. 12. Hübn. Noc. 70.

2205. H. Infecta Ochs. Nachtr. 67. S. Praecox Hübn. Noc. 359.

2206. H. Mitis. Clara Cram. 358. I.

5. Stamm, Stirps V.

Graphiphoren, Graphiphorae.

Ihre Flügel sind ebenrändig, mit schwarzen Zeichen nebst den gewöhnlichen Flecken und Streifen bemerkt; auch ist ihr Wanst auf dem Rücken glatt.

Erste Familie, Familia A.

Gesäumte, Fimbriatae.

Die Schwingen spärlich schwarz gezeichnet, trüblich schattig gefärbt; die Senken aber gelb, schwarzsäumig.

1. Verein, Coitus 1.

Anarten, Anartae.

Die Schwingen zierlich und buntlich angelegt; die Senken weiß befränzt.

2207. Anarta Myrtilli Linn. Syst. Phal. 167. Hübn. Noc. 98.

2208. A. Cordigera Thunb. Mus. VI. 4. Albirena Hübn. Noc. 99.

2. Verein, Coitus 2.

Epilecten, Epilectae.

Der Rumpf wie die Schwingen buntscheckig, und leztere dunkel gesäumt.

2209. Epilecta Linogrisea Schiff. Verz. Noc. M. 22 Hübn. Noc. 101. & 531.

3. Verein, Coitus 3.

Triphänen, Triphaenae.

Die Schwingen braunschattig am Senenrande schwarz bezeichnet; die Senken ziemlich schmal schwarz gesäumt.

2210. Triphaena Interjecta Hübn. Noc. 107.

2211. T. Subsequa Schiff. Verz. Noc. M. 21. Hübn. Noc. 106.

2212. T. Comes. Subsequa Esp. Noc. 25. 1. 3. Hübn. Noc. 521.

2213. T. Consequa Hübn. Noc. 105.

2214. T. Pronuba Linn. Syst. Phal. 121. Hübn. Noc. 103.

4. Verein, Coitus 4.

Lampren, Lampraе.

Die Schwingen außerhalb mit einem winkligen Strich, die Senken mit einem sehr breiten Saum ausgezeichnet.

2215. Lampra Fimbria Linn. Syst. Phal. 123. Hübn. Noc. 552. 551 & 102.

5. Verein, Coitus 5.

Euschesien, Euschesies.

Die Schwingen nachläßig bezeichnet dunkel gefärbt; die Senken nur im innern Raume gelb.

2216. Euschesis Janthina Schiff. Verz. Noc. M. 19. Domiduca Knoch. Beitr. I. Phal. 14. Hübn. Noc. 100.

2217. E. Unxia Hübn. Noc. 513. Puera Cram. 103. D.

2218. E. Clotilda Stoll. 34. 4.

Zweyte Familie, Familia B.

Deutliche, Perspicuae.

Die Schwingen blaß gefleckt und zwischen den Flecken mit schwärzlichen Zeichen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Amatheen, Amathees.

Die Schwingen nur am Senenrande schwarz bezeichnet; die Senken grau.

2219. Amathes Litura Linn. Syst. Phal. 192. Hübn. Noc. 127.

2220. A. Baja Schiff. Verz. Noc. M. 3. Hübn. Noc. 119.

2. Verein, Coitus 2.

Diarsien, Diarsiae.

Die Schwingen nur zwischen den Mittelflecken dunkel bezeichnet.

2221. Diarsia Dahlii Hübn. Noc. 465. 466.

2222. D. Festiva Schiff. Verz. Noc. T. 20. Primulae Esp. Noc. 57. 5. 6. Hübn. Noc. 114. & 467. — 469.

2223. D. Carnea Thunb. Tecta Hübn. Noc. 377. & Ampla 425.

2224. D. Brunnea Schiff. Verz. Noc. O. 15. Fragariae Borkh. Noc. 196. Hübn. Noc. 121.

2225. D. Punicea Hübn. Noc. 115. & Congener 617.

2226. D. Leucographa Schiff. Verz. Noc. O. 21. Radica Esp. Noc. 72. 4. Quadratum. Hübn. Noc. 477.

3. Verein, Coitus. 3.

Megasemen, Megasemae.

Die Schwingen sowohl an der Wurzel und am Senenrande als hinter den Mittelflecken schwarz bezeichnet.

2227. Megasema Triangulum Hufn. Tab. 58. Rhomboidea Esp. Noc. 70. 3. Sigma Knoch. Beitr. III. Phal. 10.

2228. M. Apronia Cram. 196. E.

2229. M. Ditrapezium Schiff. Verz. Noc. M. 24. Tristigma Ochs. Nachtr. 69. S. Hübn. Noc. 472. & 113.

2230. M. Stigmatica Hübn. Noc. 470. 471.

2231. M. C nigrum Linn. Syst. Phal. 162. Hübn. Noc. 111.

4. Verein, Coitus 4.

Ochropleuren, Ochropleurae.

Die Schwingen am Senenrande blaßgelb, übrigens bräunlichroth, und durch die Mitte schwarz angelegt.

2232. Ochropleura Musiva Hübn. Noc. 118.

2233. O. Plecta Linn. Syst Phal. 157. Hübn. Noc. 117.

5. Verein, Coitus 5.

Metaxyen, Metaxyae.

Die Schwingen hinter den Mittelflecken schwarz angelegt, dem Senenrande nach blaß gefärbt.

2234. Metaxyja Vitta Borkh. Noc. 191. Hübn. Noc. 533. 534.

2235. M. Obelisca Schiff. Verz. Noc. N. 5. Hübn. Noc. 123.

2236. M. Aquilina Schiff. Verz. Noc N. 6. Hübn. Noc. 135. & 535. 536.

2237. M. Tritici Linn. Syst. Phal. 179. Pratincola Borkh. Noc. 225. Hübn. Noc. 567. & Fictilis 479.

2238. M. Fuliginea Hübn. Noc. 602.

2239. M. Ocellina Schiff. Verz. Noc. M. 25. Phyteumae Esp. Noc. 113. 3. 4. Hübn. Noc. 599. 439 & 129.

2240. M. Recussa Hübn. Noc. 630.

2241. M. Polygona Schiff. Verz. Noc. M. 16. Hübn. Noc. 125.

2242. M. Rectangula Schiff. Verz. Noc. M. 15. Hübn. Noc. 110.

6. Verein, Coitus 6.
Eugraphen, Eugraphae.

Die Schwingen mit schmalen schwarzen Zeichen zwischen den Mitteflecken bemerkt.

2243. Eugraphe Characterea Schiff. Verz. Noc. M. 11. Signum Fabr. Mant. Noc. 141. Sigma Hübn. Noc. 122.

2244. E. Depuncta Linn. Syst. Phal. 191. Mendosa Hübn. Noc. 120 & 502.

2245. E. I intactum Hübn. Noc. 130.

2246. E. Glareosa Esp. Noc. 49. 3. Hebraica Hübn. Noc. 642. 643.

7. Verein, Coitus 7.
Episemen, Episemae.

Die Schwingen mit gelblich weiß umzogenen Mitteflecken und schwarzen Zeichen inzwischen bezeichnet.

2247. Episema I cinctum Schiff. Verz. Noc. M. 10. Cincta Fabr. Mant. Noc. 143. Hübn. Noc. 144.

2248. E. Gothica Linn. Syst. Phal. 159. Nun atrum Schiff. Verz. Noc. M. 9. Hübn. Noc. 112.

2249. E. Tersa Schiff. Verz. Noc. L. 12. Hübn. Noc. 140.

2250. E. Hirta Hübn. Noc. 591.

2251. E. Trimacula Schiff. Verz. Bom. M. 4. Hübn. Noc. 141. 142.

Dritte Familie, Familia C.
Undeutliche, Obsoletae.

Die Schwingen sehr undeutlich schwarz gezeichnet und schlechtfärbig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.
Ogygien, Ogygiae.

Die Schwingen mit einem Strich, vom Rumpf aus schwarz bezeichnet, fast buntlich gemischt.

2252. Ogygia Flammatra Schiff. Verz. Noc. N. 1. Hübn. Noc. 124.

2253. O. Basilinea Schiff. Verz. Noc. M. 12. Hübn. Noc. 427.

2254. O. Signifera Schiff. Verz. Noc. N. 8. Hübn. Noc. 132.

2255. O. Ravida Schiff. Verz. Noc. N. 7. Hübn. Noc. 126. & 160.

2256. O. Forcipula Schiff. Verz. Noc. M. 14. Hübn. Noc. 547. & 128.

2. Verein, Coitus 2.

Exarnen, Exarnes.

Die Schwingen versteckt schwarz gezeichnet, an ihren Mittesflecken.

2257. Exarnis Ruris Hübn. Noc. 416.

2258. E. Ypsilon Schiff. Verz. Noc. M. 13. Hübn. Noc. 136.

2259. E. Testacea Schiff. Verz. Noc. N. 11. Hübn. Noc. 139.

2260. E. Caecimacula Schiff. Verz. Noc. N. 14. Millegrana Esp. Noc. 71. 1. Hübn. Noc. 137.

2261. E. Augur Fabr. Syst. Noc. 77. Omega Esp. 52. 2. Noc. Hübn. Noc. 148.

6. Stamm, Stirps VI.

Agroten, Agrotes.

Ihre Flügel haben wie ihr Leib ein schlechtes Ansehen; die Schwingen sind mit den gewöhnlichen Flecken und Streifen bezeichnet, erdfärbig; die Senken weißlich.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Ambiguae.

Der Nierenfleck der Schwingen bläßlich, in schattigem Grunde.

1. Verein, Coitus 1.

Brithyen, Brithyes.

Die Schwingen dunkel gefärbt, fast die Zeichnungen verfinsternd.

2262. Brithys Encausta Hübn. Noc. 392.

2263. B. Dominica Cram. 399. H.

2264. B. Pancratii Cyr. Ent. Hübn. Noc. 391.

2265. B. Lutulenta Schiff. Verz. Noc. N. 16. Hübn. Noc. 159.

2. Verein, Coitus 2.

Scotien, Scotiae.

Die Schwingen kaum blässer und dunkler bezeichnet als gefärbt, fast verschattet.

2266. Scotia Obscura Hübn. Noe. 157.

2267. S. Tenebrosa. Feruginea Esp. Bom. 47. 5. 6. Hübn. Noc. 158. & 503.

2268. S. Umbrosa Hübn. Noc. 456. 457.

2269. S. Cinerea Schiff. Verz. Noc. N. 3. Hübn. 155. 156. & Obscura 490.

3. Verein, Coitus 3.

Brotiden, Brotides.

Die Schwingen erdfärbig, blaß gefleckt und gestreift, schwarz bezeichnet.

2270. Brotis Fumosa Schiff. Verz. Noc. N. 18. Hübn. Noc. 153.

2271. B. Sordida Schiff. Verz. Noc. N. 17. Hübn. Noc. 154.

Zweyte Familie, Familia B.

Bekannte, Diffamatae.

Die Schwingen mit drei Mittesflecken bezeichnet und schattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Peridromen, Peridromae.

Die Schwingen schattig gefeldet, im Mitteraume, und auch die Flecke schattig gekernt.

2272. Peridroma Saucia Hübn. Noc. 378.
2273. P. Aequa Hübn. Noc. 564.
2274. P. Idonea Cram. 295. H.
2275. P. Suffusa Schiff. Verz. Noc. N. 4. Hübn. Noc. 134.

2. Verein, Coitus 2.

Agronomen, Agronomae.

Die Schwingen mit schattig gekernten Mittesflecken und schattigem Saume ausgezeichnet.

2276. Agronomae Crassa Hübn. Noc. 560. & 152.
2277. A. Cornea. Tritici Schiff. Verz. Noc. 10. Hübn. Noc. 151.
2278. A. Valligera Schiff. Verz. Noc. N. 9. Hübn. Noc. 150. & 478.
2279. A. Exclamationis Linn. Syst. Phal. 155. Hübn. Noc. 149.

3. Verein, Coitus 3.

Georycen, Georyces.

Die Schwingen trüb besprengt, bey gemeiner Anlage und Färbung.

2280. Georyx Segetum Schiff. Verz. Noc. N. 12. Hübn. Noc. 147. & Segetis Fabr. Spec. Noc. 78. Hübn. Noc. 146.
2281. G. Corticea Schiff. Verz. Noc. N. 13. Hüb n.Noc 145.
2282. G. Unicolor Hübn. Noc. 544.
2283. G. Cursoria Borkh. Noc. 230. Hübn. Noc. 540.

4. Verein, Coitus 4.

Telmien, Telmiae.

Die Schwingen leimfärbig, mit einem schwarzen Mittestrich, worauf die gewöhnliche Flecke sind.

2284. Telmia Sagitta Hübn. 596.

2285. T. Spinula Hübn. Noc. 389.

2286. T. Exigua Hübn. Noc. 362.

7. Stamm, Stirps VII.

Gloien, Gloiae.

Der Rumpf ziemlich haarig aber glatt, die Schwingen mit blaß umzogenen Mittesflecken und schwarzen Pünktgen auf den Senen bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Rauhliche, Pubescentes.

Die Schwingen dunkel gemischt oder bestäubt, vor dem Franzenrande mit einem fast geraden blassen Streif bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Cerasten, Cerastes.

Die Schwingen mit fast gänzlich eingefärbten hellen Nierenfleck und schwärzlichen Sprengeln am Senenrande bezeichnet.

2287. Cerastis Rubricosa Schiff. Verz. Noc. M. 4. Hübn. Noc. 509. & 430.

2288. C. Cervina. Leucographa Hübn. Noc. 572.

2289. C. Leucographa Schiff. Verz. Noc. O. 21. Hübn. Noc. 411.

2. Verein, Coitus 2.

Orthosien, Orthosiae.

Die Schwingen mit halb schwarz gekernten Nierenfleck bezeichnet, übrigens deutlicher Anlage.

2290. Orthosia Instabilis Schiff. Verz. Noc. L. 1. Donasa Esp. Bom. 67. 1. Hübn. Noc. 165.

2291. O. Firma.

2292. O. Lota Linn. Syst. Phal. 70. Munda Hübn. Noc. 167.

2293. O. Munda Schiff. Verz. Noc. L. 7. Lota Hübn. Noc. 166.

2294. O. Macilenta Hübn. Noc. 418.

2295. O. Gracilis Schiff. Verz. Noc. L. 4. Lepida Borkh. Noc. 249. Hübn. Noc. 168.

3. Verein, Coitus 3.

Monimen, Monimae.

Die Schwingen mit dunklen Mittefleden und schwarzen Pünktgen in blassem färbigstaubigen Grunde bezeichnet.

2296. Monima Miniosa Schiff. Verz. Noc. T. 14. Hübn. Noc. 174.

2297. M. Ambigua Schiff. Verz. Noc. L. 10. Pulverulenta Esp. Bom. 76. 5. 6. Hübn. Noc. 173.

4. Verein, Coitus 4.

Conistren, Conistrae.

Die Schwingen dunkel bestäubt, blaß gezeichnet.

2298. Conistra Veronicae Hübn. Noc. 541.

2299. C. Pulverea Hübn. Noc. 169.

2300. C. Neurodes Hübn. Noc. 568.

5. Verein, Coitus 5.

Agrocholen, Agrocholae.

Die Schwingen gallfärbig, blaß gezeichnet und am Senenrande schwärzlich bemerkt.

2301. Agrochola Pistacina Schiff. Verz. Noc. M. 1. Hübn. Verz. Noc. 131.

2302. A. Lychnidis Schiff. Verz. Noc. L. 5. Hübn. Noc. 464.

2303. Dolosa Hübn. Noc. 632.

6. Verein, Coitus 6.

Cuphonoen, Cuphonoae.

Die Flecke und Streife auf den Schwingen nur blaß aber ſcharf, der Grund gleichfärbig.

2304. Cuphanoa Stabilis Schiff. Verz. Noc. L. 2. Hübn. Noc. 171.

2305. C. Humilis Schiff. Verz. Noc. L. 3. Hübn. Noc. 170.

2306. C. Nitida Hübn. Noc. 180.

Zweite Familie, Familia B.
Beſprengte, Aspersae.

Die Schwingen mit einer doppelten Reihe ſchwarzer Pünktgen außerhalb bezeichnet, auch übrigens mit dunklen Stäubgen beſtreut.

1. Verein, Coitus 1.
Caradrinen, Caradrinae.

Die Mittefleckе der Schwingen klein, blaß umzogen die Linien und die Punktreihe zart.

2307. Caradrina Neglecta Hübn. Noc. 160.

2308. C. Respersa Schiff. Verz. Noc. T. 19. Margaritacea Borkh. Noc. 98. Hübn. Noc. 164.

2309. C. Laevis Hübn. Noc. 163.

2310. C. Blanda Schiff. Verz. Noc. L. 8. Plantaginis Hübn. Noc. 576 & Blanda 162.

2311. C. Alsines Borkh. Noc. 254. Hübn. Noc. 577.

2312. C. Taraxaci Hübn. Noc. 575.

2. Verein, Coitus 2.
Elaphrien, Elaphriae.

Die Schwingen dunkel gefleckt, zart bezeichnet und ſchattig gefärbt.

2313. Elaphria Sepii Hübn. Noc. 161.

2314. E. Grata Hübn. Zutr. 71. 72.

Dritte Familie, Familia C.
Braune, Badiae.

Der Kopf, Rumpf und die Schwingen braun gefärbt und mit blassen Mittesflecken, Wellenstreifen und schwarzen Pünktgen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Orrhodien, Orrhodiae.

Die Schwingen glatt, glänzend rostbraun, mit halb schwarzen Nierenfleck ausgezeichnet.

2315. Orrhodia Silene Schiff. Verz. Noc. R. 1. V punctatum Esp. Noc. 76. 4. Hübn. Noc. 175.

2316. O. Erythrocephala Schiff. Verz. Noc. M. 5. Hübn. Noc. 176.

2317. O. Rubiginea Schiff. Verz. Noc. R. 8. Tigerina Esp. Noc. 44. 3. 4. Hübn. Noc. 183.

2318. O. Vaccinii Linn. Syst. Phal. 166. Hübn. Noc. 177.

2319. O. Glabra. Schiff. Verz. Noc. R. 10. Hübn. Noc. 438.

2320. O. Serpylli Hübn. Noc. 488.

2321. O. Polita Schiff. Verz. Noc. R. 3. Hübn. Noc. 178.

2322. O. Spadicea. Schiff. Verz. Noc. R. 6. Hübn. Noc. 179.

2323. O. Cruda Schiff. Verz. Noc. L. 9. Hübn. Noc. 172.

2. Verein, Coitus 2.

Eupsilien, Eupsiliae.

Die Schwingen gezähnt mit einem aus weißen Punkten bestehenden Mittesfleck bezeichnet.

2324. Eupsilia Satellitia Linn. Syst. Phal. 176. Hübn. Noc. 182.

Vierte Familie, Familia D.

Rostfärbige, Ferrugineae.

Die Schwingen trübgelb, schattig und schwärzlich gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Gortynen, Gortynae.

Die Schwingen roſtbraun, ſchattig bandirt und ſchwärzlichbraun bezeichnet.

2325. Gortyna Micacea Esp. Noc. 66. 6. Cypriaca Hübn. Noc. 224.

2. Verein, Coitus 2.

Sideriden, Siderides.

Die Schwingen roſtbraun, ſchattig und wellig ſchwärzlichbraun bezeichnet.

2326. Sideridis Evidens Hübn. Noc. 369.

2327. S. Ferruginea Schiff. Verz. Noc. R. 7. Rubecula Esp. Noc. 78. 4. Hübn. Noc. 181.

2328. S. Xanthographa Schiff. Verz. Noc. O. 20. Hübn. Noc. 138.

2329. S. Nictitans Linn. Syst. Phal. 141. Chrysographa. Schiff. Verz. Noc. O. 23. Hübn. Noc. 221.

2330. S. Luteago Schiff. Verz. Noc. S. 6. Hübn. Noc. 184.

3. Verein, Coitus 3.

Orbonen, Orbonae.

Die Schwingen roſtbraun; mit blaßgelben Linien bezeichnet; die Senken der Länge nach grau ſchattig.

2331. Orbona Serotina Ochs. Nachtr. 85. S. Hübn. Noc. 104. & 603.

2332. O. Rufina Linn. Syst. Phal. 72. Emmedonia Cram. 247. D. Catenata Esp. Noc. 44. 1. 2. Hübn. Noc. 184.

4. Verein, Coitus 4.

Xeſtien, Xestiae.

Die Schwingen roſtgelb, ſchattig und dunkel gewellt; die Senken ſchattig bandirt.

2333. Xestia Ochrojois. Ochreago Hübn. Noc. 431.
2334. X. Chloropha Hübn. Zutr. 73. 74.

8. Stamm, Stirps VIII.

Xanthien, Xanthiae.

Der Kopf, der Rumpfsrücke glatt und wie die obere Fläche der Schwingen gelb gegründet; die Senken und der Wanst weißlich; mit halb dunklem Nierenfleck und schattigen Wellenstreifen bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Verworrene, Perplexae.

Die Schwingen ziemlich regelhaft gezeichnet und abwechslend gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Pyrrhien, Pyrrhiae.

Die Schwingen blaßgelb gefärbt, röthlich bandirt; die Senken weißlichgrau, schattig bandirt.

2335. Pyrrhia Purpurago. Purpurina Esp. Noc. 116.
2. Rutilago Hübn. Noc. 519.
2336. P. Roseago. Purpura Hübn. Noc. 621.
2337. P. Rutilago Schiff. Verz. Noc. S. 4. Umbrago Esp. Noc. 106. 6. 7. Umbra Borkh. Noc. 289. Hübn. Noc. 185.

2. Verein, Coitus 2.

Ochrien, Ochriae.

Die Schwingen blaßfärbig, satt und schattig bandirt; die Senken weißlichgrau.

2338. Ochria Aurago Schiff. Verz. Noc. S. 7. Praetexta Esp. Noc. 45. 2. Rutilago Borkh. Noc. 290. Hübn. Noc. 196. 197.
2339. O. Oo Linn. Syst. Phal. 81. Ferruginago Hübn. Noc. 195.

2340. O. Flavago Schiff. Verz. Noc. S. 5. Rutilago Fabr. Mant. Noc. 167. Hübn. Noc. 186. 187.

Zweite Familie, Familia B.
Richtige, Planae.

Die Schwingen ganz schattig gefärbt; die Senken gemischt.

1. Verein, Coitus 1.
Jodien, Jodiae.

Die Schwingen röthlichgelb gefärbt, wie der Rumpf; die Senken und der Wanst weißlich.

2341. Jodia Rufago Hübn. Zutr. 61. 62.

2342. J. Croceago Schiff. Verz. Noc. S. 2. Fulvago Esp. Noc. 97. 3. 4.

2. Verein, Coitus 2.
Cirrhien, Cirrhiae.

Die Schwingen ganz hellgelb gefärbt, zart braun bezeichnet.

2343. Cirrhia Citrago Linn Syst. Phal. 189. Noc. 188.

2344. C. Fulvago Linn. Syst. Phal. 190. Sulphurago Schiff. Verz. Noc. S. 8. Ochrago Esp. Noc. 98. 1. Hübn. Noc. 194.

3. Verein, Coitus 3.
Citrien, Citriae.

Die Schwingen schwefelgelb, blaß und satt rostbraun gefleckt.

2345. Citria Cerago Schiff. Verz. Noc. S. 9. Flavescens Esp. Noc. 43. 2. Hübn. Noc. 190.

2346. C. Silago. Flavago Fabr. Mant. Noc. 171. Togata Esp. Noc. 45. 1. Ochreago Borkh. Noc. 288. Hübn. Noc. 191.

4. Verein, Coitus 4.
Mellinien, Melliniae.

Die Schwingen neblig gestreift, bey bräunlich gelber Färbung.

2347. Mellinia Palleago. Ocellaris Borkh. Noc. 273. Hübn. Noc. 442. & 192.

2348. M. Gilvago Schiff. Verz. Noc. S. 10. Hübn. Noc. 193. & 443.

5. Verein, Coitus 5.

Enargien, Enargiae.

Die Schwingen mit fast winkligen Linien bezeichnet, blaß gefärbt.

2349. Enargia Palleacea Esp. Noc. 43. 3. 4. Fulvago Schiff. Verz. Noc. S. 1. Gilvago Borkh. Noc. 295. Hübn. Noc. 198. 199.

9. Stamm, Stirps IX.

Cosmien, Cosmiae.

Die Schwingen ohne scheinbare Mittefleck, mit schiefen fast winkligen Linien, und einzelen Punkten bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Gemeine, Communes.

Die Schwingen mit schier ein Fünfeck andeutenden Linien und schwarzen Punkten bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Calymnien, Calymniae.

Die Schwingen schattig zimmetfärbig; mit undeutlichen Mittefleken und Endpunkten besetzt.

2350. Calymnia Trapezina Linn. Syst. Phal. 99. Hübn. Noc. 200.

2351. C. Affinis Linn. Syst. Phal. 144. Hübn. Noc. 201.

2. Verein, Coitus 2.

Eustegnien, Eustegniae.

Die Schwingen bräunlichroth, am Schwingrande die Linien ausgebreitet und weiß gefärbt.

2352. Eustegnia Diffinis Linn. Syst. Phal. 146. Hübn. Noc. 202.

2353. E. Pyralina Schiff. Verz. Noc. T. 12. Hübn. Noc. 203.

10. Stamm, Stirps X.

Bombyclen, Bombyciae.

Die Ohren dicklich, die Streichler klein. Der Rücke des Rumpfes hoch behaart; die Schwingen nachlässig bezeichnet.

Erste Familie, Famila A.

Stolze, Superbae.

Der Rumpfsrücke sehr hoch und zierlich bekleidet; die Schwingen sonderbar sanft bunt angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Habrosynen, Habrosynae.

Die Schwingen mit kleinen Mittelflecken uud Zackenlinien, achatartig bezeichnet und gefärbt.

2354. Habrosyne Derasa Linn. Syst. Phal. 158. Hübn. Noc. 66.

2. Verein, Coitus 2.

Thyatiren, Thyatirae.

Die Schwingen uit ansehnlichen hellen Flecken an den Ränden, übrigens mit dunklen Linien ausgezeichnet.

2355. Thyatira Batis Linn. Syst. Phal. 97. Hübn. Noc. 65.

273

Bombycien.

Zweyte Familie, Familia B.

Scheue, Pavidae.

Der Rücke fast zierlos bedeckt, die Schwingen sanft grau, dunkel gewellt.

1. Verein, Coitus 1.

Polyplocen, Polyplocae.

Die Schwingen vielstreifig und fleckig bunt gemischt.

2356. Polyploca Xanthoceros Borkh. Noc. 117. Flavicornis Schiff. Verz. Noc. H. 6. Hübn. Noc. 205.

2. Verein, Coitus 2.

Palimpsesten, Palimpsestes.

Die Schwingen mit unrichtigen Mittefleckeu und fast geraden Linien bezeichnet.

2357. Palimpsestis Octogesima. Hübn. Beitr. I. 1. G. Octogena Esp. Noc. 49. 4. Or Borkh. Noc. 260.

2358. P. Or Schiff. Verz. Noc. T. 5. Consobrina Borkh. Noc. 261. Octogena Esp. Noc. 49. 5.

2359. Flavicornis Linn. Syst. Phal. 182. & Ocularis 100. & Sanguinolenta 101. Hübn. Noc. 208.

3. Verein, Coitus 3.

Tetheen, Tetheae.

Die Schwingen nur mit schwarzen Punkten im Mittelraume bemerkt, übrigens gewässert.

2360. Tethea Duplaris Linn. Syst. Phal. 343. Bipuncta Borkh. Noc. 264. Undosa Hübn. Noc. 211.

2361. T. Fluctuosa Hübn. Noc. 212.

4. Verein, Coitus 4.

Asphalien, Asphaliae.

Die Schwingen nur mit blassen Mittepunkten bezeichnet und bandweise braun gewässert.

2362. Asphalia Diluta Schiff. Verz. Noc. T. 6. Hübn. Noc. 206.

2363. A. Ruficollis Schiff. Verz. Noc. T. 7. Hübn. Noc. 207.

11. Stamm, Stirps XI.

Heliophilen, Heliophilae.

Ihr Rücke ziemlich glatt, einfärbig; die Schwingen mit wenigen eigenen Zeichnungen bemerkt.

Erste Familie, Familia A.

Abgetheilte, Divisatae.

Die Schwingen fast eigenförmig und mit hellfärbigen Mittezeichen und Linien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Ipimorphen, Ipimorphae.

Die Schwingen mit fast gemeinen Mitteflecken und geraden Streifen bezeichnet.

2364. Ipimorpha Retusa Linn. Syst. Phal. 193. Hübn. Noc. 214.

2365. I. Subtusa Schiff. Verz. Noc. T. 17. Hübn. Noc. 213.

2. Verein, Coitus 2.

Atethmien, Atethmiae.

Die Schwingen nur mit einem Mittefleck und zweyen Linien bezeichnet.

2366. Atethmia Xerampelina Esp. Noc. 104. 5. Hübn. Noc. 421.

2367. A. Ambusta Schiff. Verz. Noc. T. 16. Hübn. Noc. 215.

2368. A. Subusta Hübn. Zutr. 105. 106.

3. Verein, Coitus 3.

Mythimnen, Mythimnae.

Die Schwingen mit ziemlichen Mittefleckeu und rückwärts genäherten Linien ausgezeichnet.

2369. Mythimna Oxalina Hübn. Noc. 219.

2370. M. Acetosellae Schiff. Verz. Noc. Q. 1. Hübn. Noc. 220.

Zweyte Familie, Familia B.
Streifige, Lineatae.

Die Schwingen mit unrichtigen Mittefleckeu und dunklen Linien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Aletien, Aletiae.

Die Schwingen mit ungewöhnlichen Mittezeichen und faſt welligen Linien bezeichnet.

2371. Aletia Vitellina Hübn. Noc. 379. & 539.

2372. A. Conigera Schiff. Verz. Noc. Q. 3. Hübn. Noc. 222.

2373. A. Turca Linn. Syst. Phal. 140. Hübn. Noc. 218.

2. Verein, Coitus 2.
Hyphilaren, Hyphilarae.

Die Schwingen mit undeutlichen Mittezeichen und Wellenlinien bezeichnet, ſchattig angelegt.

2374. Hyphilare Albipuncta Schiff. Verz. Noc. Q. 4. Hübn. Noc. 223.

2375. H. Lithargyrea Esp. Noe. 45. 6. Hübn. Noc. 225.

3. Verein, Coitus 3.
Meriſten, Meristes.

Die Schwingen faſt nur mit geraden dunklen Linien bemerkt.

2376. Meristis Trilinea Schiff. Verz. Noc. Q. 5. Hübn. Noc. 216.

2377. M. Bilinea Hübn. Noc. 217.

Dritte Familie, Familia C.
Blaßfärbige, Pallidae.

Der Kopf, Rumpf und die Schwingen ziemlich blaßfärbig; die Senken fast farblos.

1. Verein, Coitus 1.
Calamien, Calamiae.

Die Schwingen fast zeichenlos, gleichfärbig, wie getüncht.

2378. Calamia Virens Linn. Syst. Phal. 139. Hübn. Noc. 368. & 235.

2379. C. Phragmitis Hübn. Noc. 230.

2380. C. Fluxa Hübn. Noc. 413.

2. Verein, Coitus 2.
Symiren, Symirae.

Die Senken ziemlich breit fenenschattig.

2381. Symira Fulva Hübn. Noc. 496.

2382. S. Extema Hübn. Noc. 412.

2383. S. Pudorina Schiff. Verz. Noc. Q. 11. Hübn. Noc. 411. & 495.

2384. S. Impudens Hübn. Noc. 229.

2385. S. Nervosa Schiff. Verz. Noc. Q. 12. Oxyptera Esp. Noc. 51. 6. Hübn. Noc. 226.

2386. S. Degener Hübn. Noc. 380.

2387. S. Impura Hübn. Noc. 396.

3. Verein, Coitus 3.
Orien, Oriae.

Die Schwingen mit fast deutlichen Mittelflecken auf schattigem Grunde.

2388. Oria Musculosa Hübn. Noc. 363.

4. Verein, Coitus 4.

Leucanien, Leucaniae.

Die Schwingen weißlich gesent, zwischen den Senen schwärzlich gestriemt.

2389. Leucania Lutosa. Hübn. Noc. 232.

2390. L. Pallens Linn. Syst. Phal. 107. Hübn. Noc. 234.

2391. L. Punctum.

2392. L. Obsoleta Hübn. Noc. 233.

2393. L. Ectypa Hübn. Noc. 231.

2394. L. Congrua Hübn. Noc. 616.

2395. L. Comma Linn. Syst. Phal. 156. Pallens Esp. Noc. 11. 1. 2. Turbida Hübn. Noc. 328. & 618.

2396. L. L album Linn. Syst. Phal. 154. Hübn. Noc. 327.

2397. L. Albilinea Hübn. Zutr. 337. 338.

5. Verein, Coitus 5.

Nonagrien, Nonagriae.

Die Schwingen auf den Senen mit schwarzen Pünktgen bezeichnet, ziemlich färbig.

2398. Nonagria Typhae Esp. Noc. 61. 3. 4. 5. Hübn. Noc. 437. & 415.

2399. N. Sparganii Esp. Noc. 69. 2. 3. Hübn. Noc. 549. 550.

2400. N. Arundinis. Algae Esp. Noc. 61. 1. 2. Hübn. Noc. 386. 387.

2401. N. Guttans. Hübn. Noc. 628. 629.

2402. N. Paludicola Hübn. Noc. 624.

2403. N. Neurica. Hübn. Noc. 381. & 659. 660.

2404. N. Ulvae. Ochs. Schm. 68. Hübn. Noc. 635. 636.

12. Stamm, Stirps XII.

Xylänen, Xylaenae.

Der Rumpf und Wanst kämmig beschopft; die Schwingen ziemlich schmal und lang, hol;ähnlich gezeichnet und gefärbt; die Senken nur schattig angelegt.

Erste Familie, Familia A.

Eigentliche, Propriae.

Die Schwingen fast gleichbreit stumpf, zart dunkelstriemig und bunt lehmfärbig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Axylien, Axyliae.

Der Kopf und Krage lehmgelb; die Schwingen mit doppelt gezeichneten Mittefleck bemerkt.

2405. Axylia Exsoleta. Linn. Syst. Phal. 151. Hübn. Noc. 244.

2406. A. Vetusta Hübn. Noc. 459.

2407. A. Putris Linn. Syst. Phal. 152. Hübn. Noc. 245.

2. Verein, Coitus 2.

Lithophanen, Lithophanae.

Die Schwingen mit fast unscheinbaren Mittefflecken und sehr zarten Striemen bezeichnet.

2408. Lithophane Petrolignea. Petrificata Schiff. Verz. Noc. K. 3. Hübn. Noc. 239.

2409. L. Conspicillaris Linn. Syst. Phal 149. Hübn. Noc. 236. 237.

2410. L. Pulla. Schiff. Verz. Noc. K. 8. Hübn. Noc. 238. & 692. 693.

2411. L. Sagittifera. Hübn. Noc. 532.

2412. L. Divisa Esp. Noc. 79. 5. 6. Deceptricula Hübn. Noc. 30.

3. Verein, Coitus 3.

Graptolithen, Graptolithae.

Die Schwingen mit ziemlich deutlichen gelb bemerkten Mittefflecken und schwarzen Zeichen ausgezeichnet.

2413. Graptolitha Conformis Schiff. Verz. Noc. K. 7. Hübn. Noc. 243.

2414. G. Rizolitha Schiff. Verz. Noc. K. 6. Hübn. Noc. 242.

2415. G. Lapidea. Hübn. Noc. 382.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemeinförmige, Communiformes.

Die Schwingen gemeinförmig, aber mit verworrenen Wellenlinien und Pfeilstriemen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Septiden, Septides.

Die Schwingen nur mit kleinen Pfeilstriemen, inzwischen aber auch mit Pünctgen bezeichnet, hell bräunlich schattig.

2416. Septis Lithoxylea Schiff. Verz. Noc. K. 2. Hübn. Noc. 240.

2417. S. Polyodon Linn. Syst. Phal. 170. Radicea Schiff. Verz. Noc. N. 15. Hübn. Noc. 82.

2418. S. Rurea Fabr. Syst. Noc. 120. Putris Schiff. Verz. Noc. K. 4. Hübn. Noc. 241.

2419. S. Mucens.

2420. S. Materina.

2421. S. Lateritia Hufn. 60. Molochina Hübn. Noc. 74.

2. Verein, Coitus 2.

Auchmiden, Auchmides.

Die Schwingen mit unterschiedenen schwarzen Pfeilstriemen bezeichnet, hellgrau gefärbt.

2422. Auchmis Petroriza Borkh. Noc. 143. Comma Schiff. Verz. Noc. K. 9. Hübn. Noc. 251.

2423. A. Confusa.

2424. A. Hyperici Schiff. Verz. Noc. K. 10. Hübn. Noc. 250.

3. Verein, Coitus 3.

Lithomoien, Lithomoiae.

Die Schwingen deutlich zierlich gefleckt nnd gestriemt, auch lebhaft graubunt gefärbt.

2425. Lithomoia Rectilinea. Esp. Noc. 45. 1. Hübn. Noc. 248.

2426. L. Solidaginis Hübn. Noc. 256.

4. Verein, Coitus 4.

Calliergen, Callierges.

Die Schwingen gleichsam größtentheils mit einem dunklen Schleyer besezt.

2427. Calliergis Ramosa Esp. Bom. 73. 3. Hübn. Noc. 247.

2428. C. Ophiogramma Esp. Noc. 103. 2. Hübn. Noc. 355.

2429. C. Pinastri Linn. Syst. Phal. 160. Hübn. Noc. 246.

2430. C. Eridania. Cram. 352. E. F.

5. Verein, Coitus 5.

Actinotien, Actinotiae.

Die Schwingen mit einem sonderbaren Mittefleck gezeichnet und buntfärbig gestrahlt.

2431. Actinotia Perspicillaris Linn. Syst. Phal. 148. Hübn. Noc. 249.

2432. A. Lyncea. Radiosa Esp. Noc. 116. 3. Hübn. Noc. 434.

6. Verein, Coitus 6.

Omien, Omiae.

Die Schwingen kurz, theils kleinfleckig, senenstriemig und sonderbar angelegt.

2433. Omia Cymbalariae. Hübn. Noc. 432.

2434. O. Antirrhinii. Hübn. Noc. 253.

2435. O. Linariae. Schiff. Verz. Noc. J. 6. Hübn. Noc. 252.

2436. O. Puta Hübn. Noc. 255.

2437. O. Tenera. Hübn. Noc. 254.

13. Stamm, Stirps XIII.

Tribunophoren, Tribunophorae.

Der Krage ansehnlich, dachig aufgerichtet; die Schwingen lang, lanzenförmig; die Senken breit aber kurz; und der Wanst lang.

Erste Familie, Familia A.

Deutlichfleckige, Perdistinctae.

Die Schwingen mit dem gewöhnlichen Nieren- und Kugel-fleck nebst schwarzen Striemen bezeichnet, schattig grau gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Euderäen, Euderaeae.

Die Schwingen mit bläßlichen Mittefleckeu und Eckzeichen, in buntgrauer Färbung bemerkt.

2438. Euderaea Asteris Schiff. Verz. Noc. J. 10. Hübn. Noc. 506. & 260.

2439. E. Dracunculi. Hübn. Noc. 586.

2. Verein, Coitus 2.

Eucalimien, Eucalimiae.

Die Schwingen mit dunklern Mittefleckeu und Eckzeichen geziert; schattig grau gefärbt.

2440. Eucalimia Gnaphalii. Hübn. Noc. 582. 583.

2441. E. Abrotani. Schiff. Verz. Noc. J. 2. Hübn. Noc. 257.

2442. E. Chrysanthemi. Hübn. Noc. 686. 687.

2443. E. Santonici. Hübn. Noc. 584. 585.

2444. E. Absinthii. Linn. Syst. Phal. 133. Hübn. Noc. 258.

Zweyte Familie, Familia B.

Fleckenlose, Indistinctae.

Die Schwingen kaum deutlich dunkel zackig gestriemt und sehr zärtlich schwarz strichig bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Callänien, Callaeniae.

Die Schwingen glatträndig, nebst dem Leibe blaß grau gefärbt.

2445. Callaenia Umbratica Linn. Syst. Phal. 150. Hübn. Noc. 263.

2446. C. Lactucae. Schiff. Verz. Noc. J. 7. Hübn. Noc. 262.

2447. C. Lucifuga. Schiff. Verz. Noc. J. 11. Umbratica Fabr. Mant. Noc. 297. Hübn. Noc. 264.

2448. C. Chamomillae Schiff. Verz. Noc. J. 3. Hübn. Noc. 261.

2449. C. Tanaceti. Schiff. Verz. Noc. J. 5. Hübn. Noc. 265.

2. Verein, Coitus 2.

Cucullien, Cuculliae.

Die Schwingen zahnrändig, nebst dem Rumpfe blaß braun gefärbt.

2450. Cucullia Verbasci. Linn. Syst. Phal. 153. Hübn. Noc. 266.

2451. C. Scrophulariae. Schiff. Verz. Noc. J. 12. Hübn. Noc. 267.

Dritte Familie, Familia C.

Edle, Nobiles.

Die Schwingen glänzend angelegt und eigen gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Empusen, Empusae.

Die Schwingen ganz zeichenlos, mit dem Rumpfe gleichfärbig.

2452. Empusa Lactea Fabr. Ent. Noc. 369. Hübn. Noc. 448.

2. Verein, Coitus 2.

Argyriten, Argyrites.

Die Schwingen mit perlmuttergleichenden Flecken, in eigenfärbigem Grunde, angelegt.

2453. Argyritis Artemisiae. Schiff. Verz. Noc. J. 9. Argentea Hufn. 28. Hübn. Noc. 259.

2454. A. Argentea Fabr. Ent. Noc. 232. Hübn. Noc. 553.

2455. A. Filia. Cram. 264. D.

14. Stamm, Stirps XIV.

Euphaiden, Euphaides.

Der Krage ansehnlich aber fast glatt anliegend; die Schwingen mit winkligbogigen Wellenlinien und ziemlich ungewöhnlichen Mitteflecken bezeichnet und gemischt gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Gewöhnliche, Consuetae.

Die Schwingen glänzend glatt und sanftfärbig.

1. Verein, Coitur 1.

Periphanen, Periphanae.

Die Schwingen mit unganzen Mitteflecken bezeichnet; schön schattig gefärbt.

2456. Periphanes Delphinii Linn. Syst. Phal. 188. Hübn. Noc. 204. & 622.

2457. P. Spectabilis. Hübn. Noc. 557.

2. Verein, Coitus 2.

Symmeristen, Symmeristae.

Die Schwingen auffen mit stuffig gereihten Strichgen bezeichnet.

2458. Symmerista Albicosta. Hübn. Noc. 440.

2459. S. Politia Cram. 309. F.

3. Verein, Coitus 3.

Abrostolen, Abrostolae.

Die Schwingen mit drey fast verbundenen Mittesflecken bezeichnet und metallisch glänzend gefärbt.

2460. Abrostola Asclepiadis Schiff. Verz. Noc. Y. 2. Hübn. Noc. 627.

2461. A. Triplasia Linn. Syst. Phal. 145. Hübn. Noc. 626. & 268.

2462. A. Urticae Hübn. Noc. 625. & 269.

4. Verein, Coitus 4.

Paecten, Paectae.

Die Schwingen mit undeutlichen Mitteflecken bezeichnet.

2463. Paectes Pygmaea. Hübn. Zutr. 109. 110.

Zweyte Familie, Familia B.
Sonderbare, Peculiares.

Die Ohren fast fiederig. Die Flügel mit erhabenen weißen Punkten oder Flecken geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Ephemien, Ephemiae.

Die Schwingen buchtig und zähnig, mit weißen Punkten besezt, wie auch die Stützen.

2464. Ephemias Libatrix Linn. Syst. Phal. 78. Hübn. Noc. 436.

2. Verein, Coitus 2.

Anomen, Anomes.

Die Schwingen eckig mit undeutlichem Mittezeichen und verworfenen Wellenstriemen bezeichnet.

2465. Anomis Exacta.

2466. A. Erosa. Hübn. Zutr. 287. 288.

3. Verein, Coitus 3.

Hypsorophen, Hypsorophae.

Die Schwingen mit einer Reihe weißer glänzender Fleckgen geziert.

2467. Hypsoropha Monilis Fabr. Ent. Noc. 124. Hübn. Zutr. 23. 24.

2468. H. Horma. Hübn. Zutr. 27. 28.

4. Verein, Coitus 4.

Axien, Axiae.

Die Schwingen mit perlähnlichen Flecken angelegt.

2469. Axia Margarita. Hübn. Noc. 514.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Spannerartige, Semigeometrae.

Ihre Streichler sind aufgebogen und ansehnlich spitzig beschnauzt. Ihre Flügel beyderley, ansehnlich breit, sehr mannigfaltig bezeichnet und gefärbt.

1. Stamm, Stirps I.

Plusien, Plusiae.

Ihr Rücke ist mit einem breiten und hohen Schopf geziert und die Schwingen erz- oder metallfärbig bezeichnet oder gefleckt.

Erste Familie, Familia A.

Beschriebene, Inscriptae.

Die Schwingen neben den Mittefleckgen mit Schriftzeichen bemerkt, fleckweiße erzglanzfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Westermannien, Westermanniae.

Die Schwingen oben matt und glatt fleckig angelegt, in blasser Färbung.

2470. Westermannia Superba. Hübn. Zutr. 323. 324.

2. Verein, Coitus 2.

Euchalcien, Euchalciae.

Die Schwingen mit blassen Zeichen bemerkt, erzbunt gefärbt.

2471. Euchalcia Illustris. Fabr. Mant. Noc. 195. Hübn. Noc. 274.

2472. E. Modesta. Hübn. Noc. 354.

2473. E. Consona. Fabr. Ent. Noc. 194. Hübn. Noc. 273.

3. Verein, Coitus 3.

Agraphen, Agraphae,

Die Schwingen ohne sichtbare Schriftzeichen, kaum metallisch glänzend wellenstreifig angelegt.

2474. Agrapha Aerea. Hübn. Noc. 271.

2475. A. Ahenea. Glauca Cram. 311. G.

4. Verein, Coitus 4.

Syngraphen, Syngraphae.

Die Schwingen mit metallglänzendweisen Schriftzeichen bemerkt, die Senken gelb gefärbt.

2476. Syngrapha Ain. Hübn. Noc. 290.

2477. S. Divergens Fabr. Mant. Noc. 184. Hübn. Noc. 499. & 286.

2478. S. Devergens. Hübn. Noc. 500. 501.

5. Verein, Coitus 5.

Authographen, Autographae.

Die Schwingen mit goldenen oder silbernen Schriftzeichen geziert und metallisch glänzend gefärbt.

2479. Autographa Parilis Hübn. Noc. 422.

2480. A. Circumflexa. Linn. Syst. Phal. 128. Hübn. Noc. 285.

2481. A. Jota Linn. Syst. Phal. 130. Hübn. Noc. 282.

2482. A. Questionis. Fabr. Ent. Noc. 235. Oo. Cram. 311. E?

2483. A. Omicron. Oo. Cram. 311. F.

2484. A. Gamma. Linn. Syst. Phal. 127. Hübn. Noc. 283.

2485. A. Ni. Hübn. Noc. 284.

2486. A. Norma. Jota Cram. 165. C.

2487. A. Interogationis Linn. Syst. Phal. 129. Hübn. Noc. 281.

2488. A. Mya. V argenteum Esp. Noc. 109. 3. Hübn. Noc. 275.

2489. A. Concha Fabr. Mant. Noc. 174. C aureum Knoch. Beytr. I. Ph. 2. Hübn. Noc. 458. & 287.

2490. A. Polydamia Gram. 400. D.

2491. A. Croesa. Cresus Cram. 142. C.

6. Verein, Coitus 6.

Polychrysien, Polychrysiae.

Die Schwingen mit einem ansehnlichen silbernen Mittezeichen bemerkt, fast ganz gölden oder silbern scheinend, braunschattig angelegt.

2492. Polychrysia Moneta. Fabr. Mant. Noc. 182. Argyritis Esp. Noc. 33. 1. Hübn. Noc. 289.

Zweyte Familie, Familia B.

Goldfleckige, Innaratae.

Die Schwingen im Mitteraume ganz golden, oder doch silbern gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Panchrysien, Panchrysiae.

Die Schwingen unrichtig braun bezeichnet, ganz gölden und braunschattig angelegt.

2493. Panchrysia Aurea. Deaurata Esp. Noc. 316. Hübn. Noc. 288.

2. Verein, Coitus 2.

Diachrysien, Diachrysiae.

Die Schwingen unrichtig braun bezeichnet, größerntheils gölden angelegt.

2494. Diachrysia Aurifera. Hübn. Noc. 463.

2495. D. Orichalcea Fabr. Mant. Noc. 175. Chryson Esp. Noc. 62. 2. Hübn. Noc. 278.

2496. D. Chrysitis. Linn. Syst. Phal. 126. Hübn. Noc. 272. & 662. 663.

2497. D. Zosima. Hübn. Noc. 651.

3. Verein, Coitus 3.

Chrysaspidien, Chrysaspidiae.

Die Schwingen mit glänzend platinfärbigen Flecken im Mitteraum geziert.

2498. Chrysaspidia Bractea. Schiff. Verz. Noc. Z. 7. Hübn. Noc. 279.

2499. C. Aemula. Schiff. Verz. Noc. Z. 8. Hübn. Noc. 280.

2500. C. Festucae Linn. Syst. Phal. 131. Hübn. Noc. 277.

4. Verein, Coitus 4.

Chrysodeixen, Chrysodeixes.

Die Schwingen im Mitteraume gleichsam mit göldenen oder silbernen Tropfen besetzt.

2501. Chrysodeixis Chalcitis Esp. Noc. 62. 3. Hübn. Noc. 276.

2502. C. Aurigutta. Protea Cram. 400. M.

5. Verein, Coitus 5.

Argyrosticten, Argyrostictae.

Die Schwingen mit göldenen oder silbernen Sprengeln bezeichnet.

2503. Argyrosticta Amoenita. Cram. 312. D.
2504. A. Venatrix. Cram. 400. K.

2. Stamm, Stirps II.

Erotylen, Erotylae.

Sie haben nur ein geringes Maaß, aber ziemlich breite stumpfe Flügel von sehr unterschiedener Anlage.

Erste Familie, Familia A.

Auserlesene, Selectae.

Die Schwingen unterschieden metallisch und hell streifig angelegt, bunt gefärbt; die Senken gänzlich grau.

1. Verein, Coitus 1.

Eustrotien, Eustrotiae.

Die Schwingen wie eingelegt bezeichnet und glänzend gefärbt.

2505. Eustrotia Unca. Schiff. Verz. Noc. Y. 4. Linn. Syst. Phal. 284. Hübn. Noc. 293.

2. Verein, Coitus 2.

Argyrostroten, Argyrostrotes.

Die Schwingen mit silberweißen Streifen bezeichnet, trübfärbig angelegt.

2506. Argyrostrotis Anilis. Drur. II. 12. 3.
2507. A. Amussis. Cram. 355. F.
2508. A. Olivea. Olivana. Schiff. Verz. Tort. B. 1. Hübn. Noc. 292.

3. Verein, Coitus 3.

Emmelien, Emmeliae.

Die Schwingen schwarz und bleigrau gestreift, hell gefärbt.

2509. Emmelia Sulphurea. Schiff. Verz. Noc. Z. 6. Hübn. Noc. 291. Lugubris Fabr. Bom. 165.

Zweite Familie, Familia B.

Vermengte, Promiscuae.

Die Schwingen mit fast gewöhnlichen Mittefleckgen und Wellenlinien bezeichnet, bandweise blaß und satt wechslend angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Antarchäen, Antarchaeae.

Die Senken mit einem deutlichen Mittefleckgen auf dem dunklen Bande bezeichnet.

2510. Antarchaea Numisma. Hübn. Noc. 270.

2. Verein, Coitus 2.

Hapaloten, Hapalotes.

Die Schwingen mit kleinem Mittezeichen, und breiten Bändern weiß und grau wechslend angelegt.

2511. Hapalotis Furvula. Hübn. Noc. 390.

2512. H. Lupula. Hübn. Noc. 573.

2513. H. Ravula. Hübn. Noc. 461.

2514. H. Fuscula Schiff. Verz. Noc. U. 6. Polygramma Esp. Noc. 67. 7? Hübn. Noc. 297.

2515. H. Atratula Schiff. Verz. Noc. U. 7. Hübn. Noc. 296.

2516. H. Candidula Schiff. Verz. Noc. U. 8. Hübn. Noc. 295.

2517. H. Venustula. Hübn. Noc. 294. Hybnerana Fabr. Ent. Pyr. 17.

3. Stamm, Stirps III.

Anthophilen, Anthophilae.

Ihre Streichler sind dünnschnauzig. Die Flügel ansehnlich, eigenartig sanftfärbig angelegt und glatt befränzt.

Erste Familie, Familia A.

Sonderliche, Propriae.

Die Flügel äugig bezeichnet und voller Wellenlinien.

1. Verein, Coitus 1.

Glenopteriden, Glenopterides.

Die Schwingen im Mitteraum mit einem zierlichen Augzeichen bemerkt.

2518. Glenopteris Oculifera. Oculata Cram. 324. F.

2. Verein, Coitus 2.

Dialithen, Dialithes.

Die Senken am Rande mit schwarzen, weiß gekernten Zeichen besetzt.

2519. Dialithis Gemmifera. Hübn. Zutr. 377. 378.

3. Verein, Coitus 3.

Phrictien, Phrictiae.

Die Flügel beyderley wellenstreifig, wie der Leib, düstern gefärbt und die Schwingen mit einem ovalen Mitte-Ring bezeichnet.

2520. Phrictia Lingia Cram. 399. K.

2521. P. Porcia Stoll. 36. 9.

Zweyte Familie, Familia B.

Schmeichlende, Blandae.

Beyderley Flügel bandweiße schattig gewellt; die Schwingen satt, die Senken blaß gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Acolasien, Acolasiae.

Die Schwingen hellgrau, düstern gewellt; die Senken dunkelgrau; blaß gewellt.

2522. Acolasis Tanais. Cram. 68. D.
2523. A. Phasis. Cram. 165. B.
2524. A. Funebris Hübn. Noc. 433.

2. Verein, Coitus 2.

Eublemmen, Eublemmae.

Die Schwingen bunt, die Senken schlecht gefärbt.

2525. Eublemma Suava Hübn. Noc. 578.
2526. E. Amoena Hübn. Noc. 300.

3. Verein, Coitus 3.

Porphyrinien, Phorphyriniae.

Die Schwingen purpurn und rosenroth angelegt, vom Rumpf aus, wie der Rumpf selbst olivengelb gefärbt.

2527. Porphyrinia Purpurina. Schiff. Verz. Noc. T. 9. Hübn. Noc. 298.
2528. P. Rosina. Hübn. Noc. 299.

4. Verein, Coitus 4.

Eromenen, Eromenae.

Die Schwingen röthlich und purpurn angelegt, trüb gemischt.

2529. Eromene Ostrina. Hübn. Noc. 648. 399.
2530. E. Parva. Hübn. Noc. 356.

5. Verein, Coitus 5.

Trothisen, Trothisae.

Die Schwingen weiß, röthlich braun und graulich bandirt.

2531. Trothisa Paula Hübn. Noc. 451.

2532. T. Minuta. Hübn. Noc. 452.

6. Verein, Coitus 6.

Ectheten, Ecthetes.

Die Schwingen kreidefärbig, innerhalb weiß und ausserhalb gelb angelegt.

2533. Ecthetis Pura Hübn. Noc. 579.

Dritte Familie, Familia C.

Gelbgefärbte, Flavitinctae.

Der Kopf, der Rumpf und die Schwingflügel hellgelb; letztere mit einem dunklen Mittepunkt bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Acontien, Acontiae.

Die Schwingen mit einem gekernten Mittepunkt bezeichnet, aussen braunschattig.

2534. Acontia Malvae Hübn. Noc. 358.

2. Verein, Coitus 2.

Aeglen, Aeglae.

Die Schwingen mit einem dunklen Pünktgen und braunen Franzen besetzt.

2535. Aegle Flavida Ochs. Schm. 81. 4. Flava. Hübn. Noc. 453. & Kaeckeritziana. Tor. 163.

2536. A. Lutea.

2537. A. Pallida. Sulphurana Hübn. Tor. 162.

Vierte Familie, Familia D.

Gleichende, Simulatae.

Beyderley Flügel band- und fleckartig angelegt in schattig grauer Färbung.

1. Verein, Coitus 1.

Odicen, Odicae.

Heliothenten.

Die Flügel durch die Mitte hell bandirt und randwärts weißlich gefleckt.

2538. Odice Pamphilia. Cram. 368. G.
2539. O. Acharis. Acharia. Cram. 346. C.
2540. O. Inamoena Hübn. Noc. 302.
2541. O. Regularis. Hübn. Noc. 588.
2542. O. Quieta. Hübn. Noc. 486. & 492.

2. Verein, Coitus 2.

Apausten, Apaustes.

Die Flügel wellig bandirt, weiß scheckig befränzt.

2543. Apaustis Heliophila Hübn. Noc. 317. Palliata Fabr. Mant. Noc. 73. Pallium Borkh. Noc. 36. Rupicola Ochs. Schm. 77. 7.

4. Stamm, Stirps IV.

Heliothenten, Heliothentes.

Sie haben einen ziemlich langen Rüssel; einen sehr glatten Rücken. Ihre Schwingen sind ansehnlich gefleckt und ihre Senken breit gesäumt.

Erste Familie, Familia A.

Muthige, Alacres.

Die Flügel sonderbarer Form, einander gleichend angelegt und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Phycomen, Phycomae.

Die Schwingen schiefrändig, die Senken stumpfeckig, beyderley schattig angelegt.

2544. Phycoma Gyges Cram. 102. B.
2545. P. Marcellina. Cram. 312. F.
2546. P. Archadia Stoll. 12. 3.

2. Verein, Coitus 2.

Hemeroplanen, Hemeroplanis.

Beyderley Flügel gemeinschäftlich bezeichnet und gefärbt; aber ihre zweyerley Flächen sehr unähnlich angelegt.

2547. Hemeroplanis Pyraloides. Pyralis Hübn. Zutr. I, 127. 128.

Zweyte Familie, Familia B.

Bescheidene, Moderatae.

Die Flügel schwarz gewellt bezeichnet, weiß und grau scheckig gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Helien, Heliae.

Die Flügel auf beyden Flächen mit weißen Mittezeichen und schwarzen Wellenlinien bezeichnet.

2548. Helia Calligramma. Hübn. Zutr. I. 157. 158.

2549. H. Compotrix Hübn. Zutr. I. 177. 178.

2550. H. Bibitrix. Hübn. Zutr. II. 343. 344.

2. Verein, Coitus 2.

Anthocitten, Anthocittae.

Die Schwingen wellenstreifig, weiß bandirt; die Senken schwarz.

2551. Anthocitta Sulima. Stoll 40. 5. 5, c. Damonia Cram. 324. B. C.

2552. A. Capensis Cram. 167. C.

3. Verein, Coitus 3.

Eutelien, Euteliae.

Die Schwingen wellenstreifig, weiß und schwarz wechslend, die Senken schattig grau gesäumt.

2553. Eutelia Adulatrix. Hübn. Noc. 649. 650. 517.

4. Verein, Coitus 4.

Cönipeten, Coenipetae.

Die Schwingen weißlich, die Senken dunkelgrau; beyderley wellenstreifig beschattet.

2554. Coenipeta Colliquens Hübn. Zutr. 117. 118.
2555. C. Damonia. Cram. 324. D.E.
2556. C. Serapis. Cram. 396. F.
2557. C. Cupentia. Cram. 252. E.

Dritte Familie, Familia C.

Traurende, Tristes.

Die Schwingen grauschattig, die Senken weiß und schwarz bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Melipoten, Melipotes.

Die Schwingen zackenstriemig; die Senken aussen schwarz, am Rande weiß gefleckt.

2558. Melipotis Cyllaris. Cyllaria Cram. 251. C. D.
2559. M. Jucunda Hübn. Zutr. 81. 82.

2. Verein, Coitus 2.

Catephien, Catephiae.

Die Schwingen fast ganz schwarz, die Senken innen weiß und am Rande weiß gefleckt.

2560. Catephia Alchymista Schiff. Verz. Noc. W. 5. Hübn. Noc. 303.

3. Verein, Coitus 3.

Aedien, Aediae.

Die Schwingen endwärts mit einem ansehnlichen hellen Fleck bezeichnet.

2561. Aedia Leucomelas. Linn. Syst. Phal. 183. Hübn. Noc. 304.

2562. A. Luctuosa Schiff. Verz. Noc. W. 7. Italica Fabr. Spec. Noc. 49. Funesta Esp. Noc. 9. 6. Hübn. Noc. 305. 306.

4. Verein, Coitus 4.

Tarachen, Tarachae.

Der Rumpf weißlich grau, die Schwingen theils weiß theils dunkel angelegt und mit einem deutlichen Mittefleckgen bezeichnet.

2563. Tarache Caloris. Caffraria Cram. 147. F. Hübn. Noc. 373.

2564. T. Solaris Schiff. Verz. Noc. W. 8. Albicollis Fabr. Spec. Noc. 48. Rupicola Borkh. Noc. 31.

2565. T. Insolatrix.

2566. T. Aprica Hübn. Noc. 371.

2567. T. Opalina. Esp. Noc. 103. 3. Hübn. Noc. 376.

5. Verein, Coitus 5.

Metrien, Metriae.

Die Schwingen in ihrer Mitte weiß, auffen schattiger als innen.

2568. Metria Euristea Cram. 324. A.

2569. M. Encelade Cram. 181. F.

Vierte Familie, Familia D.

Schnelle, Celetes.

Die Schwingen auf der untern Fläche mit schwarzen Mitteflecken bezeichnet; die Senken auf der obern schwarz gesäumt.

1. Verein, Coitus 1.

Sympisten, Sympistes.

Die Schwingen gewöhnlich bezeichnet, und schwärzlichgrau gefärbt.

2570. Sympistis Melaleuca Thunb. II. 12. Leucoptera

Esp. Noc. 110. 4. Heliophila Fabr. Ent. Bom. 189. Moesta Hübn. Noc. 357.

2571. S. Vidua Hübn. Hoc. 403.

2572. S. Tristis. Hübn. Noc. 446.

2573. S. Rupestris Hübn. Noc. 644. 645. Pyr. 138.

2574. S. Alpestris. Alpestralis Fabr. Mant. Phal. 274. Hübn. Pyr. 135.

2. Verein, Coitus 2.

Melicleptrien, Melicleptriae.

Die Schwingen schattig gefleckt und bandirt, olivenfärbig; die Senken blaßfärbig schwarz gesäumt.

2575. Melicleptria Scutosa Schiff. Verz. Noc. W. 1. Hübn. Noc. 309.

2576. M. Peltigera Schiff. Verz. Noc. W. 2. Charmione Stoll. 36. 1o. Hübn. Noc. 310.

2577. M. Alphea Cram. 250. F.

2578. M. Dipsacea Linn. Syst. Phal. 185. Hübn. Noc. 311.

2579. M. Ononis Schiff. Verz. Nzc. W. 4. Hübn. Noc. 312.

2580. M. Cardui Hübn. Noc. 313.

3. Verein, Coitus 3.

Panemerien, Panemeriae.

Die Schwingen olivenbraun, dunkel gewellt; die Senken durch die Mitte gelb bandirt.

2581. Panemeria Heliaca Schiff. Verz. Noc. A a. 7. Arbuti Fabr. Syst. Noc. 122. Hübn. Noc. 316.

4. Verein, Coitus 4.

Chimaeren, Chimaerae.

Die Schwingen schmal, die Senken breit; die Geschlechte sehr unterschieden geformt angelegt und gefärbt.

2582. Chimaera Linea Borkh. Noc. 26. Vahliana Fabr.

Mant. Pyr. 9. & Saldonana Pyr. 71. Hübn. Noc. 314. 315.

2583. C. Pumila Ochs. 17. 1. Hübn. Noc. 678. 679. 405.

5. Stamm, Stirps V.

Meropiden, Meropides.

Die Schnauzen der Streichler dünn und lang. Die Schwingen am Haarrande sehr uneben geformt; die Senken gemeinförmig, glatträndig.

Erste Familie, Familia A.

Zierlose, Incomptae.

Die Schwingen schattig gestreift, braun gefärbt; die Senken schlecht gesäumt, gelb gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Athysanien, Athysaniae.

Die Schwingen fleckig, die Senken schattig, trüb angelegt.

2584. Athysania Chorinea Cram. 310. F.

2. Verein, Coitus 2.

Gonodonten, Gonodontae.

Die Schwingen am Eck gleichsam mit einem spitzigen Zahn besetzt.

2585. Gonodonta Thalictri Borkh. Bom. 159. Capucina Esp. Bom. 81. 1. 2. Hübn. Bom. 25.

2586. G. Lincus Cram. 50. H.

2587. G. Uncina. Hübn. Zutr. 35. 36.

2588. G. Sicheas Cram. 150. E.

2589. G. Nutrix Cram. 312. B.

3. Verein, Coitus 3.

Trissophaen, Trissophaae.

Die Schwingen braun, zierlich dunkel angelegt; die Senken orangegelb, schwarzsäumig.

2590. Trissophaes Felicia Stoll. 12. 11.

2591. T. Collusaria Cram. 172. F.

Zweyte Familie, Familia B.

Gezierte, Festivae.

Die Schwingen bunt gewölkt; die Senken sehr breit schwarz gesäumt.

1. Verein, Coitus 1.

Mänaden, Maenades.

Die Schwingen glatträndig, gelblichgrün, bunt gestreift; die Senken mit einem schwarzen Fleck nebst dem Saume bemerkt.

2592. Maenas Salaminea. Cram. 174. A.

2. Verein, Coitus 2.

Rhytien, Rhytiae.

Die Schwingen fast eckig und zähnig, grün gefärbt; die Senken ganz schwarz gesäumt.

2593. Rhytia Cocale. Cocalus Cram. 134. B.

2594. R. Materna Linn. Syst. Phal. 116. Cram. 174. B. & 267. E.

2595. R. Hypermnestra Cram. 323. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Othreiden, Othreides.

Die Schwingen zahnrändig, schattig gefärbt; die Senken schwarz gefleckt und gesäumt.

2596. Othreis Pomona. Cram. 77. C.

2597. O. Homaena. Ancilla Cram. 149. F.

4. Verein, Coitus 4.

Acacalliden, Acacallides.

Die Schwingen buntgewölkt; die Senken würflig angelegt.

2598. Acacallis Procax Cram. 149. G.

5. Verein, Coitus 5.

Corycien, Coryciae.

Die Schwingen trübfärbig schattig angelegt; die Senken sattgelb, schwarz gefleckt und gesäumt.

2599. Corycia Cajeta Cram. 30. A. B.

2600. C. Dioscoreae. Fabr. Syst. Noc. 10. Cajeta Cram. 30. C.

Dritte Familie, Familia C.

Vortreffliche, Elevatae.

Die Schwingen mit einem sonderbaren Mittefleck bezeichnet, wolkig trüb gefärbt; die Senken bandweise buntfärbig gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Ischyjen, Ischyjae.

Die Schwingen geschnäbelt, mit einem schattigen Spitzstreif bezeichnet.

2601. Ischyja Conspicillatrix. Conspicillator Cram. 97. A. B.

2602. I. Manlia. Cram. 92. A.

2. Verein, Coitus 2.

Coroniden, Coronides.

Die Schwingen gerundet, schattig angelegt, an der Spitze.

2603. Coronis Stollii. Stoliana Cram. 310. A. B.

Vierte Familie, Familia D.

Abweichende, Abstrahentes.

Die Schwingen am Ende sehr spitzig, am Haar-

rande sehr buchtig; die Senken schlechtweg geformt. Der Wanst lang.

1. Verein, Coitus 1.

Antaeen, Antaeae.

Die Schwingen mit fast ovalen Mittesflecken und geraden Streifen bemerkt.

2604. Antaea Licorma. Licormas Cram. 74. E.

2605. A. Juturna. Cram. 129. E.

6. Stamm, Stirps VI.

Ascalaphen, Ascalaphae.

Ihre Streichler haben dünne, lange fast stumpfe und aufgerichte Schnauzen. Ihre Flügel sind ansehnlich breit und von zerschiedenen Anlagen.

Erste Familie, Familia A.

Gewöhnliche, Frequentes.

Die Schwingen sattgrau, mit unvollständigen Mittezeichen bemerkt; die Senken blaßgrau, schattig gesäumt.

1. Verein, Coitus 1.

Astickten, Astictae.

Die Schwingen zeichenlos, dunkelschüppig gemengt.

2606. Asticta Proclivis. Procax Hübn. Noc. 510.

2. Verein, Coitus 2.

Ophiussen, Ophiussae.

Der Krage schwarz; die Schwingen mit zusammengesetzten Mittezeichen bemerkt und schattig gestreift.

2607. Ophiussa Lusoria Linn. Syst. Phal. 74. Hübn. Noc. 318.

2608. O. Craccae Schiff. Verz. Noc. A a. 3. Hübn. Noc. 669. 670. 320.

2609. O. Viciae Ochs. Nachtr. p. 93. Hübn. 671 — 673.

2610. O. Ludicra. Hübn. Noc. 319.

3. Verein, Coitus 3.

Clytien, Clytiae.

Die Schwingen mit undeutlichen Mittezeichen und Linien bemerkt, blaß gefärbt.

2611. Clytie Illunaris Hübn. Noc. 574. 565.

2612. C. Concors Hübn. Zutr. 315. 316.

4. Verein, Coitus 4.

Athyrmen, Athyrmae.

Die Schwingen mit unterschiedlichen schwarzen Flecken bezeichnet.

2613. Athyrma Adjutrix Cram. 272. E.

2614. A. Ganglio.

2615. A. Interpuncta.

5. Verein, Coitus 5.

Mocen, Moces.

Die Schwingen mit blassem Mittefleck und Linien, desgleichen mit einem schwarzen Punkt bezeichnet.

2616. Mocis Virbia. Cram 273. H.

2617. M. Cicatrix.

2618. M. Mercuria.

2619. M. Levina Stoll. 36. 2. Cram. 346. D.

6. Verein, Coitus 6.

Phoberien, Phoberiae.

Die Schwingen mit dunklem nierenförmigen Mittefleck, blassen Linien und schwarzer Punktreihe bezeichnet.

2620. Phoberia Punctularis Hübn. Noc. 364.

2621. P. Lunaris Schiff. Verz. Noc. Aa. 1. Hübn. Noc. 322.

2622. P. Tirrhaea Fabr. Mant. Noc. 23. Auricularis Hübn. Noc. 321.
2623. P. Atomaris Hübn. Zutr. 75. 76.
2624. P. Rufimargo Hübn. Zutr. 45. 46.

7. Verein, Coitus 7.

Platyjen, Platyjae.

Die Schwingen geschnäbelt mit hellen sonderbaren Flecken bezeichnet und sammt den Senken düster gefärbt.

2625. Platyja Umminea Cram. 267. F.
2626. P. Ancea Cram. 324. G.
2627. P. Sergilia Cram. 321. F.
2628. P. Pritanis Cram. 115. D.
2629. P. Chorebe. Chorebus Cram. 113. D.

8. Verein, Coitus 8.

Perasien, Perasiae.

Die Flügel mit gebogenen schattigen Linien bezeichnet, fast ohne Spur von Mittefleckgen.

2630. Perasia Ule.
2631. P. Strigillaris.
2632. P. Ora. Cram. 88. B.

9. Verein, Coitus 9.

Chalciopen, Chalciopae.

Die Schwingen mit braunen dreyeckigen Flecken, die von weißlichen Binden geformt sind, angelegt.

2633. Chalciope Cephise Cram. 227. C.
2634. C. Hypasia Stoll. 36. 4. Cram. 250. E.
2635. C. Dindyma Dyndyma. Cram. 311. C.
2636. C. Mygdonias. Mygdon Cram. 156. G.

10. Verein, Coitus 10.

Parallelien, Paralleliae.

Die Schwingen mit zwey hellen Streifen gleichweis ingelegt.

2637. Parallelia Bistriaris Hübn. Zutr. 63. 64.

2638. P. Parallelaris Hübn. Noc. 324.

2639. P. Ammonia Cram. 250. D. Cingularis Hübn. Noc. 352.

11. Verein, Coitus 11.

Dysgonien, Dysgoniae.

Die Schwingen mit unregelmäßigen Bändern und Flecken achatähnlich angelegt.

2640. Dysgonia Jovis. Joviana Cram. 399. B. & Achatina 288. A.

2641. D. Algira Linn. Syst. Phal. 98. Achatina Cram. 273. E. Stuposa Fabr. Ent. Noc. 112. Triangularis Hübn. Noc. 323.

2642. D. Macaris. Macaria Cram. 129. D.

12. Verein, Coitus 12.

Achäen, Achaeae.

Die Schwingen mit gewellten Bogenlinien, die Senken mit weißen Flecken bemerkt.

2643. Achaea Melicerta Cram. 323. C. & 62. C. D. Mercatoria Fabr. Ent. Noc. 175.

2644. A. Ino. Melicerta Cram. 323. D. E.

2645. A. Mezentia. Cram. 323. F.

2646. A. Ezea. Cram. 239. D.

13. Verein, Coitus 13.

Bendiden, Bendides.

Die Flügel fast eckig; die Schwingen mit einer geraden Linie bezeichnet.

2647. Bendis Irregularis. Hübn. Noc. 361.

2648. B. Orodes Cram. 129. F.

2649. B. Inara Cram. 239. E.

2650. B. Caranea Cram. 269. E. F.

Zweyte Familie, Familia B.

Gleichangelegte, Concolaratae.

Alle vier Flügel in der Hauptanlage gleichend bezeichnet und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Hemeroblemmen, Hemeroblemmae.

Die Schwingen oben an ihrem Ende mit einem blassen Fleck besetzt; die Senken unten wie die Schwingen mit schwarzen Wellenlinien bezeichnet und blaß gefärbt.

2651. Hemeroblemma Dolon. Cram. 101. D. E.
2652. H. Dolosa. Dolon Cram. 101. F.
2653. H. Amethystea. Hübn. Zutr. 147. 148.
2654. H. Areopagita. Areos Cram. 130. D.
2655. H. Lienaris Hübn. Zutr. 277. 278.

2. Verein, Coitus 2.

Thermesien, Thermesiae.

Alle Flügel oben mit lauter Wellenlinien und unten inzwischen mit einer geraden Linie bezeichnet.

2656 Thermesia Gotenaari. Gotenaaria Cram. 252. B.
2657. T. Scolopacea. Cram. 174. D.
2658. T. Acronias. Acron Cram. 227. B.
2659. T. Abadirina Hübn. Zutr. 237. 238.
2660. T. Daris. Dares Cram. 310. G.

3. Verein, Coitus 3.

Gorgonien, Gorgoniae.

Die Flügel mit einen fast gemeinschäftlichen dunklen Streif bezeichnet und wellenschattig.

2661. Gorgonia Ortilia Cram. 344. F.
2662. G. Orphna Hübn. Ascal. freq. Orphna.
2663. G. Venusta Cram. 370. A.

4. Verein, Coitus 4.

Apisten, Apistes.

Die Flügel nebst dem gemeinschaftlichen dunklen Streif, auch mit einer Reihe Pünktgen besetzt.

2664. Apistis Fellearis. Hübn. Zutr. 379. 389.
2665. A. Wedelina. Cram. 397. M.
2666. A. Eulalia Stoll. 12. 2.
2667. A. Jocosa. Sordida Fabr. Ent. Noc. 137.
2668. A. Gemmifera.
2669. A. Thomyris Cram. 262. F.
2670. A. Macarea Cram. 107. F.

5. Verein, Coitus 5.

Chaminen, Chaminae.

Die Flügel auf beyden Flächen mit schwärzlich dunkeln Wellenlinien und auf der untern mit blassen Punkten bezeichnet.

2671. Chamina Homichlodes. Hübn. Ascal. concol. Homichlodes.
2672. C. Ceramina. Hübn. Ascal. concol. Ceramina.

6. Verein, Coitus 6.

Itonien, Itoniae.

Die Flügel oben außerhalb mit vielen Streifgen, unten sparsamer bezeichnet.

2673. Itonia Lignaris Hübn. Zutr. 317. 318.

Dritte Familie, Familia C.

Gezierte, Ornatae.

Die Schwingen ganz vollkommen und mit einem augähnlichen Fleck geziert; die Senken fast verschmälert.

1. Verein, Coitus 1.

Nyctipaonen, Nyctipaones.

Das Aug der Schwingen groß aber trübfärbig, und

beyderley Flügel wellig weiß gestreift und schwarz gefleckt.

2674. Nyctipao Crepuscularis Linn. Syst. Phal. 13. Cram. 160. A.

2675. N. Ephesperis. Crepuscularis Cram. 159. A.

2676. N. Latona Cram. 13. B. Troglodyta Fabr. Ent. Noc. 18.

2. Verein, Coitus 2.

Argiven, Argivae.

Die Augflecke der Schwingen bunt; beyderley Flügel mit schwarzen Wellenstrichen und hellen Flecken bezeichnet.

2677. Argiva Hieroglyphica Drur. II. 2. 1. Mygdonia Cram. 174. F.

2678. A. Hermonia Cram. 174. E. Ulula Fabr. Ent. Noc. 11.

2679. A. Macrops Linn. Syst. Tom. III. pag. 225. Bubo Fabr. Syst. Noc. 3. Cram. 171. A. B.

2680. A. Fluctuosa. Cram. 174. C.

3. Verein, Coitus 3.

Speiredonien, Speiredoniae.

Der Augfleck der Schwingen schnirkelweis gezeichnet; beyderley Flügel schwarz gewässert.

2681. Speiredonia Euspira. Retorta Cram. 274. A.

2682. S. Retorta Cram. 116. D. Spiralis Fabr. Ent. Noc. 16?

2683. S. Zamis Stoll. 36. 11.

2684. S. Obscura. Cram. 174. B.

2685. S. Feducia Stoll. 36. 3.

2686. S. Luminosa Cram. 274. D.

Vierte Familie, Familia D.

Gewellte, Undosae.

Die Flügel alle ziemlich groß, und fast zackig geränder, wellenstreifig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Otosematen, Otosemata.

Die Schwingen mit einem fast ohrförmigen Mittefleck bezeichnet, und auch die Senken, wie diese zierlich gestreift.

2687. Otosema Odora Linn. Syst. Phal. 11. Cram. 169. A. B.

2688. O. Agarista Cram. 170. A. B. Hübn. Asc. orn. Odora.

2. Verein, Coitus 2.

Syrnien, Syrniae.

Die Mittesflecke gemeinförmig, auf den Schwingen; beyderley Flügel sehr zackig gestreift.

2689. Syrnia Strix Linn. Syst. Phal. 82. Agrippina Cram. 87. A. 88. A. Hübn. Asc. und. Strix.

2690. S. Zenobia Cram. 115. A. B.

2691. S. Hypnois Hübn. Asc. und. Hypnois.

2692. S. Marmorides Cram. 16. E. F. & Corysandra 384. A. B.

2693. S. Occidua Cram. 173. A. B.

2694. S. Mycerina Cram. 172. B.

2695. S. Iphianassa Cram. 172. A.

3. Verein, Coitus 3.

Blosyren, Blosyres.

Die Flügel nur mit kleinen Mitteflecken, aber fast bogenweise schwarzwellig bezeichnet.

2696. Blosyris Hersilia Cram. 309. B. C. A.

2697. B. Opigena Drur. II. 22. 4. Hübn. Asc. und. Opigena.

2698. B. Pandrosa. Cram. 77. D.

2699. B. Helima. Cram. 309. D.

4. Verein, Coitus 4.

Leten, Letes.

Die Schwingen mit gewöhnlichen Mitteflecken bezeichnet und im Mitteraume, wie auch die Senken weiß.

2700. Letis Specularis. Hübn. Asc. und. Specularis.

5. Verein, Coitus 5.

Cyclopen, Cyclopes.

Die Schwingen gemeinförmig, mit runden, augähnlichen Mitteflecken bemerkt; die Senken eckig, splitterig weiß gefleckt.

2701. Cyclopis Caecutiens. Hübn. Asc. und. Caecutiens.

7. Stamm, Stirps VII.

Lemuren, Lemures.

Die Flügel groß, fast zähnig und mit schwarzen Wellenlinien und grauen Schattenstreifen angelegt.

Erste Familie, Familia A.

Anzündende, Accendentes.

Die Flügel ziemlich glatträndig, ausschweifend wellig bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Authophilen, Autophilae.

Die Flügel hellfärbig und schattig angelegt.

2702. Autophila Dilucida Hübn. Noc. 383. 558.

2703. A. Cataphanes. Hübn. Noc. 559.

2. Verein, Coitus 2.

Zalen, Zalae.

Die Schwingen sehr scharf und ziemlich düster angelegt.

2704. Zale Horrida. Hübn. Zutr. 31. 32.

3. Verein, Coitus 3.

Päocymen, Paeocymae.

Die Schwingen zart schief gewellt, und schattig angelegt.

2705. Phaeocyma Fluctuaris. Hübn. Noc. 449.

2706. Lunifera Hübn. Zutr. 97. 98.

2707. P. Calycanthi. Calycanthata Abb. Lep. 104.

Zweyte Familie, Familia B.

Ablöschende, Restinguentes.

Die Schwingen ziemlich zähnig, ihre Wellenstreifen gemäßigt.

1. Verein, Coitus 1.

Anthracien, Anthraciae.

Die Schwingen mit ziemlich geraden Wellenlinien, Schattenbändern und unscheinbaren Mittelflecken angelegt.

2708. Anthracia Ephialtes Hübn. Noc. 652.

2709. A. Undularis Drur. I. 9. 4.

2. Verein, Coitus 2.

Apopesten, Apopestae.

Die Schwingen sehr deutlich schwarz bezeichnet, hell gewölkt und gefärbt.

2710. Apopestes Spectrum Esp. Noc. 21. 3. 4. Hübn. Noc. 325.

3. Verein, Coitus 3.

Mormonen, Mormones.

Die Schwingen sehr düstern gezeichnet und gefärbt.

2711. Mormo Maura Linn. Syst. Phal. 125. Hübn. Noc. 326.

8. Stamm, Stirps VIII.

Blepharonien, Blepharoniae.

Die Flügel sehr zierlich zähnig befränzt; die Schwingen sehr zackig gezeichnet nnd düster gemischt, die Senken aber hellfärbig und schwarz bandirt.

Erste Familie, Familia A.

Blauliche, Caerulescentes.

Die Schwingen unten, die Senken oben blaulich und schwarz bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Mormonien, Mormoniae.

Die Senken oben nur weiß gesäumt, ganz schwarz gefärbt.

2712. Mormonia Epione Drur. Ill. I. 23. 2. Cram. 102. E. F.

2. Verein, Coitus 2.

Catocallen, Catocalae.

Die Senken blaulich bandirt, schwarz gefärbt.

2713. Catocalla Fraxini. Linn. Syst. Phal. 125. Hübn. Noc. 327.

Zweyte Familie, Familia B.

Rothe, Coccineae.

Der Leib und die obere Fläche der Schwingen auch düstern gemengt, die Senken aber roth gefärbt, schwarz bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Euneten, Eunetes.

Die Schwingen aschgrau, die Senken zinnoberroth.

2714. Eunetis Puerpera Ochs. 84. Amasia Esp. Noc. 115. 2. Pellex Hübn. Noc. 605. & 435.

2715. E. Amasia Esp. Noc. 115. 1. Pellex Hübn. Noc. 594.

2716. E. Nupta Linn. Syst. Phal. 119. Hübn. Noc. 330.

2717. E. Ilia Cram. 3. B. C.

2718. E. Marita Hübn. Noc. 494.

2719. E. Uxor. Elocata Esp. Noc. 20. 1. 2. Hübn. Noc. 328.

2720. E. Nurus. Hübn. Noc. 655. 656.

2721. E. Ultronia Hübn. Zutr. 347. 348.

2. Verein, Coitus 2.

Lamprosien, Lamprosiae.

Die Schwingen hellgrau, die Senken rosenroth; der Wanst röthlich.

2722. Lamprosia Amatrix. Hübn. Noc. 487. & Bleph. cocc. Amatrix.

2723. L. Electa Borkh. Noc. 8. Pacta Esp. Noc. 19. 1. 2. Hübn. Noc. 331.

2724. L. Pacta Linn. Syst. Phal. 120. Hübn. Noc. 332.

3. Verein, Coitus 3.

Astioten, Astiotae.

Die Schwingen rauchgrau, die Senken purroth.

2725. Astiotes Dilecta Borkh. Noc. 12. Hübn. Noc. 388.

2726. A. Sponsa Linn. Syst. Phal. 118. Hübn. Noc. 333.

2727. A. Conjuncta Esp. Noc. 20. 3. 4. Hübn. Noc. 335.

2728. A. Promissa Schiff. Verz. Noc. X. 6. Sponsa Esp. Noc. 20. 3. Hübn. Noc. 657. 658.

2729. A. Mneste. Conjuncta Esp. Noc. 21. 1. 2. Promissa Hübn. Noc. 334. & 569.

Dritte Familie, Familia C.

Gelbe, Flavae.

Die Schwingen auf der obern Fläche grau, die Senken gelb gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Ephesien, Ephesiae.

Die Schwingen ziemlich braun gemischt; die Senken ansehnlich schwarz bandirt.

2730. Ephesia Paranympha Linn. Syst. Phal. 122. Hübn. Noc. 601. 336.

2731. E. Antinympha. Paranympha Drur. I. 23. 6.

2732. E. Grynea Cram. 208. H.

2733. E. Pasythea Borkh. Noc. 15. Conversa Esp. Noc. 26. 3. Uxor Hübn. Beytr. II. 3. C. & Noc. 338. 455.

2734. E. Agamos. Conversa Esp. Noc. 26. 1. Hübn. Noc. 525.

2735. E. Nymphagoga Esp. Noc. 26. 5. Hübn. Noc. 337.

2736. E. Nymphaea Esp. Noc. 26. 4. Hübn. Noc. 339.

2. Verein, Coitus 2.

Parthenen, Partheni.

Die Schwingen gewässert, grau; die Senken sehr zierlich bandirt.

2737. Parthenos Nubilis. Hübn. Bleph. flav. Nubilis.

2738. P. Andremona Cram. 358. C, D.

3. Verein, Coitus 3.

Eucoren, Eucoraе.

Die Schwingen hellgrau, von oben; die Senken geschmälert bandirt.

2739. Eucora Neonympha Hübn. Noc. 450.

2740. E. Posthuma. Hübn. Noc. 526. 527.

2741. E. Hymenaea Schiff. Verz. Noc. X. 8.

4. Verein, Coitus 4.

Coriscen, Coriscae.

Die Schwingen hellgrau; die Senken gelb, schwarz gesäumt.

2742. Corisce Amica Hübn. Zutr. 57. 58.

9. Stamm, Stirps IX.

Brephien, Brephiae.

Der Rücke glatt behaart, die Schwingen ebenrändig wellenstreifig bezeichnet, braun gemischt; die Senken schwarz gesäumt, bunt gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Dubiae.

Die Schwingen bandweise gefleckt, die Senken fast einfach gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Eutacten, Eutactes.

Der Kopf, Rumpf und die Schwingen schwarz, vorzüglich blaßgelb bezeichnet; die Senken braun.

2743. Eutactis Tristifica Hübn. Zutr. 165. 166.

2. Verein, Coitus 2.

Paiden, Paides.

Die Schwingen röthlichbraun gefleckt; die Senken gänzlich röthlichbraun gefärbt.

2744. Païs Decora Linn. Syst. add. 14. Julia Cram. 7. E. F. & Decora 219. F. G. Hübn. Breph. dub. Julia.

Zweite Familie, Familia B.

Bestimmte, Vulgares.

Die Schwingen streifig gewölkt; die Senken ziemlich buntfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Archiearen, Archiëares.

Die Schwingen graulich braun und schmuzig weiß gemischt; die Senken röthlichgelb gefärbt und schwarz bezeichnet.

2745. Archiearis Parthenias Linn. Syst. Phal. 94. Hübn. Noc. 341. 342.

2746. A. Notha Hübn. Noc. 343. 344.

2747. A. Spuria. Puella Esp. Noc. 27. 2. 3. Hübn. Noc. 345.

2. Verein, Coitus 2.

Allotrien, Allotriae.

Die Schwingen ziemlich scheckig angelegt; die Senken gemeingelb, breit schwarz gesäumt.

2748. Allotria Elonympha Hübn. Zutr. 29. 30.

10. Stamm, Stirps X.

Euclidien, Euclidiae.

Ihr Rücke ist glatt; ihre Flügel sind glatträndig; die Schwingen ausgezeichneter angelegt, als die Senken.

Erste Familie, Familia A.

Gefleckte, Maculatae.

Die Schwingen unterschieden gefleckt, trübfärbig; die Senken schattig, gelblich gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Drasterien, Drasteriae.

Die Schwingen fleckig dunkel, die Senken schattig bläßlich angelegt.

2749. Drasteria Graphica Hübn. Zutr. 11. 12.

2750. D. Archesia. Cram 273. F. G.

2751. D. Cuspidea Hübn. Zutr. 69. 70.

2752. D. Glyphica Linn. Syst. Phal. 105. Hübn. Noc. 347.

3753. D. Erechtea Cram. 275. E.

2. Verein, Coitus 2.

Gonospileien, Gonospileiae.

Die Schwingen spitzfleckig angelegt; die Senken schattig gefärbt.

2754. Gonospileia Munita Hübn. Noc. 593.

2755. G. Triquetra Schiff. Verz. Noc. A. a. 6. Hübn. Noc. 348.

3. Verein, Coitus 3.

Callistegen, Callistegae.

Die Schwingen bandartig eckig gefleckt; die Senken schattig angelegt.

2756. Callistege Scapulosa Hübn. Noc. 360. 561.

2757. C. Mi. Linn. Syst. Phal. 106. Hübn. Noc. 346.

2758. C. Fortatilium Hübn. Noc. 592.

4. Verein, Coitus 4.

Calymmen, Calymmae.

Die Schwingen mit einem großen dunklen Fleck besetzt; die Senken schattig gesäumt.

2759. Calymma Communimacula Schiff. Verz. Noc. Q. 7. Hübn. Noc. 349.

2760. C. Orosia Cram. 275. D.

Zweyte Familie, Familia B.
Bandstreifige, Fasciatae.

Die Schwingen mit bandähnlichen Streifen angelegt, die Senken randschattig.

1. Verein, Coitus 1.

Schinien, Schiniae.

Die Schwingen grünlichgrau gestreift, die Senken bläßlichgrau gesäumt.

2761. Schinia Gracilenta. Hübn. Zutr. 5. 6.
2762. S. Bifascia Hübn. Zutr. 55. 56.
2763. S. Trifascia. Hübn. Zutr. 33. 34.

2. Verein, Coitus 2.

Synthymien, Synthymiae.

Die Schwingen braun schattig gestreift, die Senken gelb gefärbt.

2764. Synthymia Monogramma Hübn. Noc. 353.

Dritte Familie, Familia C.

Liniirte, Lineatae.

Die Flügel beyderley zusammentreffend gezeichnet und gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Prothymien, Prothymiae.

Alle Flügel erzgrün, roth gestreift.

2765. Prothymia Aenea Schiff. Verz. Noc. Q. 6. Hübn. Noc. 350.

Fünfte Horde, Phalanx quinta.

Spanner, Geometrae.

Geometrae Linn. Phalaenae Fabr.

Kennzeichen.

Der Rüssel mäßig groß aber weichlich; die Streichler ziemlich kurz, haarig beschnauzt; die Ohren zart. Der Rumpf glatt behaart; die Flügel ansehnlich breit, zärtlich; die Stützen ziemlich dünn aber langdornig, glatt behaart und der Wanst schlang.

Erste Rotte, Tribus prima.

Ansehnliche, Amplae.

Die Ohren bey Männern deutlich fiederig. Der Rumpf wohl behaart, die Flügel mit wenigen blaßseitigen Streifen bezeichnet.

1. Stamm, Stirps I.

Hyläen, Hylaeae.

Die Flügel rundlich, glatträndig, mit blaßbegrenzten weißlichen Streifen und grün gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Zweystreifige, Bistriatae.

Die Flügel mit weißen Nebenstreifen unterschiedlich bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Therinen, Therinae.

Beyderley Flügel durch die Mitte randschattig bandirt, gänzlich trübblaß gefärbt.

2766. Terina Fasciaria Linn. Syst. Phal. 216. Hübn. Geom. 4. 446. 5. & 447.

2767. T. Perfidaria.

2. Verein, Coitus 2.

Euchloriden, Euchlorides.

Die Flügel mit einem weißen Mittezeichen und weißen Streifen bemerkt, hellgrün gefärbt.

2768. Euchloris Smaragdaria. Fabr. Mant. Phal. 67. Hübn. Geo. 1.

3. Verein, Coitus 3.

Eucrosten, Eucrostes.

Die Flügel zierlich gesäumt, und färbig gefränzt.

2769. Eucrostes Ciliaria. Marginaria Stoll. 34. 8.

2770. E. Fimbriolaria. Hübn. Geo. 468.

4. Verein, Coitus 4.

Leptographen, Leptographae.

Alle Flügel mit zarten Zeichnungen zierlich bemerkt.

2771. Leptographa Scriptaria. Viridaria Stoll. 32. 5.
2772. L. Conviridaria. Viridana Cram. 355. G.

Zweyte Familie, Familia B.

Gezierte, Ornatae.

Die Flügel mit färbigen Flecken ausgezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Comibänen, Comibaenae.

Die Flügel zierlich braun gefleckt, grün gefärbt.

2773. Comibaena Rhanisaria Stoll. 34. 2. 2. B. Rhanis Cram. 119. B.
2774. C. Bajularia Schiff. Verz. Geo. B. 6. Hübn. Geo. 3.
2775. C. Gerularia. Ocellata Stoll. 34. 9.

2. Stamm, Stirps II.

Terpnen, Terpnae.

Die Flügel fast eckig, mit weißen Streifen gezeichnet; grün gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Schickliche, Habiles.

Beyderley Flügel fast gerundet, theils mit dunklen Wellenlinien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Pseudoterpnen, Pseudoterpnae.

Die Flügel mit zwey dunklen Wellenlinien und einem weißen Schlangenstrich bemerkt.

2776. Pseudoterpna Cytisaria Schiff. Verz. Geo. B. 2. Prasinaria Fabr. Syst. Phal. 33. Hübn. Geo. 2.

2777. P. Coronillaria. Hübn. Geo. 479 — 482.

2778. P. Ecchloraria Chlora. Cram. 393. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Zärtliche, Subtiles.

Alle Flügel ziemlich eckig und mit weißen Streifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Holothalassen, Holothalasses.

Die Flügel mit dreyerley weißen Linien bezeichnet.

2779. Holothalassis Papilionaria Linn. Syst. Phal. 225. Hübn. Geom. 6.

2. Verein, Coitus 2.

Thaleren, Thalerae.

Die Flügel bunt gefränzt, sattfärbig.

2780. Thalera Thymiaria Linn. Syst. Phal. 199. Aestivaria Hübn. Geo. 9.

2781. T. Bupleuraria Schiff. Verz. Geom. B. 4. Hübn. Geo. 8.

3. Verein, Coitus 3.

Nemorien, Nemoriae.

Ihre, die Flügel bezeichnende, weiße Linien ziemlich gerade angelegt.

2782. Nemoria Viridaria. Viridata Linn. Syst. Phal. 230. Hübn. Geo. 11.

2783. N. Herbaria Hübn. Geo. 407.

2784. N. Cloraria Hübn. Geo. 352.

2785. N. Bistriaria Hübn. Zutr. 139. 140.

4. Verein, Coitus 4.

Jodien, Jodes.

Die Flügel blaßgrün, deren Streife fast gewellt.

2786. Jodis Vernaria Linn. Syst. Phal. 195. Hübn. Geo. 7.

2787. J. Aeruginaria Schiff. Verz. Geo. B. 10. Hübn. Geo. 46.

2788. J. Putataria Linn. Syst. Pkal. 196. Hübn. Geo. 10.

5. Verein, Coitus 5.

Dyspteriden, Dyspterides.

Die Schwingen groß, die Senken klein; beyderley weißstreifig; grün gefärbt.

2789. Dyspteris Breviataria. Amata. Cram. 228. F.

2790. D. Deminutaria Hübn. Zutr. 171. 172.

3. Stamm, Stirps III.

Eusarcen, Eusarcae.

Der Rüssel und die Streichler sehr klein. Der Leib stark. Die Schwingen zimlich lang und die Senken merklich kurz.

Erste Familie, Familia A.

Fähige, Capaces.

Die Flügel beyderley zähnig gerändet und mit dunklen, weißlich begleiteten, Streifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Eudalimien, Eudalimiae.

Die Flügel gleichfärbig, zwischen den Streifen sätter gefärbt.

2791. Eudalimia Margaritaria Schiff. Verz. Geo. A. 1. Margaritata Linn. Syst. Phal. 231. Hübn. Geo. 13.

2792. E. Honoraria Schiff. Verz. Geo. F. 18. Hübn. Geo. 17. 16.

2793. E. Confusaria. Vibicaria Cram. 71. D? Hübn. Eusarc. cap. Confusaria.

Zweyte Familie, Familia B.

Benagte, Derosae.

Die Schwingen buchtig; die Senken fast glatträndig; erstere färbig, leztere bläßlich.

1. Verein, Coitus 1.

Colposien, Colposiae.

Die Schwingen ziemlich tiefbuchtig, mit zwey Mittepunkten und Winkelstreifen bezeichnet.

2794. Colposia Flexularia. Flexula Schiff. Verz. Bom. T. 3. Hübn. Geo. 19.

2. Verein, Coitus 2.

Eilicrinien, Eilicriniae.

Die Schwingen sehr ausgebuchtet, und mit einem ansehnlichen Mittezeichen besetzt.

2795. Eilicrinia Cordiarii Hübn. Geo. 342. 41.

2796. E. Nullaria Hübn. Geo. 18.

3. Verein, Coitus 3.

Gonodonten, Gonodontes.

Die Flügel zähnig geeckt, mit einem ringähnlichen Mittezeichen bemerkt.

2797. Gonodontis Dentaria. Bidendata Linn. Faun. Suec. 1255. Pectinaria Schiff. Verz. Geo. F. 6. Hübn. Geo. 12.

2798. G. Ancetaria. Anceta Cram. 360. C. D.

2799. G. Cleliaria. Clelia Cram. 288. B. C.

4. Verein, Coitus 4.

Therapiden, Therapides.

Die Schwingen buchtig; an allen Ränden brandig gefleckt.

2800. Therapis Evonymaria Schiff. Verz. Geo. F. 5. Hübn. Geom. 31. 426 — 428.

2801. T. Flavicaria Schiff. Verz. Geo. F. 12. Hübn. Geo. 40.

5. Verein, Coitus 5.

Colotoiden, Colotoides.

Die Schwingen fast gemeinförmig, mit einem Mittezeichen und kaum sättergefärbten Mittebande angelegt.

2802. Colotois Elinguaria Linn. Syst. Phal. 211. Hübn. Geom. 20.

2803. C. Pennaria Linn. Syst. Phal. 209. Hübn. Geom. 14.

2804. C. Extimaria Hübn. Geom. 21.

2805. C. Capreolaria Schiff. Verz. Geo. G. 2. Hübn. Geo. 204. 205.

6. Verein, Coitus 6.

Diastickten, Diastictes.

Die Schwingen zwischen den Strichen noch sonderlich bezeichnet.

2806. Diastictis Artesiaria Schiff. Verz. Geo. E. 2. Hübn. Geom. 15.

4. Stamm, Stirps IV.

Laren, Lares.

Sie haben eine täuschende Aehnlichkeit mit den Archonten. Aber ihre Ohren sind am Ende dünn und spitzig; ihre Flügel zart; die Senken schwänzig verlängert; und ihre Stützen theils bewehrt.

Erste Familie, Familia A.

Heroische, Heroicae.

Die Senken unterschiedlich beschwänzt, alle Flügel hellfärbig, zierlich gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Larunden, Larundae.

Die Senken kurz geschwänzt, mit einem glänzenden Fleck angelegt.

2807. Larunda Orithearia. Orithea Cram. 262. C. D.

2. Verein, Coitus 2.

Lyssen, Lyssae.

Die Senken ungleich geschwänzt und gezackt; beyderley Flügel gemeinschäftlich mit einem blassen Strich bezeichnet.

2808. Lyssa Achillaria. Patroclus Cram. 198. A.

2809. L. Patroclaria. Patroclus Linn. Syst. Pap. 24. Cram. 109. A. B.

3. Verein, Coitus 3.

Alciden, Alcides.

Die Senken nur einfach geschwänzt und ungleich gezackt; beyderley Flügel färbig bandirt.

2810. Alcidis Orontiaria. Orontes Linn. Syst. Pap. 27. Cram. 83. A. B.

4. Verein, Coitus 4.

Chrysiridien, Chrysiridiae.

Die Senken schmal geschwänzt und gezackt; alle Flügel schimmernd bandirt, und vorzüglich die Senken unten prächtig gefleckt.

2811. Chrysiridia Riphearia. Ripheus Cram. 385. A. B.

5. Verein, Coitus 5.

Uranien, Uraniae.

Die Senken nur mit einem langen Schwanz besezt, alle Flügel schimmernd gestreift.

2812. Urania Sloanaria. Sloanus Cram. 85. E. F.

2813. U. Leilaria. Leilus Linn. Syst. Pap. 31. Cram. 85. C. D.

6. Verein, Coitus 6.

Manien, Maniae.

Die Senken mit einem großlappigen Schwanze besetzt; alle Flügel wellenstreifig angelegt und am Schwanze äugig bezeichnet.

2814. Mania Empedoclaria. Empedocles Cram. 199. A. B. Hübn. Lar. her. Empedoclaria.

2815. M. Caudilunaria. Lunus Linn. Syst. Phal. 6. Cram. 200. A.

2816. M. Lunigeraria. Lunus Cram. 200. B. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Zärtliche, Indulgentes.

Die Senken kurz geschwänzt; beyderley Flügel nur mit dunklen Linien, die hintern aber am Schwanze besonders bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Strophidien, Strophidiae.

Die Flügel mit vielen geraden, blassen, dunkelrändigen Streifen bezeichnet, weiß grundig.

2817. Strophidia Caudaria. Caudata Fabr. Ent. Phal. 124. Fasciata Cram. 104. D.

2. Verein, Coitus 2.

Therinien, Theriniae.

Die Flügel nur mit anderthalb dunklen Strichen bezeichnet; blaßfärbig im Grunde.

2818. Therinia Lactucinaria. Lactucina Cram. 273. C. Sambucaria Clerc. Icon. 50. 3. 4?

2819. T. Strigaria Fabr. Mant. Phal. 15. Geminia Cram. 133. C.

2820. T. Sambucaria Linn. Syst. Phal. 203. Hübn. Geom. 28.

3. Verein, Coitus 3.

Eulepidoten, Eulepidotes.

Die Senken kaum merklich geschwänzt, aber deutlich geeckt; alle Flügel mit Linien bezeichnet.

2821. Eulepidotis Illyriaria. Ilyraria Fabr. Spec. Phal. 22. Illyrias. Cram. 10. E.

2822. E. Politaria. Politata Fabr. Spec. Phal. 63. Politia Cram. 139. E.

2823. E. Alabastraria Hübn. Zutr. 311. 312.

4. Verein, Coitus 4.

Nedusien, Nedusiae.

Die Senken sehr seltsam stumpf geschwänzt, wie abgestuzt.

2824. Nedusia Mutilaria Hübn. Zutr. 181. 182.

2825. N. Effractaria. Angulosa Cram. 360. E.

5. Stamm, Stirps V.

Eutrapelen, Eutrapelae.

Diese Spanner sind ansehnlich; ihre Flügel eckig und zähnig, unten fast wie oben angelegt und lebhaft gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Doppelstreifige, Bilineatae.

Die Flügel oben mit dunklen Linien bezeichnet; beyderley unten schattig bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Eugonien, Eugoniae.

Die Schwingen nur mit zwey braunen Linien bezeichnet; alle Flügel rostig gelb gefärbt.

2826. Eugonia Alniaria Linn. Syst. Phal. 205. Hübn. Geo. 26.

2827. E. Clemataria. Abb. Lepidopt. 101.

2828. E. Erosaria Schiff. Verz. Geo. F. 4. Hübn. Geo 25. Tiliaria Esp. Geo. 10. 3. 4.

2829. E. Quercaria. Hübn. Geo. 411. 412.

2830. E. Quercinaria Borkh. Geo. 42. Hübn. Geom. 24. & Tiliaria Beitr. II. 4. X.

2831. E. Tiliaria Borkh. Geo. 39. Hübn. Geo. 23. & Canaria Beitr. II. 4. Y.

2832. E. Angularia Schiff. Verz. Geom. F. 3. Hübn. Geo. 22.

2. Verein, Coitus 2.

Paragonien, Paragoniae.

Die Schwingen am Haarrande gefleckt; alle Flügel mit einer Zwischenlinie und Senenpunkten bezeichnet.

2833. Paragonia Tasimaria. Tasima Cram. 240. D. E.

Zweyte Familie, Familia B.

Mondfleckige, Lunulatae.

Die Flügel im Mitteraume mit einem durchsichtigen Mondfleckgen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Opisthographten, Opisthographtes.

Die Schwingen am Senenrande braun gefleckt.

2834. Opisthographtis Crataegaria. Crataegata Linn. Syst. Phal. 243. Hübn. Geo. 32.

2. Verein, Coitus 2.

Selenien, Seleniae.

Die Schwingen am Franzenrande vor ihrer Spitze mit einem braunen Fleck besetzt, übrigens mit braunen Linien und sanftfärbigen Bändern angelegt.

2835. Selenia Illunaria Hübn. Geo. 36. 37.

2836. S. Lunaria Schiff. Verz. Geo. F. 7. Hübn. Geo. 33. 451.

2837. S. Delunaria Hübn. Geo. 34.
2838. S. Illustraria. Hübn. Geo. 35.

Dritte Familie, Familia C.

Gemäßigte, Moderatae.

Die Flügel stumpfeckig, nur mit dunklen Linien bezeichnet, aber übrigens buntgemischt bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Hygrochroen, Hygrochroae.

Die Flügel sehr sparsam bezeichnet, aber lebhaft gefärbt.

2839. Hygrochroa Syringaria Linn. Syst. Phal. 206. Hübn. Geo. 29.
2840. H. Firmaria. Firmiana Cram. 398. F. G.

2. Verein, Coitus 2.

Euchlänen, Euchlaenae.

Die Flügel mit zwey dunklen Linien bezeichnet, und auffer denselben dunkel gefärbt.

2841. Euchlaena Obtusaria Hübn. Geo. 390.
2842. E. Apiciaria Schiff. Verz. Geom. F. 14. Hübn. Geo. 47.
2843. E. Vespertaria Linn Syst. Phal. 224. Parallelaria Schiff. Verz. Geo. F. 15. Hübn. Geo. 43. 44.

3. Verein, Coitus 3.

Hypagyrten, Hypagyrtes.

Die Flügel mit schattigen Linien bezeichnet, auch am Rande schattig.

2844. Hypagyrtis Adoptivaria. Pectinaria Hübn. Geo. 30.
2845. H. Pustularia Hübn. Zutr. 103. 104.

4. Verein, Coitus 4.

Cepphiden, Cepphides.

Die Flügel nur mit dunklen Linien bezeichnet, und inzwischen schattig angelegt.

2846. Cepphis Advenaria Hübn. Geo. 45.

2847. C. Emarginaria. Emarginata Linn. Syst. Phal. 236. Hübn. Geom. 107.

Vierte Familie, Familia D.

Ungewisse, Creperae.

Die Flügel fast ganz gleichrändig, kaum buchtig und mit unsteten Streifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Plagoden, Plagodes.

Die Flügel bandweise gestrichelt, sanftfärbig.

2848. Plagodis Dolabraria Linn. Syst. Phal. 207. Hübn. Geo. 42.

2. Verein, Coitus 2.

Anagogen, Anagogae.

Die Flügel bogig gestreift und zart gesprengelt, blaßfärbig.

2849. Anagoga Pulveraria Linn. Syst. Phal. 215. Hübn. Geo. 203.

2850. A. Inspersaria. Adspersaria Hübn. Beitr. II. 3. R. & Geo. 206.

2851. A. Commutataria Hübn. Geo. 505.

2852. A. Dilectaria Hübn. Geo. 39.

2853. A. Cararia Hübn. Geo. 38.

3. Verein, Coitus 3.

Pyrinien, Pyriniae.

Die Flügel mit zwey Streifen bezeichnet und dicht besprengt, lebhaft gefärbt.

2854. Pyrinia Rutilaria. Hübn. Zutr. I. 173. 174.

6. Stamm, Stirps VI.

Chleuasten, Chleuastae.

Ihre Gestalt ist ziemlich schlang; ihre Flügel doch ansehnlich, fast zackig und ihre ganze Anlage sprenglig.

Erste Familie, Familia A.

Gemeine, Vulgares.

Die Flügel entweder fleck- oder bandweise besprengt, oben mehr als unten gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Pseudopantheren, Pseudopantherae.

Die Flügel voll brauner Flecke in ganz hellfärbigem Grunde.

2855. Pseudopanthera Macularia Linn. Syst. Phal. 213. Hübn. Geo. 135.

2856. P. Crocearia. Croceata Cram. 360. F.

2. Verein, Coitus 2.

Crocoten, Crocotae.

Die Flügel ganz gleich angelegt und gefärbt.

2857. Crocota Tinctaria Hübn. Geo. 121.

2858. C. Prunaria Linn. Syst. Phal. 208. Hübn. Geo. 122. 123.

3. Verein, Coitus 3.

Chiasmien, Chiasmiae.

Die Flügel beyderley, oben und unten zart gitterartig braun bezeichnet und bestäubt.

2859. Chiasmia Cancellaria. Clathrata Schiff. Verz. Geo. H. 6. Hübn. Geo. 132.

2560. C. Clathraria. Clathrata. Linn. Syst. Phal. 238. Clerc. Icon. 2. 11. Cancellaria Hübn. Geo. 322.

4. Verein, Coitus 4.

Perconien, Perconiae.

Die Flügel ſtreifweis dunkel beſtäubt und ſcheckig befränzt.

2861. Perconia Strigillaria. Strigillata Linn. Syst. Phal. 268. Respersaria Hübn. Geo. 125.

2862. P. Irroraria. Hübn. Geo. 332.

2863. P. Roscidaria Hübn. Geo. 128.

2864. P. Immoraria Immorata Linn. Syst. Phal. 265. Hübn. Geo. 133.

2865. P. Glarearia Schiff. Verz. Geo. G. 6. Hübn. Geo. 131.

2866. P. Atomaria Linn. Syst. Phal. 214. Hübn. Geo. 136.

2867. P. Disspersaria Hübn. Geo. 134.

2868. P. Quinquaria Hübn. Geo. 516. 517. & 130.

2869. P. Cebraria Hübn. Geo. 129.

5. Verein, Coitus 5.

Eurranthen, Eurranthes.

Die Ohren ſehr großfiederig und alle Glieder ſchwarzſprenglig angelegt.

2870. Eurranthis Auritaria Hübn. Geo. 416.

2871. E. Plumistaria Vill. Ent. 479. Hübn. Geom. 417 — 420.

2872. E. Pennigeraria Hübn. Geo. 363.

6. Verein, Coitus 6.

Epirranthen, Epirranthes.

Die Schwingen oben mit einem Mittebande angelegt, ſchattig braun; die Senken gelb gefärbt.

2873. Epirranthis Diversaria. Diversata Schiff. Verz. Geo. G. 14. Aurantiata Fabr. Mant. Phal. 144. Hübn. Geo. 202.

2874. E. Obſirmaria.

7. Verein, Coitus 7.

Hypoplecten, Hypoplectes.

Die Flügel zart, ſchwarz geſtriemt und gleich gelb gefärbt.

2875. Hypoplectis Pertextaria Hübn. Zutr. 239. 240.

2876. H. Adspersaria Fabr. Mant. Phal. 45. Spartaria-ria Hübn. Geo. 116.

Zweyte Familie, Familia B.

Edele, Nobiles.

Die Flügel auf ihrer untern Fläche zierlicher angelegt und lebhafter gefärbt als auf der obern.

1. Verein, Coitus 1.

Isturgien, Isturgiae.

Die Flügel oben gelb; die Senken unten nach der Länge geſtreift.

2877. Isturgia Conspicuaria. Conspicuata Schiff. Verz. Geo. N. 16. Hübn. Geo. 117. 118.

2. Verein, Coitus 2.

Catographten, Catographtae.

Die Flügel oben braun gefärbt blaß gefleckt; unten der Länge und Breite nach geſtreift.

2878. Catographta Piniaria Linn. Syst. Phal. 210. Hübn. Geo. 119. 120. & 469. 470.

2879. C. Concordaria Hübn. Geo. 126. 518. 519. Famula Esp. Noc. 27. 4.

3. Verein, Coitus 3.

Cryptochroſten, Cryptochrostes.

Die Schwingen unten buntfärbig angelegt, die Senken blaß gefärbt, und beyderley zierlich bezeichnet.

2880. Cryptochrostis Suppulchraria. Hiphonoë Cram. 357. L. M.

Dritte Familie, Familia C.

Eckige, Angulatae.

Die Schwingen fast buchtig, die Senken fast spitzig; beyderley unten bunter als oben angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Euchöcen, Euchoecae.

Die Flügel mit geraden dunklen Streifen bezeichnet, grau gefärbt.

2881. Euchoeca Hepararia. Hübn. Geo. 58.

2882. E. Murinaria Schiff. Verz. Geo. G. 4. Hübn. Geo. 115.

2883. E. Disspersaria. Murinaria Hübn. Geo. 134.

2. Verein, Coitus 2.

Pharmacen, Pharmaces.

Die Flügel unterbrochen bezeichnet und besprengt in grauer Färbung.

2884. Pharmacis Aestimaria Hübn. Geo. 333.

2885. P. Libaria Cram. 357. L. M.

3. Verein, Coitus 3.

Semiothisen, Semiothisae.

Die Flügel bandweise abwechslend, oben satt unten bunt gefärbt.

2886. Semiothisa Fasciosaria Fasciata Fabr. Syst. Phal. 47. Eleonora Cram. 288. E. F. G.

2887. S. Lituraria. Liturata Linn. Faun. suec. 1273. Hübn. Geo. 54. 314.

2888. S. Gambaria Hübn. Zutr. 159. 160.

2889. S. Agnitaria Hübn. Zutr. 381. 382.

2890. S. Notataria. Schiff. Verz. Geo. F. 11. Hübn. Geo. 53. 316.

2891. S. Alternaria Hübn. Geo. 315.

2892. S. Signaria Hübn. Geo. 313. Alternata Schiff. Verz. Geo. G. 11.

2893. Limbularia Hübn. Zutr. 179. 180.

Vierte Familie, Familia D.
Bemerkte, Signatae.

Die Schwingen am Senenrande ſchwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Itamen, Itamae.

Die Schwingen auch im Mitteraume mit einem ſchwarzen Zeichen bemerkt.

2894. Itame Vincularia Hübn. Geo. 402.

2895. I. Wauaria Linn. Syst. Phal. 219. Hübn. Geo. 55.

2. Verein, Coitus 2.
Selidoſemen, Selidosemae.

Die Schwingen mit ſchwarz anfangenden Wellenſtreifen angelegt.

2896. Selidosema Plumaria Schiff. Verz. Geo. G. 9. Roraria Fabr. Mant. Phal. 43. Hübn. Geo. 124.

2897. S. Punctularia. Punctulata Schiff. Verz. Geo. G. 13. Hübn. Geo. 317.

7. Stamm, Stirps VII.
Eraſtrien, Erastriae.

Die Streichler ziemlich anſehnlich, deutlich beſchnauzt. Die Flügel rundlich, anſehnlich gemeinſchäftlich geſtricht und bandirt.

Erſte Familie, Familia A.
Erwählte, Electae.

Die Flügel roth bandirt, und mit dunklen Linien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Euchliden, Euchlida.

Die Flügel grau, schattig gestreift, rosenroth bandirt und schwarz bezeichnet.

2898. Euchlidon Cruentaria Hübn. Geo. 43.

2. Verein, Coitus 2.

Rhodostrophien, Rhodostrophiae.

Die Flügel blaß olivenfärbig, dunkel bezeichnet und rosenroth bandirt.

2899. Rhodostrophia Calabraria. Hübn. Beitr. II. 4. M. Geo. 365. 49.

2900. R. Vibicaria Linn. Syst. Phal. 198. Hübn. Geo. 50.

3. Verein, Coitus 3.

Syrrhodien, Syrrhodiae.

Die Flügel schattig, mit einem blassen Bande angelegt.

2901. Syrrhodia Decrepitaria Hübn. Zutr. 371. 372.

Zweite Familie, Familia B.

Eingemischte, Immistae.

Die Schwingen sattfärbig rothstreifig und blaß gefränzt; die Senken hellfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Lythrien, Lythriae.

Die Schwingen olivenbraun blutroth gestreift; die Senken ockergelb.

2902. Lythria Purpuraria Linn. Syst. Phal. 221. Hübn. Geo. 198. 199.

2. Verein, Coitus 2.

Catopyrrhen, Catopyrrhae.

Die Flügel alle gelb und mit rothen Linien bezeichnet.

2903. Catopyrrha Dissimilaria. Hübn. Erast. immist. Dissimilaria.

Dritte Familie, Familia C.

Abgeleitete, Derivatae.

Die Flügel fast eckig; ihre Zeichnungen bestehen vorzüglich in zweyerley gemeinschaftlichen Linien.

1. Verein, Coitus 1.

Calothysaniden, Calothysanides.

Die Flügel mit zwey schiefen braunen Linien bezeichnet und röthlich befränzt.

2904. Calothysanis Amataria Linn. Syst. Phal. 201. Hübn. Geo. 52.

2905. C. Immitaria Hübn. Geo. 51.

2906. C. Exemptaria. Strigillaria Schiff. Verz. Geo. P. 4. Hübn. Geo. 109.

2907. C. Emutaria Hübn. 323.

2. Verein, Coitus 2.

Microsemen, Microsemae.

Die Flügel mit zweyerley sehr zarten dunklen Linien bezeichnet; blaßfärbig.

2908. Microsema Quadripunctaria Hübn. Zutr. 393. 394.

3. Verein, Coitus 3.

Hämatopen, Haematopes.

Die Flügel mit zweyerley fast blutrothen Streifen bezeichnet.

2909. Haematopis Saniaria Hübn. Zutr. 345. 346.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Zärtliche, Tenues.

Der Leib schlang; die Flügel groß, beyderley ziemlich gleichend bezeichnet und gefärbt; und die Stützen dünn, glatt bekleidet.

1. Stamm, Stirps I.

Cyclophoren, Cyclophorae.

Sie zeichnen sich unter anderm, am deutlichsten durch ein augähnliches Zeichen, im Mitteraume ihrer Flügel aus.

Erste Familie, Familia A.

Offene, Apertae.

Die Flügel mit einem deutlich umringten Augzeichen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Cosymbien, Cosymbiae.

Die Senken eckig; alle mit einem weißlichen Auge bezeichnet.

2910. Cosymbia Nolaria Hübn. Geo. 325.

2. Verein, Coitus 2.

Leucophthalmien, Leucophthalmiae.

Beyderley Flügel mit einem weißen Auge und Wellenlinien bezeichnet.

2911. Leucopthalmia Ocellaria Hübn. Geo. 64.

2912. L. Omicronaria Schiff. Verz. Geo. H. 3. Hübn. Geo. 65.

2913. L. Orbicularia Hübn. Geo. 60.

3. Verein, Coitus 3.

Codonien, Codoniae.

Die Flügel beyderley mit einem schwarzen Ringgen und mehreren Punktreihen bezeichnet.

2914. Codonia Caecaria. Punctata Stoll. 12. 10.

2915. C. Pendularia Linn. Faun. 1244. Hübn. Geo. 66.
2916. C. Gyrata Hübn. Geo. 434.
2917. C. Punctaria Linn. Syst. Phal. 200. Hübn. Geo. 67.
2918. C. Pupillaria Hübn. Geo. 69.

4. Verein, Coitus 4.

Hyphalien, Hyphaliae.

Die Flügel eckig, mit dunkelkernigen Augfleckgen bezeichnet.

2919. Hyphalia Philyraria. Phylira. Cram. 170. D.
2920. H. Festivaria. Viridaria Cram. 370. G.

Zweyte Familie, Familia B.

Verwirrte, Perplexae.

Die Flügel in der Mitte ungleich bezeichnet, übrigens aber beyderley streifig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Ametriden, Ametrides.

Die Ohren und Stützen sehr zart und lang; die Senken mit einem Doppelpunkt bezeichnet.

2921. Ametris Netricaria. Netrix Cram. 151. E.
2922. A. Nitocritaria. Nitocris Cram. 275. A.
2923. A. Vulpenaria Cram. 400. O. P.
2924. A. Punicearia. Rosalia Cram. 368. F.

2. Verein, Coitus 2.

Brotiden, Brotides.

Die Schwingen mit einem blassen Fleck, die Senken mit einem weißen Punkt bemerkt.

2925. Brotis Vulneraria. Hübn. Zutr. 319. 320.
2926. B. Cydoniaria. Cydonia Cram. 22. F.

3. Verein, Coitus 3.

Adactyloten, Adactylotes.

Die Flügel nur mit Linien und Punktreihen bezeichnet.

2927. Adactylotis Gesticularia Hübn. Geo. 472. 473.
2928. A. Contaminaria Hübn. Geo. 356.
2929. A. Sparsaria Hübn. Geo. 325. 326.
2930. A. Linearia Hübn. Geo. 68.

4. Verein, Coitus 4.

Aplasten, Aplastae.

Die Flügel nur streifweiße dunkler buntlich besprengelt.

2931. Aplasta. Ononaria Fues. Arch. III. 17 Hübn. Geo. 93.
2932. A. Sudataria Hübn. Geo. 492.
2933. A. Faecataria Hübn. Geo. 503.

2. Stamm, Stirps II.

Spilotaen, Spilotae.

Die Flügel ziemlich rundlich, glatt; eigenzierlich bezeichnet; auch der Wanst etwas bemerkt.

Erste Familie, Familia A.

Gezierte, Ornatae.

Der Leib und die Flügel schwarzfleckig; erster gelb, letztere weiß.

1. Verein, Coitus 1.

Orthostixen, Orthostixes.

Die Flügel nur mit schwarzen Punkten reihenweiß bezeichnet.

2934. Orthostixis Cribraria Hübn. Geo. 83.
2935. O. Catenaria Drur. Ins. I. 8. 3.
2936. O. Petaviaria. Petavia Cram. 347. F.

2. Verein, Coitus 2.

Rhyparien, Rhyparіae.

Die Flügel mit vielen tropfförmigen schwarzen Flecken besetzt.

2937. Rhyparia Grossulariaria. Grossulariata Linn. Syst. Phal. 242. Hübn. Geo. 81. 82.

2938. R. Melanaria Linn. Syst. Phal. 212. Hübn. Geo. 86.

3. Verein, Coitus 3.

Pantheren, Pantherae.

Die Flügel mit großen Pantherflecken geziert, im Grunde färbig.

2939. Panthera Pardalaria Hübn. Zutr. 335. 336.

4. Verein, Coitus 4.

Calosspilen, Calospili.

Die Flügel bandweise tropfig und am Eck erzfärbig bezeichnet.

2940. Calospilos Ulmaria. Ulmata Fabr. Syst. Phal. 62. Hübn. Geo. 391. 392.

2941. C. Pantharia Linn. Syst. Phal. 218. Hübn. Geo. 84.

2942. C. Arearia. Area Cram. 56. D.

5. Verein, Coitus 5.

Eucheren, Eucherae.

Beyderley Flügel fleckig braun gestriemt und gesäumt.

2943. Euchera Cunicaria. Cunica Cram. 257. G.

2944. E. Hesperaria. Hesperia Cram. 251. B. A.

2945. E. Cenidaria. Cenis Cram. 147. E.

6. Verein, Coitus 6.

Orphanen, Orphani.

Die Schwingen strahlig und bandähnlich angelegt; die Senken bis zum Saum weiß.

2946. Orphanos Tripunctaria Linn. Syst. Phal. 226. Cram. 22. E.

2947. O. Coletaria. Coleta Cram. 368. H.

2948. O. Famularia. Famula Cram. 228. D.

2949. O. Luctinaria Fabr. Mant. Phal. 74. Luctinia Cram. 128. E.

2950. O. Evergistaria. Evergista Cram. 369. E.

Zweyte Familie, Familia A.

Geringe, Exiles.

Der Kopf, Rumpf und Wanst färbig, wie die Flügel.

1. Verein, Coitus 1.

Lomaspilen, Lomaspiles.

Die Flügel vorzüglich an den Ränden schwärzlichgrau gefleckt.

2951. Lomaspilis Naevaria Hübn. Beytr. I. 1. P. etc. Geo. 80.

2952. L. Marginaria. Marginata Linn. Syst. Phal. 257. Hübn. Geo. 79.

2953. L. Pollutaria. Hortulata. Sulz. Kennz. 16. 96. Hübn. Geo. 77.

2. Verein, Coitus 2.

Baptrien, Baptriae.

Die Flügel fast einfärbig, wie der Leib.

2954. Baptria Euphorbiaria. Euphorbiata Schiff. Verz. Geo. O. 9. Hübn. Geo. 78.

2955. B. Chaerophyllaria. Chaerophyllata Linn. Syst. Phal. 237. Hübn. Geo. 196.

2956. B. Tibialaria. Dimidiata Fabr. Ent. Phal. 179. Hüb. Geo. 210. 211.

2957. B. Quadrifaria Sulz. Gesch. 23. 4. Alpinata Schiff. Verz. Geo. N. 14. Hübn. Geo. 197.

Dritte Familie, Familia C.

Gestickte, Acupictae.

Die Flügel sind sowohl mit erzglänzenden als glanzlosen Linien und Puncten zierlich bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Vedien, Vediae.

Alle Flügel hellfärbig bandirt und, nur die Senken glänzend erzfärbig gesäumt.

2958. Vedia Erotaria. Erota Cram. 276. G.

2. Verein, Coitus 2.

Phrygionen, Phrygiones.

Die Flügel zart gölden gestreift und gesäumt.

2959. Phrygionis Cultaria. Politata Stoll. 31. 4.
2960. P. Corinnaria. Corinna Cram. 29. H.
2961. P. Julianaria. Julianata Stoll. 8. 4.

3. Verein, Coitus 3.

Chrysocesten, Chrysocestes.

Die Flügel unterbrochen gölden gesäumt.

2962. Chrysocestis Auraria. Aura Cram. 53. F.
2963. C. Concinnaria Hübn. Zutr. 199. 200.
2964. C. Fimbriaria. Fimbrialis Stoll. 16. 4. Cram. 348. C.

4. Verein, Coitus 4.

Idalien, Idaliae.

Die Flügel roth angelegt an den äussern Ränden; nur die Senken silbern bezeichnet.

2965. Idalia Pudoraria. Marginata Cram. 400. I.

5. Verein, Coitus 5.

Opisthoxien, Opisthoxiae.

Die Schwingen schattig, die Senken kreißweise angelegt und beäugt.

2966. Opisthoxia Amabilaria. Amabilis Cram. 112. G.

2967. O. Formosaria. Formosante Cram. 247. G.

3. Stamm, Stirps III.

Sphecoden, Sphecodae.

Ihr Leib ist sehr schlang; die Flügel groß, jener zeichenlos, diese mit Schlangenlinien bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Gefärbte, Coloratae.

Die Flügel im Grunde und in der Anlage gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Eoiden, Eoides.

Die Flügel purpurroth bandirt, dottergelb gefärbt.

2968. Eois Auroraria. Auroralis Schiff. Verz. Pyr. B. 39. Variegata Fabr. Mant. Phal. 226. Hübn. Geo. 63.

2969. E. Ostrina Hübn. Geo. 430.

2970. E. Russearia Hübn. Zutr. 155. 156.

2971. E. Politaria Hübn. Geo. 61.

2. Verein, Coitus 2.

Hamalien, Hamaliae.

Die Flügel am Senenrande und den Linien nach blutroth.

2972. Hamalia Delotaria Hübn. Zutr. 235. 236.

3. Verein, Coitus 3.

Emmilten, Emmiltes.

Die Flügel geröthet, streifweise schattig angelegt.

2973. Emmiltis Rubricaria. Rubricata Schiff. Verz. Geo. K. 19. Hübn. Geo. 111. 487.

2974. E. Ochrearia. Ochreata Schiff. Verz. Geo. K. 20. Hübn. Geo. 110.

2975. E. Circuitaria Hübn. Geo. 499.

2976. E. Vittaria Hübn. Geo. 429.

2977. E. Parvularia Pygmaearia. Hübn. Geo. 335. 336.

2978. E. Nexaria. Nexata Hübn. Geo. 421. 401.

4. Verein, Coitus 4.

Sterrhen, Sterrhae.

Die Flügel rostbraun gewellt, auf glänzend weißem Grunde.

2979. Sterrha Sericearia Hübn. Geo. 404.

5. Verein, Coitus 5.

Pycten, Pyctis.

Die Flügel hellgelb, die Linien braun.

2980. Pyctis Aureolaria Schiff. Verz. Geo. E. 8. Hübn. Geo. 62.

2981. P. Flaveolaria Hübn. Geo. 341.

Zweyte Familie, Familia B.

Verkalchte, Calcinatae.

Die Flügel nur mit blassen Linien bezeichnet, und im Grunde weiß.

1. Verein, Coitus 1.

Deilinien, Deiliniae.

Die Schwingen mit drey, die Senken mit zwey, fast geraden Linien bemerkt.

2982. Deilinia Pusaria Linn. Syst. Phal. 223. Hübn. Geo. 87.

2983. D. Striaria Hübn. Geo. 88.

2. Verein, Coitus 2.

Asthenen, Asthenae.

Die Flügel mit mehreren geschlängelten Linien und schwarzen Randpünctgen bezeichnet.

2984. Asthena Nemoraria Hübn. Geo. 89.

2985. A. Remutaria. Remutata Linn. Syst. Phal. 266. Hübn. Geo. 98.

2986. A. Tiburtiaria. Tiburtia Cram. 359. F.

2987. A. Candidaria. Candidata Schiff. Verz. Geo. K. 23. Hübn. Geo. 101.

2988. A. Lutearia. Luteata Schiff. Verz. Geo. K. 18. Hüb. Geo. 103.

3. Verein, Coitus 3.

Leptomeriden, Leptomerides.

Die Flügel mit einem schwarzen Mittepunct und fast geraden schattigen Linien.

2989. Leptomeris Exanthemaria. Exanthemata Schiff. Verz. Geo. H. 5. Hübn. Geo. 97.

2990. L. Umbellaria Hübn. Geo. 437. 438.

2991. L. Sulcaria. Strigaria Hübn. Geo. 95.

2992. L. Rufaria Hübn. Geo. 112.

2993. L. Lacernaria Hübn. Geo. 422.

2994. L. Ossearia. Osseata Schiff. Verz. Geo. K. 22. Hübn. Geo. 102.

2995. L. Dilutaria Hübn. Geo. 100.

2996. L. Pallidaria Pallidata Schiff. Verz. Geo. K. 21. Hübn. Geo. 96.
2997. L. Mediaria Hübn. Geo. 502.
2998. L. Sylvestraria Hübn. Geo. 94.
2999. L. Turbidaria Hübn. Geo. 501.
3000. L. Inconspicuaria Hübn. Geo. 500.
3001. L. Virgularia. Virgulata Schiff. Verz. Geo. P. 8. Hübn. Geo. 104.

4. Verein, Coitus 4.

Lomographen, Lomographae.

Die Senken am Senenrande fast schwarz gefleckt auf den Linien.

3002. Lomographa Taminaria. Taminata Schiff. Verz. Geo. O. 6. Hübn. Geo. 90.
3003. L. Permutataria Hübn. Geo. 504. 92.
3004. L. Renularia Hübn. Geo. 331.
3005. L. Laevigaria. Laevigata Schiff. Verz. Geo. P. 10. Hübn. Geo. 74.

Dritte Familie, Familia C.

Bewölkte, Nubilosae.

Die Flügel mit welligen Linien und wolkigen Streifen geziert.

1. Verein, Coitus 1.

Arrhostien, Arrhostiae.

Die Flügel mit deutlichen Linien und Schattenbändern angelegt.

3006. Arrhostia Aversaria. Aversata Linn. Syst. 251. Hübn. Geo. 56. 338.
3007. A. Immutaria. Immutata Linn. Syst. Phal. 264. Hübn. Geo. 108.
3008. A. Contiguaria Hübn. Geo. 105.

3009. A. Umbellularia Hübn. Zutr. 429. 430.
3010. A. Incanaria. Incanata Linn. Syst. Phal. 263. Hübn. Geo. 106.

2. Verein, Coitus 2.

Craspedien, Craspediae.

Die Flügel aussen, gleichsam mit zierlichen Borten ausgezeichnet.

3011. Craspedia Ornataria. Ornata Schiff. Verz. Geo. P. 14. Hübn. Geo.
3012. C. Decoraria. Decorata Schiff. Verz. Geo. P. 13. Cinerata Fabr. Mant. Phal. 211. Hübn. Geo. 71.
3013. C. Moniliaria. Moniliata Schiff. Verz. Geo. P. 9. Hübn. Geo. 59.
3014. C. Scutularia. Scutulata Schiff. Verz. Geo. P. 12. Hübn. Geo. 72. 73.
3015. C. Pusillaria. Pusillata Schiff. Verz. Geo. K. 26. Hübn. Geo. 99.
3016. C. Arcuaria Hübn. Geo. 137.

4. Stamm, Stirps IV.

Sciadien, Sciadiae.

Die Flügel besonders groß und gleich zackig gerändet; beyderley ziemlich übereintreffend schattig gestreift.

Erste Familie, Familia A.

Schattige, Distinctae.

Die Flügel bandweise sehr schattig angelegt und mit einem Mittezeichen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Nephodien, Nephodiae.

Das Mittezeichen gering, die Schattenbänder sanft wolkig.

3017. Nephodia Nubilaria Hübn. Zutr. 395. 396.
3018. N. Cicaria.

2. Verein, Coitus 2.

Scotopterицen, Scotopterices.

Die Flügel mit ringähnlichen Mittezeichen und Wellenstreife bemerkt, auch dunkel schattig bandirt.

3019. Scotopterix Furvaria. Furvata Schiff. Verz. Geo. I. 1. Hübn. Geo. 144.

3020. S. Obscuraria. Obscurata Schiff. Verz. Geo. I. 3. Hübn. Geo. 146.

3021. S. Pullaria. Pullata Schiff. Verz. Geo. I. 2. Hübn. Geo. 145.

3022. S. Taeniolaria Hübn. Geo. 357.

3023. S. Limosaria Hübn. Geo. 360.

3024. S. Canaria Hübn. Geo. 344.

3025. S. Respersaria Hübn. Geo. 406.

3. Verein, Coitus 3.

Catascien, Catasciae.

Die Flügel hell, fast ohne Schatten; aber mit Wellenlinien bezeichnet.

3026. Catascia Obfuscaria. Obfuscata Schiff. Verz. Geo. I. 4. Hübn. Geo. 142.

3027. C. Operaria Hübn. Geo. 359.

3028. C. Dilucidaria Schiff. Verz. Geo. I. 6. Hübn. Geo. 143.

4. Verein, Coitus 4.

Ascoten, Ascotes.

Die Flügel nur mit zierlichen Mittezeichen und Wellenlinien bemerkt, fast schattenlos.

3029. Ascotis Selenaria Schiff. Verz. Geo. D. 7. Hübn. Geo. 163.

3030. A. Serotinaria Schiff. Verz. Geo. D. 14. Hübn. Geo. 147.

5. Verein, Coitus 5.

Dyscien, Dysciae.

Die Flügel ziemlich dick und mäßig, auch nachläßig bezeichnet und beschattet.

3031. Dyscia Conspersaria Schiff. Verz. Geo. G. 8. Hübn. Geo. 138.

3032. D. Emucidaria Hübn. Geo. 425.

6. Verein, Coitus 6.

Hyposcoten, Hyposcotes.

Die Flügel ohne Mittezeichen mit unterbrochener Anlage.

3033. Hyposcotis Glaucinaria. Hübn. Geo. 150.

3034. H. Mucidaria Hübn. Geo. 148.

Zweyte Familie, Familia B.

Glänzende, Nitidae.

Die Flügel glänzend glatt und schattig bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Parascotien, Parascotiae.

Die Flügel mehrfach schattig angelegt.

3035. Parascotia Carbonaria Schiff. Verz. Geo. I. 5. Hübn. Geo. 151.

3036. P. Trepidaria Hübn. Geo. 343.

2. Verein, Coitus 2.

Orphnen, Orphnae.

Die Flügel nur einfach bandirt und sehr dunkel gefärbt.

3037. Orphne Torvaria Hübn. Geo. 396—399.

3038. O. Horridaria Schiff. Verz. Geo. C. 7. Hübn. Geo. 149. 132.

Dritte Familie, Familia C.

Zweydeutige, Ambiguae.

Die Flügel sonderbar geformt und angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Schidacen, Schidaces.

Die Flügel unebengerändet und nur mit kurzen Strichgen bezeichnet.

3039. Schidax Squammularia. Hübn. Zutr. 161. 162.

3040. S. Venetaria Hübn. Geo. 329.

5. Stamm, Stirps V.

Cymatophoren, Cymatophorae.

Diese Spanner zeichnen, bey ihrem mäßigen Ansehen, ihre mit fast verworrenen Wellenlinien bezeichnete Flügel und deren schattigbraune Bestäubung in grauer Färbung, unter anderm auch ihre blasse schwärzlich gefleckte Unterflächen aus.

Erste Familie, Familia A.

Ansehnliche, Prolixae.

Die Flügel beyderley groß; ihre Zeichen übereintreffend wie ihre Färbung.

1. Verein, Coitus 1.

Epimecen, Epimeces.

Die Flügel beyderley ansehnlich; die Schwingen mit drey, die Senken mit zwey Wellenlinien, auch schattig angelegt.

3041. Epimecis Hortaria Fabr. Ent. Phal. 31. Liriodendraria Abb. Lepidopt. 102.

3042. E. Umbraria Hübn. Geo. 340.

2. Verein, Coitus 2.

Dryocötiden, Dryocoetides.

Die Flügel auch ansehnlich und ziemlich deutlich mit ring-förmigen Mittezeichen und mäßigen Wellenlinien bezeichnet.

3043. Dryocoetis Roboraria Schiff. Verz. Geo. D. 1. Hübn. Geo. 169.

3044. D. Consortaria Fabr. Ent. Phal. 29. Hübn. Geo. 168.

3045. D. Virginiaria Cram. 275. G.

3046. D. Carinentaria. Carinenta Cram. 128. F.

3047. D. Umbrosaria Hübn. Cymat. prol. Umbrosaria.

3048. D. Cinctaria Schiff. Verz. Geo. D. 6. Hübn. Geo. 166.

3049. D. Dianaria Hübn. Geo. 483.

2050. D. Glabraria Hübn. Geo. 162.

3051. D. Teneraria Hübn. Geo. 348.

3. Verein, Coitus 3.

Ectropen, Ectropes.

Die Flügel sehr unterbrochen gezeichnet und blaß gefärbt.

3052. Ectropis Crepuscularia Schiff. Verz. D. 8. Hübn. Geo. 158.

3053. E. Consonaria Hübn. Geo. 147.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemeine, Simplices.

Die Senken ziemlich kurz, auch nur schlecht angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Deileptenien, Deileptenieae.

Die Schwingen mehrfach, aber unstet, gezeichnet und dunkel schattig bandirt.

3054. Deileptenia Abietaria Schiff. Verz. Geo. D. 3. Ribeata Clerc. 6. 5. Hübn. Geo. 160.

3055. D. Hypanaria. Hypanis Cram. 142. D.
3056. D. Conversaria Hübn. Geo. 321. 393.
3057. D. Extersaria Hübn. Geo. 159.
3058. D. Rhomboidaria Schiff. Verz. Geo. D. 4. Hübn. Geo. 154. 170. 488.
3059. D. Repandaria Schiff. Verz. Geo. D. 2. Repandata Linn. Faun. 1260. Hübn. Geo. 161.
3060. D. Meropidaria. Merops Cram. 18. C.
3061. D. Approximaria Hübn. Cymat. Simp. Approximaria.
3062. D. Plancaria. Glabaria Hübn. Geo. 339.
3063. D. Secundaria Schiff. Verz. Geo. D. 5. Hübn. Geo. 156.
3064. Titearia. Titea Cram. 275. C.

2. Verein, Coitus 2.

Synopsien, Synopsiae.

Die Schwingen noch mit zwey, die Senken nur mit einer Wellenlinie bemerkt.

3065. Synopsia Sociaria Hübn. Geo. 155. 424.
3066. S. Petrificaria. Petrificata Hübn. Geo. 277.
3067. S. Viduaria Schiff. Verz. Geo. D. 9. Hübn. Geo. 165. 364.
3068. S. Lichenaria Schiff. Verz. Geo. C. 8. Hübn. Geo. 164.

Dritte Familie, Familia C.

Sonderliche, Ablecte.

Die Flügel sehr ungleich, die Schwingen färbig, die Senken blaß.

1. Verein, Coitus 1.

Tephronien, Tephroniae.

Die Schwingen schmal, die Senken kurz; und erstere schattig bandirt.

3069. Tephronia Corticaria Schiff. Verz. Geo. C. 9. Hübn. Geo. 167.

3070. T. Scabraria. Scabrata Hübn. Geo. 229

3071. T. Cineraria Schiff. Verz. Geo. C. 10. Hübn. Geo 171.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Mißdeutige, Aequivocae.

Sie haben überhaupt weder gleiche Formen noch gleiche Anlagen mit den vorigen Spannern. Ihre Flügel sind glatt geründet und ungleich angelegt.

1. Stamm, Sirps I.

Pachyen, Pachyes.

Der Kopf, Rumpf und Wanst ist ziemlich dick, rauh behaart. Die Flügel sind mit ungleichen Linien nud schattigen Bändern bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Spinnerförmige, Bombyciformes.

Der Leib sehr dick; die Flügel kleinlich, unterschiedlich angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Eubyjen, Eubyjae.

Die Schwingen lang, die Senken kurz; beyderley sehr zackig und sprenglig bezeichnet.

3072. Eubyja Prodromaria Schiff. Verz. Geo. C. 1. Hübn. Geo. 172.

3073. E. Betularia Linn. Syst. Phal. 217. Hübn. Geo. 173.

2. Verein, Coitus 2.

Lycien, Lyciae.

Der Leib sehr rauhaarig; die Flügel mit schattigen Wellenstreifen angelegt.

3074. Lycia Hirtaria Linn. Syst. app. Congeneraria. Borkh. Spann. 75. Hübn. Geo. 174. 175.

3075. L. Asperaria Hübn. Geo. 484.

3. Verein, Coitus 3.

Apocheimen, Apocheimae.

Die Männer auf den Schwingen grau und schwarz gewellt; die Weiber fast flügellos.

3076. Apocheima Alpinaria Scrib. III. 17. 4. 5. Alpina Sulz. Gesch. 21. 5. 6. Hübn. Geo. 178. 513.

3077. A. Hispidaria Schiff. Verz. Geo. C. 4. Hübn. Geo. 177.

3078. A. Pomonaria Hübn. Geo. 180.

3079. A. Pilosaria Schiff. Verz. Geo. C. 6. Pedaria Fabr. Mant. Phal. 58. Hübn. Geo. 176.

4. Verein, Coitus 4.

Ithysien, Ithysiae.

Die Schwingen mit blassen Längs- und Querstrichen, wie auch mit schattigen Bändern bezeichnet; die Weiber unbeflügelt.

3080. Ithysia Zonaria Schiff. Verz. C. 5. Zona. Fabr. Bom. Mant. 192. Hübn. Geo. 179. 511.

3081. I. Pravaria. Pravata Hübn. Geo. 432.

5. Verein, Coitus 5.

Pseudothricen, Pseudothrices.

Die Männer auf den Schwingen mit einem dunklen Mittezeichen und zweyen Linien bezeichnet.

3082. Psednothrix Belgicaria Hübn. Geo. 140.
3083. P. Penulataria Hübn. Geo. 507. 508.
3084. P. Favillacearia Hübn. Geo. 139.

Zweyte Familie, Familia B.

Ungleiche, Dispariles.

Die Männer schlang, großflüglig; die Weiber dickwanstig, kleinflüglig.

1. Verein, Coitus 1.

Eranniden, Erannides.

Die Schwingen der Männer ziemlich buntfärbig, bandweise gestreift; die Senken blaß. Die Weiber sind flügellos.

3085. Erannis Defoliaria Linn. Faun. Suec. 1238. Hübn. Geo. 182. 510.
3086. E. Progemaria Hübn. Geo. 183.
3087. E. Aurantiaria Hübn. Geo. 184.
3088. E. Aceraria Schiff. Verz. Geo. D. 13. Hübn. Geo. 185. 514.

2. Verein, Coitus 2.

Agriopiden, Agriopides.

Die Schwingen der Männer grau, weißlich bandirt; die Senken bleich.

3089. Agriopis Nigricaria Hübn. Geo. 181.
3090. A. Leucophaearia Schiff. Verz. Geo. D. 11. Hübn. Geo. 195.
3091. A. Sordidaria Hübn. Geo. 334.
3092. A. Bajaria Schiff. Verz. Geo. D. 10. Hübn. Geo. 194.

3. Verein, Coitus 3.

Alsophilen, Alsophilae.

Die Schwingen sattgrau mit einzelen weißlichen Zackenlinien bezeichnet; die Senken blaßgrau.

3093. Alsophila Aescularia Schiff. Verz. Geo. D. 12. Hübn. Geo. 189.

3094. A. Hippocastanaria Hübn. Geo. 186.

3095. A. Difformaria. Degenerata Hübn. Geo. 405.

4. Verein, Coitus 4.

Therien, Theriae.

Die Schwingflügel dunkelfärbig, mit einer blassen Wellenlinie besetzt; die Senkflügel blaßgrau.

3096. Theria Rupicapraria Schiff. Verz. Geo. G. 3. Hübn. Geo. 222. 512.

3097. T. Fuscaria Hübn. Geo. 396.

2. Stamm, Stirps II.

Epirriten, Epirritae.

Diese sind zwar ziemlich gemeinförmig, sie haben aber zarte, gewässert bandirte Flügel.

Erste Familie, Familia A.

Größliche, Grandiculae.

Beyderley Flügel mäßig groß; die Schwingen mehrfach gestreift und sätter gefärbt als die Senken.

1. Verein, Coitus 1.

Operophteren, Operophterae.

Die Schwingen bandweise dunkel gewässert; die Senken fast desgleichen bezeichnet. Die Weiber kaum geflügelt.

3098. Operophtera Brumata Linn. Syst. Phal. 281. Hübn. Geo. 191. 509.

3099. O. Boreata Hübn. Geo. 413. 414.

2. Verein, Coitus 2.

Oporinien, Oporiniae.

Die Schwingen bandweise schattig und dunkel wellig gestreift; die Senken ähnlich gesäumt.

3100. Oporinia Dilutata Schiff. Verz. Geo. K. 4. Hübn. Geo. 188.

3101. O. Sertata Hübn. Geo. 489. 490.

3102. O. Rupestrata Schiff. Verz. Geo. K. 6. Hübn. Geo. 192.

3103. O. Alpestrata Hübn. Geo. 320.

3104. O. Polycommata Schiff. Verz. Geo. K. 8. Hübn. Geo. 190.

3. Verein, Coitus 3.

Hydrelien, Hydreliae.

Die Schwingen groß, die Senken klein; beyderley gleichend mit dunklen und blassen Wellenlinien geziert.

3105. Hydrelia Sylvata Schiff. Verz. Geo. K. 7. Hübn. Geo. 231.

4. Verein, Coitus 4.

Hydriomenen, Hydriomenae.

Die Schwingen wellig bunt bandirt und gestreift; die Senken blos schattig gewässert.

3106. Hydriomena Impluviata Schiff. Verz. Geo. K. 5. Hübn. Geo. 223.

3107. H. Elutata Hübn. Geo. 224. 381—385.

3108. H. Aqueata Hübn. Geo. 353.

5. Verein, Coitus 5.

Eucestien, Eucestiae.

Die Schwingen schief, sonderbar fleckig und streifig angelegt, buntlich gefärbt; die Senken schmal, nur schattig.

3109. Eucestia Spartiata. Fuesl. Arch. II. 4. 5. Legatella Schiff. Verz. Tin. B. 61. Hübn. Geo. 187.

3110. E. Obliquata. Obliquaria Schiff. Verz. Geo. E. 6. Hübn. Geo. 225.

6. Verein, Coitus 6.

Trichopterycen, Trichopteryces.

Die Männer haben kleine Ueberflügel an den Senken; die Schwingen sind gewässert bandirt.

3111. Trichopteryx Lobulata Hübn. Geo. 362.
3112. T. Hexapterata Schiff. Verz. Geo. K. 10. Hübn. Geo. 232.
3113. T. Sexalata Hübn. Geo. 228.
3114. T. Viretata Hübn. Geo. 230.
3115. T. Decolorata Hübn. Geo. 243.

Zweyte Familie, Familia B.

Kleinliche, Parvulae.

Die Schwingen lang und schief; die Senken schmal und kurz; erstere deutlich bandartig gestreift, letztere läßig bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Chloroclysten, Chloroclystes.

Die Schwingen, wie der Kopf und Rumpf, grünlich gefärbt, grau bandirt und schwarz gewässert.

3116. Chloroclystis Coronata Hübn. Geo. 372. 373.
3117. C. Rectangulata Linn. Syst. Phal. 270. Subaerata Hübn. Geo. 463. et 235.
3118. C. Debiliata Hübn. Geo. 462. 466.

2. Verein, Coitus 2.

Tephroclysten, Tephroclystiae.

Die Schwingen braun graulich, schwärzlichgrau bandirt und schwarz gewässert.

3119. Tephroclystia Subumbrata Schiff. Verz. Geo. K. 25. Hübn. Geo. 233.

3120. T. Residuata Hübn. Geo. 467.
3121. T. Pusillata Schiff. Verz. Gec. K. 26. Hübn. Geo. 378.
3122. T. Pumillata Hübn. Geo. 383.
3123. T. Valerianata Hübn. Geo. 394. 395.
3124. T. Pimpinellata Hübn. Geo. 443. 444.
3125. T. Denotata Hübn. Geo. 455.
3126. T. Minutata Schiff. Verz. Geo. K. 27. Hübn. Geo. 454.
3127. T. Inturbata Hübn. Geo. 461.
3128. T. Subnotata Hübn. Geo. 458.

3. Verein, Coitus 3.

Dyscymatogen, Dyscymatogae.

Die Schwingen gestreckt, aschgrau, mit fast eckigen Bändern angelegt.

3129. Dyscymatoge Innotata Knoch. Beytr. I. 1. 8. Hübn. Geo. 441. 442.
3130. D. Minutata Hübn. Geo. 237.
3131. D. Exiguata Hübn. Geo. 379.
3132. D. Absinthiata Linn. Faun. suec. 2296. Hübn. Geo. 453.
3133. D. Indigata Hübn. Geo. 399.
3134. D. Nanata Hübn. Geo. 387.
3135. D. Lanceata Succenturiata Hübn. Geo. 236.

4. Verein, Coitus 4.

Tarachien, Tarachiae.

Die Schwingen aschgrau, mit fast wirbligen Bande und Linien.

3136. Tarachia Castigata Hübn. Geo. 456.
3137. T. Austerata Hübn. Geo. 457.
3138. T. Sobrinata Hübn. Geo. 465.

5. Verein, Coitus 5.

Leucocoren, Leucocorae.

Die Schwingen weiß, ungleich grau bandirt und schwarz bezeichnet.

3139. Leucocora Succenturiata Linn. Syst. Phal. 267. Hübn. Geo. 459. 246.

3140. L. Centaureata Schiff. Verz. Geo. N. 7. Hübn. Geo. 452. 240.

3141. L. Extremata Fabr. Mant. Phal. 218. Hübn. Geo. 239.

3142. L. Irriguata Hübn. Geo. 397.

6. Verein, Coitus 6.

Arcyonien, Arcyoniae.

Die Schwingen auf weißlich grauem Grunde, netzähnlich schwarz bezeichnet.

3143. Arcyonia Venosata Fabr. Mant. Phal. 205. Hübn. Geo. 244.

3144. A. Consignata Hübn. Geo. 245.

7. Verein, Coitus 7.

Eucymatogen, Eucymatogae.

Die Flügel beyderley fast gleich angelegt, und mit einem buntfärbigen Bande geziert.

3145. Eucymatoge Togata Hübn. Geo. 464.

3146. E. Strobilata Hübn. Geo. 449. 450.

3147. E. Linariata Schiff. Verz. Geo. M. 10. Hübn. Geo. 242.

3. Stamm, Stirps III.

Rheumapteren, Rheumapterae.

Die Flügel schattig gestreift und schwarz gewässert; der Wanst schwarz bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Bandirte, Fasciatae.

Beyderley Flügel mit einem Bande durch die Mitte angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Mesoleucen, Mesoleucae.

Die Flügel fast gleich, mit einem weißen Mittebande bezogen.

3148. Mesoleuca Albicillata Linn. Syst. Phal. 255. Hübn. Geo. 76.

3149. M. Sinuata Schiff. Verz. Geo. N. 9. Hübn. Geo. 288.

3150. M. Adustata Schiff. Verz. Geo. N. 6. Hübn. Geo. 75.

3251. M. Filicata Hübn. Geo. 238.

2. Verein, Coitus 2.

Euphyien, Euphyiae.

Die Schwingen bis über die Mitte hinaus zierlich dunkel angelegt; übrigens weiß und schattig gefleckt.

3152. Euphyia Picata Hübn. Geo. 435.

3153. E. Tophaceata Schiff. Verz. Geo. M. 16. Hübn. Geo. 309.

3. Verein, Coitus 3.

Cosmorhoen, Cosmorhoae.

Die Schwingen mit einem sattfärbigen Mittebande geziert; die Senken ziemlich blaß angelegt.

3154. Cosmorhoë Chalybeata Hübn. Geo. 350.

3155. C. Occellata Linn. Syst. Phal. 258. Hübn. Geo. 252.

3256. C. Rusticata Schiff. Verz. Geo. M. 15. Hübn. Geo. 241.

4. Verein, Coitus 4.

Xanthorhoen, Xanthorhoae.

Die Schwingen weiß, mit einem gelbgemischten Bande besetzt und grau gewässert; die Senken fast zeichenlos.

3157. Xanthorhoë Montanata Schiff. Verz. Geo. M. 14. Hübn. Geo. 248.

3158. X. Galliata Schiff. Verz. Geo. M. 13. Hübn. Geo. 272.

5. Verein, Coitus 5.

Plemyrien, Plemyriae.

Die Schwingen nur mit einem halben Mittebande angelegt.

3159. Plemyria Rubiginata Schiff. Verz. Geo. N. 5. Hübn. Geo. 250.

3160. P. Fluctuata Linn Syst. Phal. 260. Hübn. Geo. 249.

3161. P. Procellata Schiff. Verz. Geo. N. 1. Hübn. Geo. 251.

3162. P. Stragulata. Hübn. Geo. 337.

6. Verein, Coitus 6.

Perizomaten, Perizomata.

Die Schwingen hell, mit schattigen Wasserstreifen bezeichnet; die Senken trüb.

3163. P. Perizoma Blandiata Schiff. Verz. Geo. N. 15. Hübn. Geo. 258.

3164. P. Albulata Schiff. Verz. Geo. K. 12. Hübn. Geo. 257.

Zweyte Familie, Familia B.

Strömige, Rivatae.

Die Flügel beyderley mit weißen Bändgen wellenähnlich angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Epirrhoen, Epirrhoae.

Die Flügel unterschieden grau, braun und weiß wechslend, wellig gestreift und schwarz bezeichnet.

3165. Epirrhoë Rivata Hübn. Geo. 409.
3166. E. Amniculata Hübn. Geo. 386.
3167. E. Aparinata Alchemillata Schiff. Verz. Geo. M. 8. Hübn. Geo. 370. 264.
3168. E. Molluginata Hübn. Geo. 371.

2. Verein, Coitus 2.

Eulypen, Eulypae.

Die Flügel beyderley gleichend weiß und schwarzwellig gestreift, auch weiß und schwarz wechslend befränzt.

3169. Eulype Hastata Linn. Syst. Phal. 254. Hübn. Geo. 256.
3170. E. Hastulata Hübn. Geo. 356.
3171. E. Tristata Linn. Syst. Phal. 252. Hübn. Geo. 254.
3172. E. Funerata Hübn. Geo. 260.

3. Verein, Coitus 3.

Colostygien, Colostygiae.

Die Flügel unterschieden zierlich weiß und schwarz wellig bandirt und zähnig befränzt.

3173. Calostigia Turbata. Hübn. Geo. 255.
3174. C. Luctuata Schiff. Verz. Geo. M. 28. Hübn. Geo. 253.
3175. C. Alchemillata Linn. Syst. Phal. 223. Rivulata Schiff. Verz. Geo. K. 13. Hübn. Geo. 259.

Dritte Familie, Familia C.

Gewässerte, Dilutae.

Die Flügel bandweise zartstreifig bezeichnet und beschattet.

1. Verein, Coitus 1.

Malenydriden, Malenydrides.

Die Schwingen deutlich mit einem Mittepunct bezeichnet, und fast bandirt.

3176. Malenydris Incursata Hübn. Geo. 351.
3177. M. Scripturata. Scripturaria Schiff. Verz. Geo. K. 31. Hübn. Geo. 274.
3178. M. Salicata Schiff. Verz. Geo. K. 11. Hübn. Geo. 273.

2. Verein, Coitus 2.

Hypepirriten, Hypepirrites.

Die Schwingen vorzüglicher schattig und schwarz gewässert als die Senken.

3179. Hypepirritis Modicata Hübn. Geo. 361.
3180. H. Impurata Hübn. Geo. 347.

3. Verein, Coitus 3.

Cataclysmen, Cataclysmae.

Die Flügel mit weißlichen Wellenlinien überzogen.

3181. Cataclysme Riguata Hübn. Geo. 358.

4. Stamm, Sirps IV.

Hydrien, Hydriae.

Sie haben auf ihren Flügeln kaum Spuren von bandähnlichen Anlagen, sind aber mit vielen ziemlich gleich laufenden Wellenlinien bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Volle, Plenae.

Die Schwingen ziemlich glatträndig; die Senken gezähnt; beyderley voller Linien.

1. Verein, Coitus 1.

Calocalpen, Calocalpae.

Die Flügel sehr zierlich mit schwarzen Wellenlinien überzogen.

3182. Calocalpe Undulata Linn. Syst. Phal. 239. Hübn. Geo. 262. 436.

2. Verein, Coitus 2.

Plerocymien, Plerocymiae.

Die Schwingen zierlicher als die Senken mit Schattenstreifen und Wellenlinien bezeichnet.

3183. Plerocymia Cervinata. Schiff. Verz. Geo. L. 1. Hübn. Geo. 318.

3184. P. Dubitata Linn. Syst. Phal. 235. Hübn. Geo 265.

3185. P. Certata Cervinata Hübn. Geo. 266.

3186. P. Bilineata Linn. Syst. Phal. 245. Hübn. Geo. 264.

3. Verein, Coitus 3.

Phileremen, Phileremae.

Die Flügel ziemlich gleich, zartschattig und streifig angelegt.

3187. Philereme Rhamnata Schiff. Verz. Geo. K. 2. Hübn. Geo. 271. 400.

3188. P. Vetulata Schiff. Verz. Geo. K. 1. Hübn. Geo. 263.

4. Verein, Coitus 4.

Coenocalpen, Coenocalpae.

Die Flügel ziemlich gleich, aber nachläßig schattig und streifig angelegt.

3189. Coenocalpe Lapidata Hübn. Geo. 324.

3190. C. Testaceata Hübn. Geo. 338.

Zweyte Familie, Familia B.

Vergleichliche, Comparabiles.

Alle Flügel ziemlich glatträndig, fast voll mit Linien, aber ungleich angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Horismen, Horismae.

Die Schwingen mit einer blassen Wellenlinie nebst den dunklen bezeichnet.

3191. Horisme Tersata Schiff. Verz. Geo. K. 14. Hübn. Geo. 268.

2192. H. Aemulata Hübn. Geo. 448.

2. Verein, Coitus 2.

Orthonamaten, Orthonamata.

Die Flügel mit geraden Linien bezeichnet, fast brandschattig.

3193. Orthonama Vitalbata Schiff. Verz. Geo. K. 15. Hübn. Geo. 269.

3194. O. Lignata Hübn. Geo. 270.

3195. O. Aquata Hübn. Geo. 410.

Dritte Familie, Familia C.

Abweichende, Declinatae.

Ihre Schwingen haben gleichsam drey dunkle Bänder, auch sind sie mit Mittepuncten bemerkt und gänzlich mit Wellenlinien bezogen.

1. Verein, Coitus 1.

Entephrien, Entephriae.

Die Schwingen aschfärbig gemischt und bräunlichgrau schattig bandirt.

3196. Entephria Flavicinctata Hübn. Geo. 354.

3197. Bipunctata. Bipunctaria Schiff. Verz. L. 5. Hübn. Geo. 276.

2. Verein, Coitus 2.

Glaucopterycen, Glaucopteryces.

Die Schwingen weißlichgrau, und graulichblau bandirt.

3198. Glaucopteryx Caesiata Schiff. Verz. Geo. L. 6. Hübn. Geo. 275.

3199. G. Cyanata Hübn. Geo. 319.

5. Stamm, Stirps V.

Petrophoren, Petrophorae.

Diese haben ziemlich breite Schwingflügel, deren Ende fast spitzig ist; ihre Senken aber sind kleinlich; beyderley steinähnlich gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Manchfärbige, Variae.

Die Schwingen mit abstechend zackigen Bandstreifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Chloroclysten, Chloroclystae.

Die Schwingen fast bandweise grau schattig gewässert, grün glänzend.

3200. Chloroclysta Miata Linn. Syst. Phal. 249. Coraciata Hübn. Geo. 278.

3201. C. Psittacata Schiff. Verz. Geo. L. 8. Hübn. Geo. 227.

2. Verein, Coitus 2.

Ischnopterices, Ischnopterices.

Die Flügel lang, desgleichen der Wanst.

3202. Ischnopterix Chlorosata. Cram. 397. H.

3. Verein, Coitus 3.

Amoeben, Amoebae.

Die Schwingen abwechslend gefärbt und bezeichnet; die Senken mehrfach schattig gesäumt.

3203. Amoebe Pectinata. Pectinaria Knoch. Beytr. I. Phal. 11. Miaria Schiff. Verz. Geo. M. 21. Hübn. Geo. 292.

3204. A. Olivata Schiff. Verz. Geo. L. 7. Hübn. Geo. 307.

3205. A. Ruptata Hübn. Geo. 295.

3206. A. Rubidata Schiff. Verz. Geo. M. 22. Hübn. Geo. 290.

3207. A. Berberata Schiff. Verz. Geo. M. 23. Hübn. Geo. 287.

3208. A. Derivata Schiff. Verz. Geo. M. 24. Hübn. Geo. 289.

3209. A. Badiata Schiff. Verz. Geo. L. 3. Hübn. Geo. 291.

4. Verein, Coitus 4.

Dysstromaten, Dysstromata.

Die Schwingen buntlich, fast verworren bandirt.

3210. Dysstroma Russata Schiff. Verz. Geo. M. 18. Centumnotata Fabr. Mant. Phal. 188. Hübn. Geo. 445. 305.

3211. D. Variata Schiff. Verz. Geo. K. 28. Hübn. Geo. 293. 380.

3212. D. Simulata Hübn. Geo. 345.

3213. D. Juniperata Linn. Syst. Phal. 261. Hübn. Geo. 294.

Zweyte Familie, Familia B.

Gewässerte, Undulatae.

Die Schwingen eckig bunt bandirt und dunkel gewellt; die Senken grau, weißlich gewässert.

1. Verein, Coitus 1.

Ochyrien, Ochyriae.

Die Schwingen eckig bandirt, blaß- und satt-färbig gestreift.

3214. Ochyria Ligustrata Schiff. Verz. Geo. M. 5. Hübn. Geo. 282.
3215. O. Munitata Hübn. Geo. 346.
3216. O. Aptata Hübn. Geo. 349.
3217. O. Quadrifasciata Clerc. Icon. 6. 4. Hübn. Geo. 284.
3218. O. Propugnata Hübn. Geo. 286.

2. Verein, Coitus 2.

Plemyrien, Plemyrie.

Die Schwingen mit einem Mittezeichen bemerkt, und wäßerig dunkel bandirt.

3219. Plemyria Gemmata Hübn. Geo. 283.
3220. P. Fluviata Hübn. Geo. 280. 281.

Dritte Familie, Familia C.

Richtige, Normales.

Die Schwingen großeckig bandirt, abstechend achatfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Onychien, Onychiae.

Die Schwingen mit einem Mittepunct bezeichnet, ansehnlich eckig bandirt.

3221. Onychia Peribolata Hübn. Geo. 471.
3222. O. Moeniata. Moeniaria Schiff. Verz. Geo. N. 1. Hübn. Geo. 298.

2. Verein, Coitus 2.

Pelurgen, Pelurgae.

Die Schwingen großzähnig bandirt, schattig lehmfärbig.

3223. Pelurga Comitata Linn. Syst. Phal. 247. Chenopodiata Schiff. Verz. Geo. M. 2. Hübn. Geo. 299.

3224. P. Sagittata Fabr. Ent. Phal. Comitata 254. Schiff. Verz. Geo. M. 3. Hübn. Geo. 310.

3225. P. Obeliscata Hübn. Geo. 296.

3. Verein, Coitus 3.

Eustromen, Eustromae.

Die Schwingen zierlich sammetbraun bandirt; und gefleckt.

3226. Eustroma Suffumata Schiff. Verz. Geo. M. 27. Hübn. Geo. 306.

3227. E. Prunata Linn. Syst. Phal, 250. Hübn. Geo. 304.

3228. E. Silaceata Schiff. Verz. Geo. M. 20. Hübn. Geo. 477. 478.

3229. E. Reticulata Schiff. Verz. Geo. N. 3. Hübn, Geo. 308.

Vierte Familie, Familia D.

Gelbe, Flavae.

Die Schwingen hellgelb, eckig düsterschattig bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Lygriden, Lygrides.

Die Schwingen röthlichgelb, größtentheils grauschattig.

3230. Lygris Pyropata Hübn. Geo. 328.

3231. L. Achatinata Hübn. Geo. 301. 408.

3232. L. Populata Linn. Syst. Phal. 244. Hübn. Geo. 300.

3233. L. Pyraliata Schiff. Verz. Geo. P. 1. Hübn. Geo. 302.

2. Verein, Coitus 2.

Euphyen, Euphyae.

Die Schwingen hellgelb, rostbraunschattig; die Senken weißlich.

3234. Euphia Diversilineata Hübn. Petr. flav. Diversilineata.

3235. E. Marmorata Hübn. Geo. 279.

3236. E. Fulvata Schiff. Verz. Geo. M. 4. Sociata. Fabr. Syst. Phal. 90. Hübn. Geo. 297.

Fünfte Familie, Familia E.

Weißlichgraue, Canae.

Die Schwingen weißlichgrau gefärbt, schwärzlichbraun bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Carsien, Carsiae.

Die Schwingen wellenstreifig und mit einem rostfärbigen Wisch bezeichnet.

3237. Carsia Plagiata Linn. Syst. Phal. 248. Hübn. Geo. 220.

3238. C. Sororiata Hübn. Geo. 355.

3239. C. Imbutata Hübn. Geo. 403.

2. Verein, Coitus 2.

Schistostegen, Schistostegae.

Die Schwingen und Senken oben schattig und blaß gestreift, unten schwärzlich gesent.

3240. Schistostege Nubilata Hübn. Geo. 215.

3241. S. Decussata. Decussaria Schiff. Verz. Geo. H. 7. H. Geo. 213.

3242. S. Exalbata Hübn. Geo. 474—476.

3243. S. Dealbata Linn. Syst. Phal. 256. Hübn. Geo. 214.

3. Verein, Coitus 3.

Gypsochroen, Gypsochroae.

Die Flügel alle weiß, und ganz unbezeichnet.

3244. Gypsochroa Niveata. Nivearia Schiff. Verz. Geo. O. 4. Hübn. Geo. 217.
3245. G. Illibata Schiff. Verz. Geo. O. 5. Hübn. Geo. 207.
3246. G. Renitidata Hübn. Geo. 485. 486.

4. Verein, Coitus 4.

Lithoſtegen, Lithostegae.

Die Schwingen mit einer dunklen Linie bezeichnet.

3247. Lithostege Dublicata. Duplicaria Hübn. Geo. 208.
3248. L. Griseata Schiff. Verz. Geo. O. 2. Hübn. Geo. 216.
3249. L. Cingulata Hübn. Geo. 209.

5. Verein, Coitus 5.

Conchien, Conchiae.

Die Schwingen ſehr ſchief bandirt und glänzend muſchelweiß gefärbt.

3250. Conchia Mundata. Mundataria Cram. 400. H. Hübn. Geo. 375.
3251. C. Frosinata. Frosinaria Stoll. 36. 7.
3252. C. Nitidulata. Nitidula Cram. 399. N.

6. Verein, Coitus 6.

Macroſomaten, Macrosomata.

Die Schwingen mit einem unförmlichen Mittefleck beſetzt; der Wanſt ſehr ſchlang.

3253. Macrosoma Tipulata Hübn. Zutr. 21. 22.

Sechste Familie, Familia F.

Liniirte, Lineatae.

Die Schwingen mit wenigen zarten Streifen überzogen.

1. Verein, Coitus 1.

Scotopterycen, Scotopteryces.

Die Schwingen schattig gefärbt, düster und bleichlich gestreift.

3254. Scotopteryx Tenebrata Hübn. Geo. 330.

2. Verein, Coitus 2.

Lithinen, Lithinae.

Die Schwingen fast bandweise in drey Felder getheilt.

3255. Lithina Arenaceata. Arenacearia Schiff. Verz. Geo. E. 5. Hübn. Geo. 114.

3256. L. Petrata. Petraria Hübn. Geo. 113.

3. Verein, Coitus 3.

Ortholithen, Ortholithae.

Die Schwingen mit mehreren theils dunklen, theils hellen Linien überzogen.

3257. Ortholitha Palumbata. Palumbaria Schiff. Verz. Geo. E. 1. Hübn. Geo. 221.

3258. O. Coarctata. Coarctaria Schiff. Verz. Geo. E. 3. Hübn. Geo. 219.

3259. O. Bistrigata Hübn. Zutr. 111. 112.

3260. O. Coassata. Duplicata Hübn. Geo. 491.

4. Verein, Coitus 4.

Mesotypen, Mesotypae.

Die Schwingen mit einem Mittepuncte und vielen Linien bandweise bezeichnet.

3261. Mesotype Parallelaria. Borkh. Geo. 22. Vespertaria Schiff. Verz. Geo. E. 4. Hübn. Geo. 226.

3262. M. Lithoxylata Hübn. Geo. 218.

3263. M. Chenopodiata Linn. Syst. Phal. 246. Mensuraria Schiff. Verz. Geo. L. 2. Hübn. Geo. 193.

3264. M. Lineolata Schiff. Verz. Geo. E. 1. Hübn. Geo. 311.

3265. M. Polygrammata Hübn. Geo. 277.

Sechste Horde, Phalanx sexta.

Zünsler, Pyralides.

Ihr Rüssel ist ziemlich lang ihre Streichler sind ansehnlich, ihre Augen groß. Die Flügel sind beyderley ansehnlich, die Schwingen jedoch länger als die Senken; die Stützen besonders aber die Füße sehr lang, desgleichen auch der Wanst.

Erste Rotte, Tribus prima.

Spannerförmige, Geometriformes.

Die Streichler schlang; die Ohren an jedem Gliedgen mit kurzen Börstgen besetzt. Die Flügel ziemlich breit.

1. Stamm, Stirps I.

Salien, Saliae.

Ihre Schwingflügel sind mit einem Mittefleckgen bezeichnet, beyderley übrigens fast gleich angelegt und gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Dubiae.

Die Streichler aufgebogen. Die Flügel ebenrändig und gleichfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Aethien, Aethiae.

Die Flügel graulichgrün; die Schwingen mit zweyen, die Senken mit einem hellen Streifen bezeichnet.

3266. Aethia Emortualis Schiff. Verz. Pyr. A. 12. Hübn. Pyr. 1. Olivaria Borkh. Geo. 3. b.

3267. A. Circulalis. Circulata Cram. 399. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Wahrscheinliche, Probabiles.

Die Flügel fast ebenrändig, mit einer schlängligen dunklen Bogenlinie und einem blassen Durchzugsstreifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Lesmonen, Lesmonae.

Die Flügel nächst dem Franzenrande mit einem geraden blassen Strich bemerkt.

3268. Lesmone Pelidnalis Hübn. Zutr. 169. 170.

2. Verein, Coitus 2.

Anticarsien, Anticarsiae.

Die Schwingen fast schnäblig am Ende, mit einer scharfen dunklen Linie und Puncten durch beyderley Flügel.

3269. Anticarsia Gemmatalis Hübn. Zutr. 153. 154.

3270. A. Obliqualis.

3. Verein, Coitus 3.

Oxidercien, Oxiderciae.

Die Flügel mit augenähnlichen durchsichtigen Flecken geziert.

3271. Oxidercia Toxealis. Toxea Cram. 358. G. H.

Dritte Familie, Familia C.

Vorzügliche, Egregiae.

Die Flügel ausserhalb mit hellen Kreisstreifen bezeichnet und buntschattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Antiblemmen, Antiblemmae.

Die Flügel alle mit einem kaum deutlichen Mittezeichen und einer Linie bemerkt.

3272. Antiblemma Acclinalis Hübn. Zutr. 355. 356.
3273. A. Comitalis.
3274. A. Octalis Hübn. Zutr. 281. 282.

2. Verein, Coitus 2.

Euglyphiden, Euglyphides.

Die Flügel beyderley deutlich gekerbt, düstern bezeichnet.

3275. Euglyphis Procopialis. Procopia Stoll. 12. 9.

3. Verein, Coitus 3.

Antapistiden, Antapistides.

Die Flügel ebenrändig, die Schwingen mit einem weißen Mittezeichen; beyderley wellenstreifig und gemischt gefärbt.

3276. Antapistis Mixtalis.

4. Verein, Coitus 4.

Euclystien, Euclystes.

Die Flügel eckig und buchtig; mit ziemlich ansehnlichen Mittezeichen, Wellenstrichen und Farbenwolken geziert.

3277. Euclystis Centurialis Hübn. Zutr. 295. 296.
3278. E. Cynaralis. Cynara Cram. 15. C. D. Hübn. Sal. egr. Cynaralis.

5. Verein, Coitus 5.

Sylectren, Sylectrae.

Die Flügel eckig und zähnig, bunt gemischt und dunkel gestreift.

3279. Sylectra Congemalis Hübn. Zutr. 309. 310.

3280. S. Mirandalis. Erycata Cram. 370. E. 287. D.
Hübn. Sal. egr. Mirandalis.

Vierte Familie, Familia D.
Wunderbare, Mirabiles.

Ihre Streichler, auch andere Glieder, sind sonderbar zierlich gestaltet und bekleidet.

1. Verein, Coitus 1.
Megatomiden, Megatomides.

Die Streichler sehr lang, rückwärts gebogen. Die Flügel mit Wellenlinien bezeichnet.

3281. Megatomis Mimalis Hübn. Sal, mir. Mimalis.
3282. M. Effictalis.

2. Verein, Coitus 2.
Acigonen, Acigonae.

Die Flügel fast spitzeckig und mit ansehnlichen Mittelfleckgen bezeichnet.

3283. Acigona Mantalis. Manto Cram. 10. F. Mantata Fabr. Ent. Phal. 133.
3284. A. Cicatricalis.

3. Verein, Coitus 3.
Metalectren, Metalectrae.

Die Schwingflügel am Ende verkürzt; beyderley schwarz bezeichnet.

3285. Metalectra Praecisalis Hübn. Zutr. 367. 368.
3286. M. Neglectalis. Fatme Stoll. 36. 8.

4. Verein, Coitus 4.
Palthen, Palthes.

Die Schwingen lang und eckig, die Senken kurz und eben; beyderley bogig bezeichnet.

3287. Palthis Angulalis Hübn. Pyr. 107.

Fünfte Familie, Familia E.

Liebliche, Venustulae.

Die Schwingen stumpfeckig, die Senken kleinkerbig; beyderley zierlich gestreift und bunt angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Pangrapten, Pangraptae.

Die Flügel unten fast deutlicher bezeichnet als oben.

3288. Pangrapta Decoralis Hübn. Zutr. 93. 94.
3289. P. Resistricalis. Resistrix Cram. 371. N.

2. Stamm, Stirps II.

Herpyzonen, Herpyzontes.

Die Ohren fast federförmig; die Flügel ebenrändig; die Schwingen fast spitzig am Ende, und vorzüglicher bezeichnet als die Senken.

Erste Familie, Familia A.

Krummschnauzige, Curvipalpes.

Die Streichler mäßig, krumm; die Schwingen streifig und schattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Bomolochen, Bomolochae.

Die Schwingen achatähnlich, buntfärbig; die Senken dunkelgrau.

3290. Bomolocha Crassalis Fabr. Mant. Phal. 273. Hübn. Pyr. 12.
3291. B. Antiqualis Hübn. Pyr. 152.
3292. B. Terriculalis Hübn. Pyr. 163.

2. Verein, Coitus 2.

Colobochylen, Colobochylae.

Die Schwingen mit bunten Linien bezeichnet und schattig gefärbt.

3293. Colobochyla Salicalis Schiff. Verz. Pyr. B. 16. Hübn. Pyr. 3.

3. Verein, Coitus 3.

Ophiuchen, Ophiuchae.

Die Schwingen halb glänzend gefärbt, übrigens schattig gestreift.

3294. Ophiuche Lividalis Hübn. Pyr. 186. 11.

4. Verein, Coitus 4.

Paracolacen, Paracolaces.

Die Schwingen mit einem Mittemönden und dreyerley Linien dunkel bezeichnet.

3295. Paracolax Barbalis Linn. Syst. Phal. 329. Tarsicrinalis Knoch. Beytr. II. Phal. 11. Hübn. Pyr. 5.

3296. P. Tarsiplumalis Hübn. Pyr. 125.

3297. P. Grisealis Schiff. Verz. Pyr. 11. Hübn. Pyr. 4.

3298. P. Derivalis. Glaucinalis Schiff. Verz. Pyr. 10. Hübn. Pyr. 19.

Zweyte Familie, Familia B.

Streckschnauzige, Rectipalpes.

Die Streichler gerade ausgestreckt, die Aerme der Männer an den Lungern mit einem Büschel federähnlicher Haare besetzt, wie bey dem vorigen Vereine.

1. Verein, Coitus 1.

Pechipoginen, Pechipogines.

Die Schwingen haben am äußersten Streif einen blassen.

3299. Pechipogo Plumigeralis. Barbalis Hübn. Pyr. 18.
3300. P. Pectitalis Hübn. Pyr. 122.

2. Verein, Coitus 2.

Macrocheilonen, Macrocheilones.

Die Streichler sehr lang, ihre Schnauzen stumpf. Die Schwingen mit dunkeln Linien bezeichnet.

3301. Macrochilo Tentaculalis. Tentacularis Linn. Syst. Phal. 330. Hübn. Pyr. 6.
3302. M. Proboscidalis Linn. Syst. Phal. 331. Ensalis Fabr. Ent. Phal. 344. Hübn. Pyr. 7.
3303. M. Rusticalis Hübn. Zutr. 375. 376.
3304. M. Cribralis Hübn. Pyr. 2.

3. Verein, Coitus 3.

Hypenen, Hypenae.

Die Schwingen gewäßert, schattig bandirt, vor der Spitze blaß.

3305. Hypena Palpalis Hübn. Pyr. 9.
3306. H. Decimalis Schiff. Verz. Pyr. A. 5. Crassalis Hübn. Pyr. 8.
3307. H. Obsitalis Hübn. Pyr. 179. 165. 164.
3308. H. Rostralis Linn. Syst. Phal. 332. Tinealis Schiff. Verz. Pyr. 4. Hübn. Pyr. 10.

4. Verein, Coitus 4.

Schrankien, Schrankiae.

Die Schwingen blaßfärbig, schattig bandirt.

3309. Schrankia Taenialis Hübn. Pyr. 151.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Verstaltete, Difformes.

Ihre Gestalt ist von der der gemeinen Zünsler sehr abweichend und ähnlet den Spinnern und Eulen.

I. Stamm, Stirps I.

Idien, Idiae.

Die Streichler fast abgeneigt, haarig; die Ohren fast gefiedert. Die Flügel in allem sehr unterschieden.

Erste Familie, Familia A.

Seltsame, Monstrosae.

Sie haben Schnäuzgen, ober den Regen der Streichler. Ihre Schwingflügel sind gemeinförmig, aber sehr ändernd angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Cynäden, Cynaedae.

Die Deckgen sehr lang; die Flügel am Haarrande mit langen Schüppgen zahnförmig besetzt, sehr zackig gestricht.

3310. Cynaeda Dentalis Schiff. Verz. Pyr. A. 14. Ramalis Fabr. Ent. Phal. 378. Hübn. Pyr. 25.

3311. C. Radiatalis Hübn. Pyr. 134.

Zweyte Familie, Familia B.

Trügliche, Fallaces.

Die Streichler, desgleichen auch die Flügel ungleichförmig, fast spinnerähnlich.

1. Verein, Coitus 1.

Epizeuxen, Epizeuxes.

Die Flügel rundlich; die Schwingen mit einem mondähnlichen Mittefleck und mehrern Wellenlinien bezeichnet.

3312. Epizeuxis Calvarialis Schiff. Verz. Pyr. A. 15. Hübn. Pyr. 23.

3313. E. Aemulalis. Hübn. Idi. dol. Aemula.

3314. E. Lituralis. Hübn. Zutr. 19. 20.

3315. E. Melanalis. Melanea Cram. 357. E.

2. Verein, Coitus 2.

Eucliten, Euclitae.

Die Schwingen mit weißen Wellenlinien und einfachen schwarzen Unterscheidungen bezeichnet.

3316. Euclita Pinguinalis Linn. Syst. Phal. 336. Hübn. Pyr. 24.

3317. E. Incalidalis. Glaucinalis Hübn. Pyr. 127.

3318. E. Ramalis Hübn. Pyr. 92.

3319. E. Nudalis Hübn. Pyr. 90.

3320. E. Interpunctalis Hübn. Pyr. 128.

3. Verein, Coitus 3.

Synaphen, Synaphae.

Sie gleichen ihrer Gestalt nach den Spinnern vorzüglichst. Ihre Schwingen sind schmal und mit einem auswärts blaß begrenzten Mittebande angelegt.

3321. Synaphe Bombycalis Schiff. Verz. Pyr. A. 6. Hübn. Pyr. 20. 124.

3322. S. Netricalis. Moldavica Esp. Bom. 86. 1. Hübn. Pyr. 158.

3323. S. Connectalis Hübn. Pyr. 91.

3324. S. Angustalis et Curtalis Schiff. Verz. Pyr. A. 7. 8. Hübn. Pyr. 21. 123.

3325. S. Renalis Hübn. Pyr. 157.

3326. S. Punctalis Schiff. Verz. Pyr. B. 25. Hübn. Pyr. 140.

3327. S. Comparalis Hübn. Pyr. 126.

3328. S. Suppandalis Hübn. Pyr. 187 — 190.

3329. S. Corticalis Schiff. Verz. Pyr. B. 22. Hübn. Pyr. 155.

4. Verein, Coitus 4.

Micropoden, Micropodes.

Die Flügel innen hell, aussen dunkel gefärbt.

3330. Micropos Longalis Hübn. Zutr. 131. 132.

Dritte Familie, Familia C.
Glänzende, Nitidae.

Die Schwingen glänzend glatt, schönfärbig; die Senken schlechtfärbig.

1. Verein, Coitus 1.
Hypsopygien, Hypsopygiae,

Die Schwingen mit zwey blassen Streifen, welche, dem Haarrande zu, sehr geschmälert sind.

3331. Hypsopygia Cuprealis Hübn. Pyr. 153.
3332. H. Nitidalis Fabr. Ent. Phal. 372 et Strigalis 406. Hübn. Pyr. 98.
3333. H. Lucidalis Hübn. Pyr. 161.
3334. H. Rubidalis Schiff. Verz. Pyr. B. 36. Hübn. Pyr. 96.
3335. H. Farinalis Linn. Syst. Phal. 327. Hübn. Pyr. 95.
3336. H. Regalis Schiff. Verz. Pyr. B. 37. Hübn. Pyr. 105.
3337. H. Fimbrialis Schiff. Verz. Pyr. B. 38. Costalis Fabr. Syst. Phal. 132. Hübn. Pyr. 97.

2. Verein, Coitus 2.
Agroteren, Agroterae.

Die Schwingen bandweis bunt angelegt und braunzähnig weiß gesäumt.

3338. Agrotera Flammealis Schiff. Verz. Pyr. B. 35. Hübn. Pyr. 99.
3339. A. Nemoralis Schiff. Verz. Pyr. B. 34. Hübn. Pyr. 100.

3. Verein, Coitus 3.
Diasemien, Diasemiae.

Die Flügel beyderley mit zierlichen weißen Zügen bezeichnet.

3340. Diasemia Literalis Schiff. Verz. Pyr. B. 15. Hübn. Pyr. 86.

2. Stamm, Stirps II.

Heliacen, Heliacae.

Sie sind fast Eulen gleichend, ihr Leib ist sammt den Flügeln unterschieden buntfärbig; die Schwingen aber bunter als die Senken.

Erste Familie, Familia A.

Purrothe, Purpureae.

Die Schwingen purroth gefärbt, rostgelb gefleckt, die Senken schwarz, weiß bandirt.

1. Verein, Coitus 1.

Hämatien, Haematiae.

Die Flügel beyderley blutroth gefärbt, rauschgelb gefleckt und schwarz bemerkt.

3341. Haematia Phoenicealis Hübn. Zutr. 115. 116.

2. Verein, Coitus 2.

Syllythrien, Syllythriae.

Die Schwingen purroth, sattgelb gestreift; die Senken grau angelegt.

3342. Syllythria Haematalis Hübn. Pyr. 178.

3343. S. Sanguinalis Linn. Syst. Phal. 339. Hübn. Pyr. 33.

3. Verein, Coitus 3.

Porphyriten, Porphyriten.

Die Schwingen porphyrroth, pigmentgelb gefleckt; die Senken schwarz, weiß bandirt.

3344. Porphyritis Purpuralis Linn. Syst. Phal. 342. Hübn. Pyr. 113. 35. 34.

3345. P. Punicealis Schiff. Verz. Pyr. B. 49. Porphyralis Hübn. Pyr. 36.

3346. P. Porphyralis Schiff. Verz. Pyr. B. 50. Coccinalis Hübn. Pyr. 37.

Zweyte Familie, Familia B.

Düstere, Fuscae.

Die Schwingen schattig, elzbeeren- oder olivenbraun gefärbt.

1. Verein, Coitus 1.

Titanionen, Titaniones.

Die Schwingen braun und grauwechselnd gefärbt und mit verkürzten blassen Streifen angelegt; die Senken schwarzweiß bandirt.

3347. Titanio Normalis Hübn. Pyr. 41. 111.
3348. T. Comitalis Hübn. Pyr. 180.

2. Verein, Coitus 2.

Leimonien, Leimoniae.

Die Schwingen olivenfärbig, schattig bandirt, auch schwarz bezeichnet; die Senken schwarz bandirt.

3349. Leimonia Scutulalis Hübn. Pyr. 156.
3350. L. Sordidalis Hübn. Pyr. 40.
3351. L. Cespitalis Schiff. Verz. Pyr. B. 32. Hübn. Pyr. 39.
3352. L. Floralis Hübn. Pyr. 142.

3. Verein, Coitus 3.

Psammoten, Psammotes.

Alle Flügel nur bandweise dunkel besprengt.

3353. Psamotis Pulveralis Hübn. Pyr. 109.

Dritte Familie, Familia C.

Schwarze, Nigrae.

Die Flügel alle schwarz, weiß bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Pyrausten, Pyraustae.

Die Flügel mit einem weißen Bändgen gemeinschaftlich besetzt.

3354. Pyrausta Fascialis Hübn. Pyr. 31.
3355. P. Cingulalis Schiff. Verz. Pyr. B. 31. Hübn. Pyr. 30.
3356. P. Anguinalis Hübn. Pyr. 32.

2. Verein, Coitus 2.

Eurrhypiden, Eurrhypides.

Die Flügel beyderley weiß gefleckt.

3357. Eurrhypis Pollinalis Schiff. Verz. Pyr. B. 44. Hübn. Pyr. 29.
3358. E. Sartalis Hübn. Pyr. 173. 174.

3. Verein, Coitus 3.

Alypien, Alypiae.

Die Flügel glänzend schwarz bekleidet, ansehnlich bleich gefleckt; die Stützen buntfärbig.

3359. Alypia Octomaculalis Hübn. Zutr. 119. 120.
3360. A. Quadriguttalis. Octomaculata Abb. Lep. 44. Albomaculata Cram. 345. C.

Vierte Familie, Familia D.

Grüne, Virides.

Die Schwingen glänzend grün gefleckt, schwarz bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Metaxmesten, Metaxmestae.

Die Streichler rauhharig. Die Schwingen schwarz bandirt und grau bezeichnet.

3361. Metaxmeste Rupicolalis. Rupicola Schiff. Verz. Noc. W. 9. Hübn. Pyr. 139.
3362. M. Holosericealis Hübn. Pyr. 112.
3363. M. Phrygialis Hübn. Pyr. 42.
3364. M. Sericealis Hübn. Pyr. 43.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Gemeine, Vulgares.

Ihre Flügel sind beyderley ansehnlich. Die Schwingen ziemlich schmal und lang, die Senken breit und kurz, auch ihre Stützen sind schlang.

1. Stamm, Stirps I.

Palpiten, Palpitae.

Sie haben mit den Spannern mancherley Aehnlichkeiten. Die Streichler sind mäßig, vorstehend, ihre Schnauzen spitzig. Die Schwingen aussen schief geründet, alle Stützen sehr lang.

Erste Familie, Familia A.

Zweydeutige, Ambiguae.

Die Schwingen deutlich ausgezeichnet und gefärbt; die Senken aber blaß und trüb.

1. Verein, Coitus 1.

Loxostegen, Loxostegae.

Die Flügel eulenähnlich angelegt; die Schwingen grünlichgrau gestreift.

3365. Loxostege Aeruginalis Hübn. Pyr. 133.
3366. L. Olivalis Schiff. Verz. Pyr. B. 21. Hübn. Pyr. 162.
3367. L. Desertalis Hübn. Pyr. 171.
3368. L Clathralis Hübn. Pyr. 168.

2. Verein, Coitus 2.

Panstegien, Panstegiae.

Die Schwingen olivenfärbig, mit einem blassen geschlängelten Streif angelegt.

3369. Panstegia Opacalis Hübn. Pyr. 169. 170.
3370. P. Aerealis Hübn. Pyr. 44.

3. Verein, Coitus 3.

Semnien, Semniae.

Die Schwingen sammtbraun, die Senken goldgelb; beyderley glänzend.

3371. Semnia Auritalis Hübn. Zutr. 361. 362.

4. Verein, Coitus 4.

Uresiphiten, Uresiphitae.

Die Schwingen trübfärbig angelegt, und mit schwarzen Mittezeichen bemerkt.

3372. Uresiphita Rusticalis. Limbalis Schiff. Verz. Pyr. B. 20. Hübn. Pyr. 121.
3373. U. Villicalis. Polygonalis Hübn. Pyr. 67.
3374. U. Nebulalis Hübn. Pyr. 51.
3375. U. Polygonalis Schiff. Verz. Pyr. B. 9. Umbralis Hübn. Pyr. 52.
3376. U. Prunalis. Schiff. Verz. Pyr. B. 11. Leucophaealis Hübn. Pyr. 77.
3377. U. Alpinalis Schiff. Verz. Pyr. B. 24. Hübn. Pyr. 175. 176.
3378. U. Sticticalis Linn. Syst. Phal. 340. Fuscalis Hübn. Pyr. 45.
3379. U. Squalidalis Hübn. Pyr. 144.
3380. U. Elutalis Schiff. Verz. Pyr. B. 10. Albidalis Hübn. Pyr. 118.

5. Verein, Coitus 5.

Evergesten, Evergestes.

Die Schwingen gelb gefärbt, mit einem schwarzen Mittezeichen bemerkt und dunkel geründet.

3381. Evergestis Limbalis. Limbata Linn. Syst. Phal. 273. Sericealis Schiff. Verz. Pyr. B. 18. Hübn. Pyr. 56.

3382. E. Margaritalis Schiff. Verz. Pyr. B. 29. Erucalis Hübn. Pyr. 55.

3383. E. Vespertalis Hübn. Pyr. 159.

6. Verein, Coitus 6.

Mesographen, Mesographae.

Die Schwingen blaß gefärbt; mit dunklen Zeichen und Strichen bemerkt.

3384. Mesographe Triquetralis Frumentalis Linn. Syst. Phal. 337. Schiff. Verz. Pyr. B. 3. Repandalis Hübn. Pyr. 64.

3385. M. Stramentalis. Elutalis Hübn. Pyr. 62.

3386. M. Praetextalis. Politalis Hübn. Pyr. 61.

3387. M. Institalis Hübn. Pyr. 182.

3388. M. Forficalis Linn. Syst. Phal. 334. Hübn. Pyr. 58.

3389. M. Politalis Schiff. Verz. Pyr. B. 4. Hübn. Pyr. 136. 183.

3390. M. Asinalis Hübn. Pyr. 185.

7. Verein, Coitus 7.

Tholerien, Tholeriae.

Die Schwingen verworren bezeichnet und trüb dunkel gefärbt.

3391. Tholeria Illiberalis Hübn. Zutr. 349. 350.

8. Verein, Coitus 8.

Diasticten, Diastictes.

Die Schwingen mit durchsichtigen blassen Fleckgen besetzt.

3392. Diastictis Argyralis Hübn. Zutr. 113. 114.

Zweyte Familie, Familia B.

Zärtliche, Tenerae.

Die Flügel sehr zart, fast durchsichtig, und mit Fleckgen oder Linien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Hapalien, Hapaliae.

Die Schwingen blaß gefärbt, mit Eulenfleckgen bemerkt; die Senken trüblich.

3393. Hapalia Fulvalis Hübn. Pyr. 147.
3394. H. Trinalis Schiff. Verz. Pyr. B. 47. Hübn. Pyr. 68.
3395. H. Flavalis Schiff. Verz. Pyr. B. 7. Hübn. Pyr. 69.
3396. H. Illibalis Hübn. Zutr. 95. 96.
3397. H. Hyalinalis Hübn. Pyr. 74.
3398. H. Lutealis Hübn. Pyr. 145.

2. Verein, Coitus 2.

Epicorsien, Epicorsiae.

Die Schwingen mit einem dunklen Mondgen bezeichnet.

3399. Epicorsia Nyctemeralis Hübn. Pyr. 148.
3400. E. Iridialis. Verticalis Schiff. Verz. Pyr. B. 1. Hübn. Pyr. 57.
3401. E. Crocotolalis. Ochrealis Hübn. Pyr. 146.
3402. E. Repandalis. Schiff. Verz. Pyr. B. 2. Pallidalis Hübn. Pyr 115.
3403. E. Pandalis. Repandata Fabr. Mant. Phal. 245. Verbascalis Hübn. Pyr. 59.

3404. E. Verticalis Linn. Syst. Phal. 335. Ochrealis Schiff. Verz. Pyr. B. 28. Hübn. Pyr. 72. 73.

3405. E. Cilialis Hübn. Pyr. 119.

3406. E. Mellinalis Hübn. Zutr. 137. 138.

3. Verein, Coitus 3.

Sylepten, Syleptae.

Die Flügel klein, gezeichnet, fast farbenspielend.

3407. Sylepta Amandalis. Amando Cram. 247. E?

3408. S. Incomptalis Hübn. Zutr. 285. 286.

4. Verein, Coitus 4.

Sitochroen, Sitochroae.

Die Schwingen hellgelb, fast zeichenlos; die Senken gelblich.

3409. Sitochroa Palealis Schiff. Verz. Pyr. B. 27. Hübn. Pyr. 70.

3410. S. Selenalis Hübn. Pyr. 177.

3411. S. Sulphuralis Hübn. Pyr. 166. 167.

3412. S. Gilvalis Hübn. Pyr. 154.

3413. S. Crocealis Hübn. Pyr. 71.

Dritte Familie, Familia C.

Schlingstreifige, Repandatae.

Die Flügel mit einem dunklen Mondgen und vor- wie rück-wärtsgekrümmten Streifen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Ecpyrrhorrhoen, Ecpyrrhorrhoae.

Die Flügel röthlichgelb, schattig und wellenstreifig.

3414. Ecpyrrhorrhoë Rubricalis Hübn. Pyr. 106.

3415. E. Rubiginalis Hübn. Pyr. 79.

3416. E. Verbascalis Schiff. Verz. Pyr. B. 5. Arcualis Hübn. Pyr. 80.

2. Verein, Coitus 2.

Perinephelen, Perinephelae.

Die Flügel beyderley zwischen den Streifen wolkig angelegt.

3417. Perinephela Glabralis Hübn. Pyr. 117.
3418. P. Lancealis Schiff. Pyr. B. 6. Glabralis Hübn. Pyr. 65.
3419. P. Fuscalis Schiff. Verz. Pyr. B. 8. Cineralis Hübn. Pyr. 66.
3420. P. Nubilalis Hübn. Pyr. 94.
3421. P. Silacealis Hübn. Pyr. 116.

3. Verein, Coitus 3.

Glaphyrien, Glaphyriae.

Alle Flügel blaß gefärbt und gleichend deutlich bezeichnet.

3422. Glaphyria Perlucidalis Hübn. Pyr. 143.
3423. G. Sesquistrialis Hübn. Zutr. 369. 370.

4. Verein, Coitus 4.

Ochlien, Ochliae.

Die Flügel mit unterbrochenen dunklen Linien und schattigen Streifen angelegt.

3424. Ochlia Cerialis Cram. 399. M.
3425. O. Exigualis Hübn. Zutr. 333. 334.

5. Verein, Coitus 5.

Epipagiden, Epipagides.

Die Flügel mit durchsichtigen Fleckgen und gelben Streifen angelegt.

3426. Epipagis Fenestralis Hübn. Pyr. 60.
3427. E. Corrivalis. Corope Cram. 357. I.
3428. E. Splendidalis Cram. 371. L.

Vierte Familie, Familia D.

Einfärbige, Unicolores.

Beyderley Flügel gleichfärbig, ohne Zeichen und Streifen.

1. Verein, Coitus 1.

Margaronia, Margaroniae.

Die Flügel beyderley perlfärbig.

3429. Margaronia Unionalis Hübn. Palp. norm. Unionalis.
2430. M. Congradalis. Polita Cram. 120. A.
3431. M. Virginalis. Flegia Cram. 140. D. Unionalis. Hübn. Pyr. 132.
3432. M. Canastralis. Ausonia Cram. 140. C.

2. Verein, Coitus 2.

Homochroen, Homochroae.

Die Flügel beyderley grau gefärbt.

3433. Homochroa Aenealis Schiff. Verz. Pyr. B. 26. Rufimitralis Hübn. Pyr. 120.
3434. H. Mitralis. Aenealis Hübn. Pyr. 46.
3435. H. Furvalis Hübn. Pyr. 53.
3436. H. Margaritalis Hübn. Pyr. 48.

3. Verein, Coitus 3.

Epascestrien, Epascestriae.

Die Schwingen mit blassen Flecken angelegt.

3437. Epascestria Quadripunctalis Schiff. Verz. Pyr. B. 43. Hübn. Pyr. 76.
3438. E. Pustulalis Hübn. Pyr. 191. 192.

Fünfte Familie, Familia E.

Edle, Nobiles.

Die Flügel beyderley gleichfärbig und gleichend zierlich angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Eudiopten, Eudioptes.

Die Flügel im innern Raum bis nahe den außern Rändern fast durchsichtig und perlweiß.

3439. Eudioptis Lucernalis. Marginalis Cram. 371. D. Hübn. Pyr. 108.

3440. E. Lucidalis Hübn. Zutr. 331. 332.

2. Verein, Coitus 2.

Diaphanien, Diaphaniae.

Die Flügel im innern Raume hornähnlich durchsichtig.

3441. Diaphania Vitralis. Nitidalis Cram. 371. F. Hyalinata Linn. Syst. Phal. 279? Hübn. Zutr. 101. 102.

3. Verein, Coitus 3.

Phlyctänien, Phlyctaeniae.

Die Flügel alle voll perlfärbiger Fleckgen.

3442. Phlyctaenia Thyralis. Thyres Cram. 263. C.

3443. P. Sambucalis Schiff. Verz. Pyr. B. 14. Hübn. Pyr. 81.

4. Verein, Coitus 5.

Caloptychien, Caloptychiae.

Die Flügel braun, bunt und perlweiß gestreift.

3444. Caloptychia Chrysealis Stoll. 27. 5.

3445. C. Contigualis. Margaritalis Cram. 367. K.

5. Verein, Coitus 5.

Ostrinien, Ostriniae.

Die Flügel purroth gefärbt, hellgelb gefeldet und befränzt.

3446. Ostrinia Palustralis Carneola Esp. Noc. 47. 8. Hubn. Pyr. 129. 130.

6. Verein, Coitus 6.

Ananien, Ananiae.

Die Flügel alle schwarz, ansehnlich hell gefleckt.

3447. Anania Guttalis Schiff. Verz. Pyr. B. 45. Atralis Fabr. Ent. Phal. 422. Octomaculata Linn. Mant. 540. Hübn. Pyr. 75.

3448. A. Luctualis. Unigutta Esp. Noc. 104. 1. 2. Hübn. Pyr. 88.

3449. A. Funeralis Hübn. Pyr. 103.

3450. A. Quinqualis. Florella Cram. 348. L. Hübn. Zutr. 351. 352.

7. Verein, Coitus 7.

Eurrhyparen, Eurrhyparae.

Der Leib gelb; die Flügel weiß, dunkel gefleckt.

3451. Urticalis. Eurrhypara Schiff. Verz. Pyr. B. 12. Urticata Linn. Syst. Phal. 272. Hübn. Pyr. 78.

Sechste Familie, Familia F.

Gemerkte, Notatae.

Die Flügel mit zierlichen Zeichen bemerkt, schattig gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Hymenien, Hymeniae.

Die Flügel mit fast durchsichtigen weißen Streifen bezeichnet.

3452. Hymenia Perspectalis Hübn. Pyr. 101.
2453. H. Diffascialis. Fascialis. Cram. 398. O.

2. Verein, Coitus 2.

Lamprosemen, Lamprosemae.

Die Schwingen durchsichtig weiß bemerkt und dunkel, auch blaß gestreift.

3454. Lamprosema Lunulalis Hübn. Zutr. 303. 304.

2. Stamm, Stirps II.

Elophilen, Elophilae.

Sie haben wie mehrere der Zünsler zwey ungleiche Paare von Schnauzen an ihren Streichlern. Ihre Flügel sind wie ihr Leib weiß, aber schwarz bezeichnet.

Erste Familie, Familia A.

Streifige, Strigatae.

Die Flügel gestreift, vorzüglich die Schwingen.

1. Verein, Coitus 1.

Lypotigriden, Lypotigrides.

Die Schwingen mit breiten schwarzen Streifen angelegt; die Senken nur am Rande schwarz gefleckt.

3455. Lypotigris Reginalis Cram. 372. C.

2. Verein, Coitus 2.

Zebronien, Zebroniae.

Alle Flügel zierlich schwarz gestreift.

3456. Zebronia Foederalis. Phenice Cram. 382. G.
3457. Z. Strigialis Stoll. 12. 7.
3458. Z. Perspicalis Hübn. Palp. norm. Perspicalis.

3. Verein, Coitus 3.

Parapoyngen, Parapoynges.

Die Schwingen mit einem schwarzen Mittezeichen und mehreren düstern Streifgen bemerkt; die Senken desgleichen.

3459. Parapoynx Albargentalis. Argentalis Cram. 371. M.
3460. P. Nivealis Schiff. Verz. Pyr. B. 46. Candidata Fabr. Mant. Phal. 253. Hübn. Pyr. 141.
3461. P. Stratiotalis Schiff. Verz. Pyr. B. 23. Stratiotata Linn. Syst. Phal. 276. Hübn. Pyr. 87.
3462. P. Suppandalis Hübn. Pyr. 187.—190.

4. Verein, Coitus 4.

Oeobien, Oeobiae.

Die Schwingen mit schwarzen Mittezeichen und grauen Schattenstreifen bezeichnet.

3463. Oebia Numeralis Hübn. Pyr. 89.
3464. O. Undulalis Hübn. Pyr. 93.

Zweyte Familie, Familia B.

Geschmückte, Ornatae.

Die Flügel beyderley mit sehr zierlich geschlungenen schwarzen Linien angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Nymphulen, Nymphulae.

Die Flügel blos mit fast parallelen Zügen bezeichnet.

3465. Nymphula Potamogalis. Potamogata Linn. Syst. Phal. 275. Hübn. Pyr. 82.

2. Verein, Coitus 2.

Nausinoen, Nausinoae.

Die Flügel mit rostgelben Binden zwischen den schwarzen Linien angelegt und daher fast nur weiß gefleckt scheinend.

3466. Nausinoë Neptalis. Neptis. Cram. 264. F.
3467. N. Nymphaealis Schiff. Verz. Pyr. B. 13. Nymphaeata Linn. Syst. Phal. 274. Hübn. Pyr. 85.

3. Verein, Coitus 3.

Cataclysten, Cataclystae.

Die Senken am Franzenrande mit einem schwarzen Saum und silberweißen Puncten geziert.

3468. Cataclysta Lemnalis Schiff. Verz. Pyr. B. 30. Lemnata Linn. Syst. Phal. 228. Uliginata Fabr. Ent. Phal. 317. Hübn. Pyr. 83. 84.
3469. C. Magnificalis Hübn. Pyr. 104.
3470. C. Inauralis. Inaurata Cram. 359. G.

3. Stamm, Stirps III.

Tetrachilen, Tetrachilae.

Ihr Rüssel ist mäßig lang; ihre Streichler ansehnlich, und am Grunde auch mit Schnauzen besetzt. Die Schwingflügel sind schmal und stumpf; die Senkflügel breit und schief.

Erste Familie, Familia A.

Perlmuschelfärbige, Margaritiferae.

Die Schwingen düster und perlfärbig gestreift; die Senken gänzlich einfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Ancylolomien, Ancylolomiae.

Die Schwingen krumm gerändet und zierlich gesäumt.

3471. Ancylolomia Disparalis. Disperalla. Hübn. Tin. 357.
3472. A. Tentalis. Tentaculella Hübn. Tin. 230.
3473. A. Palpigeralis. Palpella Schiff. Verz. Tin. B. 3. Hübn. Tin. 32.

2. Verein, Coitus 2.

Argyroteuchien, Argyroteuchiae.

Die Schwingen mit einem silberglänzenden Streif und winkligen Linien bezeichnet.

3474. Argyroteuchia Ericalis. Ericella Hübn. Tin. 371.
3475. A. Dumetalis. Dumetella Hübn. 389. 390.
3476. A. Pascualis. Pascuella Linn. Syst. Phal. 359. Hübn. Tin. 31.
3477. A. Enemoralis. Nemorella Hübn. Tin. 384.
3478. A. Ensigeralis. Ensigerella Hübn. Tin. 367.
3479. A. Adippalis. Adippellus Zinc. Chil. 11. Silvella Hübn. Tin. 369.
3480. A. Saltalis. Pratella Hübn. Tin. 29.
3481. A. Pratalis. Pratella Linn. Syst. Phal. 360. Hübn. Tin. 401.
3482. A. Falsalis. Falsella Schiff. Verz. Tin. B. 16. Hübn. Tin 30.
3483. A. Alpicolalis. Alpinella Hübn. Tin. 338.

3. Verein, Coitus 3.

Eucarphien, Eucarphiae.

Die Schwingen mit splitterförmigen silbernen Streifen ausgezeichnet.

3484. Eucarphia Radialis. Radiella Hübn. Tin. 325.
3485. E. Fulgidalis. Fulgidella Hübn. Tin. 365. 366.
3486. E. Vinetalis. Vinetella Fabr. Mant. Tin. 23. Hübn. Tin. 42.

Zweyte Familie, Familia B.

Unterschiedene, Distinctae.

Die Schwingen auf mehrerley Arten ausgezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Catoptrien, Catoptriae.

Die Schwingen mit silbernen Spiegelflecken der Länge nach geziert.

3487. Catoptria Eumargaritalis. Margaritella Schiff. Verz. Tin. B. 5. Hübn. Tin. 39.

3488. C. Pinetalis. Pinetella Linn. Syst. Phal. 358. Conchella Hübn. Tin. 38.

3489. C. Conchalis. Conchella Schiff. Verz. B. 6. Myella Hübn. Tin. 37.

3490. C. Mytilalis. Mytilella Hübn. Tin. 287.

3491. C. Speculalis. Pinetella Hübn. Tin. 36.

3492. C. Luctiferalis. Luctiferella Hübn. Tin. 324.

2. Verein, Coitus 2.

Agriphilen, Agriphilae.

Die Schwingen mit einem blassen Strich durch die Länge.

3493. Agriphila Selasalis. Selasella Hübn. Tin. 405. 406.

3494. A. Pratalis. Pratella Schiff. Verz. Tin. B. 29. Hübn. Tin. 29.

3495. A. Delialis. Deliella Hübn. Tin. 402. 403.

3496. A. Aquilalis. Aquilella Hübn. Tin. 52.

3497. A. Exsoletalis. Exsoletella Schiff. Verz. Tin. B. 12. Paleella Hübn. Tin. 51.

3. Verein, Coitus 3.

Pediasien, Pediasiae.

Die Schwingen mit fast unterbrochenen Bogenlinien bemerkt.

3498. Pediasia Inquinatalis. Inquinatella Schiff. Verz. Tin. B. 10. Hübn. Tin. 54.

3499. P. Squalidalis. Inquinatella Hübn. Tin. 442.

3500. P. Fascelinalis. Fascelinella Hübn. Tin. 368.

3501. P. Immistalis. Immistella Hübn. Tin. 364.

3502. P. Contaminalis. Contaminella Hübn. Tin. 59.

3503. P. Lutealis. Luteella Schiff. Verz. Tin. B. 14. Ochrella Hübn. Tin. 55.

3504. P. Ochrealis Schiff. Verz. Pyr. B. 28. Hübn. Pyr. 47. et Silaceella Tin. 232.

4. Verein, Coitus 4.

Topeuten, Topeutes.

Die Schwingen am Ende ziemlich spitzig fast zeichenleer.

3505. Topeutis Phantasmatalis. Albinella Cram. 372. D. Phantasmatella Hübn. Tin. 56.

3506. T. Gigantalis. Gigantella Schiff. Verz. Tin. B. 27. Hübn. Tin. 53.

3507. T. Phragmitalis. Phragmittella Hübn. Tin. 297. 298.

3508. T. Lanceolalis. Lanceolella. Hübn. Tin. 296.

3509. T. Acuminalis. Acuminella Hübn. Tin. 284.

3510. T. Labiosalis. Labiosella Hübn. Tin. 294.

3511. T. Respersalis, Hübn. Zutr. 125. 126.

3512. T. Mucranalis Mucronella Schiff. Verz. Tin. B. 45. Consortella Hübn. Tin. 220.

3513. T. Amplalis. Amplella Hübn. Tin. 300.

3514. T. Succilialis. Marginella Hübn. Tin. 299.

Dritte Familie, Familia C.

Erzfärbige, Aeratae.

Die Schwingen erzfärbig gemischt und bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Eromenen, Eromenae.

Die Schwingen sehr zierlich bunt gefleckt und schwarz bezeichnet.

3515. Eromene Bellalis. Bella Hübn. Tin. 60.

2. Verein, Coitus 2.

Chrysoteuchien, Chrysoteuchiae.

Die Schwingen auswärts mit göldenen Winkellinien geziert.

3516. Chrysoteuchia Hortalis. Chrysonuchella Schiff. Verz. Tin. B. 29. Hortella Hübn. Tin. 46.

3517. C. Caricetalis. Cespitella Hübn. Tin. 45.

3. Verein, Coitus 3.

Thisanotien, Thisanotiae.

Die Schwingen zwischen den Senen dunkel bestäubt, glänzend befränzt.

3518. Thisanotia Chrysonuchalis. Chrysonuchella Scop. Ent. 628. Campella Hübn. Tin. 44.

3519. T. Roralis. Rorella Linn. Syst. Phal. 362. Chrysonuchella Hübn. Tin. 43.

3520. T. Auriferalis. Cersusella et Quadrella Schiff. Tin. B. 23. 22. Auriferella et Barbella Hübn. Tin. 61. 62.

4. Verein, Coitus 4.

Exorien, Exoriae.

Die Schwingen blaßsenig, mit dunklen Senen und glänzenden Franzen.

3521. Exoria Combinalis. Combinella Schiff. Verz. Tin. B. 64. Petrificella Hübn. Tin. 47.

3522. E. Convolutalis. Convolutella Schiff. Verz. Tin. B. 15. Exoletella Hübn. Tin. 48.

3523. E. Culmalis. Culmella Linn. Syst. Phal. 361. Straminella Hübn. Tin. 49.

5. Verein, Coitus 5.

Anerastien, Anerastiae.

Die Schwingen nach den Senen schattig angelegt.

3524. Anerastia Dignalis. Lignella Hübn. Tin. 35.

3525. A. Lignalis. Lignella Hübn. Tin. 57.

3526. A. Indecoralis. Decorella Hübn. Tin. 301.

3527. A. Lotalis. Lotella Hübn. Tin. 334.

6. Verein, Coitus 6.

Hypochalcien, Hypochalciae.

Die Schwingen düstergrau kupferfärbig bezeichnet.

3528. Hypochalcia Ahenalis. Ahenella Schiff. Verz. Tin. B. 32. Spadiceella Hübn. Tin. 226.

3329. H. Aenealis. Aeneella Hübn. Tin. 41.

3530. H. Aerealis. Ahenella Hübn. Tin. 58.

Vierte Familie, Familia D.

Zweifelhafte, Dubiae.

Die Schwingen nach Art der Eulen wellenstreifig und schattig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Scopolien, Scopoliae.

Die Schwingen mit einem ordentlichen Nierenfleck und Randpuncten bezeichnet.

3531. Scopolia Sophialis Fabr. Mant. Phal. 277. Hübn. Pyr. 50.

2. Verein, Coitus 2.

Gesnerien, Gesneriae.

Die Schwingen mit einem undeutlichen Mittezeichen bemerkt.

3532. Gesneria Centurionalis. Centuriella Schiff. Verz. Tin. B. 400. Crataegella Hübn. Tin. 231.

3533. G. Mercuralis. Mercurella Linn. Syst. Phal. 63. Hübn. Tin. 239.

3534. G. Dubitalis Hübn. Pyr. 48. et Pyralella Tin. 167.

3535. G. Canellalis. Canella Schiff. Verz. Tin. B. 31. Hübn. Tin. 289.

3. Verein, Coitus 3.

Nomophilen, Nomophilae.

Die Schwingen schmal und lang; ihre Anlage düstern, fleckig und wellig bemerkt.

3536. Nomophila Hybridalis Hübn. Pyr. 114. Noctuella Schiff. Verz. Tin. B. 35.

3537. N. Incertalis. Hybridalis Hübn. Pyr. 184.

Fünfte Familie, Familia E.

Veraltete, Obsoletae.

Die Schwingen eulenähnlich dunkel bezeichnet, schattig bandirt und blaß gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Gallerien, Galleriae.

Die Schwingen ziemlich breit, am Franzenrande ausgebuchter; am Haarrande fast scheckig.

3538. Galleria Cerealis. Cereana Linn. Syst. Phal. 282. Cerella Hübn. Tin. 23.

2. Verein, Coitus 2.

Aphomien, Aphomiae.

Die Schwingen ziemlich breit.

3539. Aphomia Colonalis. Colonella Lin. Syst. Phal. 346. Hübn. Tin. 23.

3540. A. Socialis. Sociella Linn. Syst. Phal. 345. Tribunella Schiff. Verz. Tin. B. 62. Hübn. Tin. 22.

3. Verein, Coitus 3.

Pempelien, Pempeliae.

Die Schwingen nur ausserhalb wellenstreifig bezeichnet.

3541. Pempelia Colacalis. Sociella Hübn. Tin. 24.

3542. P. Quercalis. Quercella Schiff. Verz. Tin. B. 18. Noctuella Hübn. Tin. 33.

3543. P. Palumbalis. Palumbella Schiff. Verz. Tin. C. 15. Contubernella Hübn. Tin. 72.

3544. P. Ornatalis. Ornatella Schiff. Verz. Tin. C. 78. Criptella Hübn. Tin. 77.

4. Verein, Coitus 4.

Nephopterицen, Nephopterices.

Die Schwingen durch zwey gerade, blasse Wellenlinien in fast gleiche Felder getheilt.

3545. Nephopterix Abietalis. Abietella Schiff. Verz. Tin. C. 16. Decuriella Hübn. Tin. 74.

3546. N. Rhenalis. Rhenella Zinc. Phyc. 35. Pallumbella Hübn. Tin. 70.

3547. N. Roboralis. Roborella Schiff. Verz. Tin. C. 14. Spissicella Fabr. Ent. Tin. 9. Hübn. Tin. 75.

3548. N. Cristalis. Cristella Hübn. Tin. 76.

3549. N. Dilutalis. Dilutella Hübn. Tin. 69. Canella Zinc. Phyc. 14.

3550. N. Janthinalis. Janthinella Hübn. Tin. 374. 375.

3551. N. Consocialis. Consociella Hübn Tin. 328.

3552. N. Obtusalis. Obtusella Hübn. Tin. 215.

3553. N. Gracilalis. Angustella Hübn. Tin. 68.

3554. N. Binaevalis. Binaevella Hübn. Tin. 383.

3555. N. Ablutalis. Elutella Hübn. Tin. 163.

5. Verein, Coitus 5.

Zophodien, Zophodiae.

Die Schwingen mit zweyerley, rückwärts zusammen geneigten Streifen ausgezeichnet.

3556. Zophodia Legatalis. Legatella Hübn. Tin. 71.

3557. Z. Tumidalis. Tumidana Schiff. Verz. Tor. E. 19. Verucella Hübn. Tin. 73.

3558. Z. Grossularialis. Convolutella Hübn. Tin. 34.

6. Verein, Coitus 6.

Epischnien, Epischniae.

Die Schwingen kaum mit etlichen Puncten bemerkt, fast schattig gefärbt.

3559. Epischnia Diversalis Hübn. Pyr. 102.
3560. E. Prodromalis. Prodromella Hübn. Tin. 534.
3561. E. Muscerdalis. Nebulella Hübn. Tin. 157.

Sechste Familie, Familia F.

Glatte, Politae.

Die Schwingen glänzendglatt; die Senken gemein grau.

1. Verein, Coitus 1.

Myeloiden, Myeloides.

Die Schwingen glänzend, und mit schwarzen Puncten bezeichnet.

3562. Myelois Medullalis. Cribrum Schiff. Verz. Noc. C. 8. Cribrella Hübn. Tin. 67.

2. Verein, Coitus 2.

Selagien, Selagiae.

Die Schwingen glänzend oder schimmernd zeichenlos.

3563. Selagia Perlalis. Perlella Schiff. Verz. Tin. B. 11. Hübn. Tin. 40.
3564. S. Argyralis. Argyrella Schiff. Verz. Tin. B. 28. Hübn. Tin. 64.
3565. S. Lythargyralis. Lythargyrella Hübn. Tin. 227.

3. Verein, Coitus 3.

Eurhodopen, Eurhodopae.

Die Schwingen schattig rosenroth angelegt; die Senken grau.

3566. Eurhodope Pudoralis Schiff. Verz. Pyr. B. 40. Pudorella Hübn. Tin. 63. et 318.
3567. E. Carnealis. Carnella. Linn. Syst. Phal. 363. Hübn. Tin. 66. et Sanguinella 65.

4. Verein, Coitus 4.

Catastien, Catastiae.

Die Schwingen glänzend schwarz; die Senken düstern braun, gelb befränzt.

3568. Catastia Auricilialis. Auriciliella Hübn. Tin. 340.

3569. C. Marginalis Schiff. Verz. Pyr. B. 48. Antiopella Zinc. Phyc. 10. Hübn. Pyr. 28.

5. Verein, Coitus 5.

Perilypen, Perilypae.

Alle Flügel fast gleich schwarz, ohne Zeichen.

3570. Perilypa Nigralis Fabr. Ent. Phal. 421. Hübn. Pyr. 26.

3571. P. Atralis. Hübn. Pyr. 27.

6. Verein, Coitus 6.

Argyrien, Argyriae.

Die Schwingen glänzend weiß, rostig gerändet.

3572. Argyria Nummulalis Hübn. Zutr. 185. 186.

3573. A. Pusillalis Hübn. Zutr. 167. 168.

Siebente Horde, Phalanx septima.

Wickler, Tortrices.

Diese zeichnen ihre breite, kurzschnauzige Streichler, ihre ziemlich schmale und stumpfe Schwingen, ihre kurze Senken, Stützen und ihr kurzer Wanst vorzüglich aus.

Erste Rotte, Tribus prima.

Uppige, Lascivae.

Ihre Gestalt ist fast eulenförmig und ihre Anlage auf den Schwingen sehr mannigfaltig.

1. Stamm, Stirps I.

Hemerophilen, Hemerophilae.

Sie sind zünslerartig, in jedem Betrachte. Nicht nur ihre Schwingen sind zierlich bezeichnet, sondern auch ihre Senken kaum zierlos.

Erste Familie, Familia A.

Zünslerähnliche, Pyralidoides.

Ihre Schwingen sind fast eckig gerändet und zähnig befränzt.

1. Verein, Coitus 1.

Choreuten, Choreutes.

Die Schwingen färbig wellenstreifig, die Senken bläßlich bezeichnet.

3574. Choreutis Diana Hübn. Tor. 274.
3575. C. Pariana Linn. Syst Phal. 320. Hübn. Tor. 2. 1.
3576. C. Urticana Schiff. Verz. Tor. F. 7. Dentana Hübn. Tor. 4. 5.
3577. C. Nemorana Hübn. Tor. 3.
3578. C. Scintilulana Hübn. Tor. 204.

2. Verein, Coitus 2.

Porpen, Porpae.

Die Schwingen bogenstreifig und mit glänzenden Strichgen angelegt.

3579. Porpe Fibrana Hübn. Tor. 202.

Zweyte Familie, Familia B.

Lustige, Perlaetae.

Die Flügel fast stumpf und breit. Beyderley buntfärbig.

1. Verein, Coitus 1.

Mictopsichien, Mictopsichiae.

Die Schwingen sattfärbig, metallisch gesprengelt, die Senken hellfärbig, schwarz gesäumt.

3580. Mictopsichia Renaudana. Renaudalis Stoll. 8. 7.
3581. M. Hubnerana Stoll. 8. 5.

2. Verein, Coitus 2.

Gauriden, Gaurides.

Die Schwingen düsterfärbig, blaß bezeichnet; die Senken hellfärbig, schwarz bezeichnet.

3582. Gauris Albertiana Cram. 372. F. Hübn. Hem. Albertiana.
3583. G. Swederiana Stoll. 16. 5.
3584. G. Kleemanniana Cram. 384. K.

2. Stamm, Stirps II.

Olethreuten, Olethreutae.

Sie sind eulenförmig, haben sehr abwechslend zierlich gestreifte und gefleckte Schwingen.

Erste Familie, Familia A.

Geäugte, Gemmatae.

Die Schwingen, vor der Ecke mit einem blassen schwarz punctirten Fleck angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Eucosmen, Eucosmae.

Die Schwingen im Mitteraume zierlich gewebartig und glänzend bezeichnet.

3585. Eucosma Circulana Hübn. Zutr. 363. 364.
3586. E. Arcuana Linn. Syst. Phal. 296. Edleriana Cram. 386. K. Hübn. Tor. 33.

2. Verein, Coitus 2.

Enarmonien, Enarmoniae.

Die Schwingen sehr zierlich und glänzend metallisch gezeichnet.

3587. Ernarmonia Woeberiana Schiff. Verz. Tor. B. 9. Ornatana Hübn. Tor. 32.
3588. E. Splendana Hübn. Tor. 31.
3589. E. Zachana Hübn. Tor. 243.
3590. E. Albersana Hübn. Tor 224.
3591. E. Ustulana Hübn. Tor. 231.

3. Verein, Coitus 3.

Cydien, Cydiae.

Die Schwingen mit einem gölden bezeichneten Eckfleck geziert.

3592. Cydia Pomonana Schiff. Verz. Tor. B. 10. Pomonella Linn. Syst. Phal. 401. Hübn. Tor. 30.
3593. C. Aspidiscana Hübn. Tor. 256.
3594. C. Monetulana Hübn. Tor. 257.

4. Verein, Coitus 4.

Epiblemen, Epiblemae.

Die Schwingen blaß angelegt und nur mit einem schwarz punctirten Eckfleck bemerkt.

2595. Epiblema Decorana Hübn. Tor. 265.
3596. E. Hypericano. Politana Schiff. Verz. Tor. D. 16? Hübn. Tor. 23.
3597. E. Micana Schiff. Verz. Tor. B. 17. Hübn. Tor. 182.
3598. E. Hohenwartiana Schiff. Verz. Tor. D. 15. Pupillana Hübn. Tor. 20.
3599. E. Caecimaculana Hübn. Tor. 27.
3600. E. Absinthiana Hübn. Tor. 34.

3601. E. Brunichiana Schiff. Verz. Tor. F. 2. Profundana Hübn. Tor. 21.

3602. E. Tripunctana Schiff. Verz. Tor. E. 35. Luscana Fabr. Mant. Pyr. 129. Ocellana Hübn. Tor. 18.

3603. E. Scopoliana Schiff. Verz. Tor. D. 11. Tibialana Hübn. Tor. 40. Foenella Linn. Syst. Phal. 369.

3604. E. Dibeliana Hübn. Tor. 272.

3605. E. Germaranà Hübn. Tor. 47.

3606. E. Rhediana. Rhediella Linn. Syst. Phal. 444. Aurana Hübn. Tor. 22.

5. Verein, Coitus 5.

Ancyliden, Ancylides.

Die Schwingen am Ende fast sichelähnlich geformt, ziemlich scheckig angelegt.

3607. Ancylis Uncana. Uncella Schiff. Verz. Tin. B. 49. Hübn. Tor. 76.

3608. A. Harpana. Campoliliana Schiff. Verz. Tor. E. 38. Hübn. Tor. 77.

3609. A. Vappana Hübn. Tor. 241.

3610. A. Falcana. Unguicella Linn. Syst. Phal. 365. Hübn. Tor. 78.

3611. A. Siculana Hübn. Tor. 79.

3612. A. Mitterbacheriana Schiff. Verz. Tor. D. 17. Hübn. Tor. 192.

3613. A. Tineana Hübn. Tor. 81.

3614. A. Lanceolana Hübn. Tor. 80.

6. Verein, Coitus 6.

Epicharíden, Epicharides.

Die Schwingen sehr bunt braun gefleckt, ohne deutlichen Eckfleck.

3615. Epicharis Derasana Hübn. Tor. 206.

3616. E. Lundana Fabr. Ent. Pyr. 166. Corylana Hübn. Tor. 53.

Zweyte Familie, Familia B.
Gemondete, Lunatae.

Diese sind durch helle Flecke auf den Schwingen, welche miteinander einen halben Mond bilden, ausgezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Astatien, Astatiae.

Die mondbildende Flecke der Schwingen fast unförmlich und trübfärbig.

3617. Astatia Parmatana Hübn. Tor. 253. 254. Ratana 236. et Sylvana 128.

3618. A. Tenerana Schiff. Verz. Tor. D. 18. Hübn. Tor. 183.

2. Verein, Coitus 2.
Epinotien, Epinotiae.

Die Schwingen am Haarrande mit einem weißen Flecken besetzt.

3619. Epinotia Wellensiana Hübn. Tor. 237.

3620. E. Asscelana Schiff. Verz. Tor. E. 25. Hübn. Tor. 194.

3621. E. Corticana Schiff. Verz. Tor. E. 29. Hübn. Tor. 270.

3622. E. Similana Schiff. Verz. Tor. E. 32. Asseclana Hübn. Tor. 19.

3623. E. Scutellana Schiff. Verz. Tor. E. 30. Similana Hübn. Tor. 41.

3624. E. Kuhlweiniana. Corticana Hübn. Tor. 209.

3625. E. Sinuana Hübn. Tor. 212.

3626. E. Crenana Hübn. Tor. 242.

3. Verein, Coitus 3.
Hemimenen, Hemimenae.

Die Schwingen mit zierlichen Mondflecken auf dem Rücken besetzt.

3627. Hemimene Amplana Hübn. Tor. 24.

3628. H. Montana Schiff. Verz. Tor. B. 14. Petiverella Linn. Syst. Phal. 423. Hübn. Tor. 37.

3629. H. Lunulana Schiff. Verz. Tor. B. 15. Hübn. Tor. 35.

3630. H. Jacquiniana Schiff. Verz. Tor. F. 4. Inquinatana Hübn. Tor. 43.

3631. H. Dorsana Hübn. Tor. 36.

3632. H. Gundianana Hübn. Tor. 42.

3633. H. Ephippana. Hübn. Tor. 246.

3634. H. Argyrana Hübn. Tor. 46.

3635. H. Lathyrana Hübn. Tor. 207.

3636. H. Sequana Hübn. Tor. 47.

3637. H. Permixtana Schiff. Verz. Tor. D. 19. Hübn. Tor. 187.

4. Verein, Coitus 4.

Pammenen, Pammenae.

Die Schwingen gemeinschaftlich einen ganzen gelben Mond tragend.

3638. Pammene Trauniana Schiff. Verz. Tor. F. 3. Hübn. Tor. 38.

3639. P. Mediana Schiff. Verz. Tor. C. 14. Hübn. Tor. 179.

Dritte Familie, Familia C.

Gewässerte, Undulatae.

Die Schwingen dunkelfärbig, verworren wässrig gestricht.

1. Verein, Coitus 1.

Evetrien, Evetriae.

Die Schwingen graulichbraun, weißlich durchwebt.

3640. Evetria Resinana. Resinella Linn. Syst. Phal. 406. Hübn. Tor. 29.

3641. É. Quadrana Hübn. Tor. 223.
3642. E. Pinetana Hübn. Tor. 57.
3643. E. Cembrana. Cembrella Schiff. Verz. Tin. B. 39. Piceana Hübn. Tor. 72.
3644. E. Duplana Hübn. Tor. 229. 230.

2. Verein, Coitus 2.

Argyroplocen, Argyroplocae.

Die Schwingen ganz roſtfärbig und zart erzglänzend gewäſſert.

3645. Argyroploce Rosetana Hübn. Tor. 130. 222.
3646. A. Arbutana. Arbutella Linn. Syst. Phal. 380. Hübn. Tor. 195.

3. Verein, Coitus 3.

Rhyacionien, Rhyacioniae.

Die Schwingen gelblichtbraun, glänzend weiß gewäſſert.

3647. Rhyacionia Hastana Linn. Syst. Phal. 311. Hübn. Tor. 186.
3648. R. Buoliana Schiff. Verz. Tor. C. 16. Xylosteana Hübn. Tor. 154.
3649. R. Gemmana Hübn. Tor. 269.
3650. R. Turionana. Turionella Linn. Syst. Phal. 403. Hübn. Tor. 220. 221.
3651. R. Ministrana Linn. Syst. Phal. 300. Ferrugana Hübn. Tor. 56.

Vierte Familie, Familia D.

Gemaſerte, Corticeae.

Die Schwingen maſerig gefleckt und geſtreift.

1. Verein, Coitus 1.

Notocelien, Notoceliae.

Die Schwingen am Haarrande mit einem dunklen Fleck beſetzt.

3652. Notocelia Udmanniana Linn. Syst. Phal. 322. Achatana Hübn. Tor. 49.

3653. N. Siliceana Hübn. Tor. 196.

3654. N. Triquetrana Hübn. Tor. 280.

3655. N. Ocellana Schiff. Verz. Tor. E. 7. Comitana Hübn. Tor. 16.

3656. N. Petrana Hübn. Tor. 210.

3657. N. Dubitana Hübn. Tor. 71.

2. Verein, Coitus 2.

Hedyen, Hedyae.

Die Schwingen an ihrer Basis dunkel, übrigens hell und bunt gemischt.

3658. Hedya Festivana Hübn. Tor. 52.

3659. H. Amoenana Hübn. Tor. 248.

3660. H. Incarnatana Hübn. Tor. 191.

3661. H. Cynosbatana Linn. Syst. Phal. 368. Roborana Schiff. Verz. Tor. E. 34. Aquana Hübn. Tor. 17.

3662. H. Salicana. Salicella Linn. Syst. Phal. 367. Hübn. Tor. 11.

3. Verein, Coitus 3.

Apotomiden, Apotomides.

Die Schwingen theils düstern, theils heiter angelegt.

3663. Apotomis Pruniana Hübn. Tor. 15.

3664. A. Turbidana. Corticana Hübn. Tor. 13.

3665. A. Capreana Hübn. Tor. 250.

3666. A. Gentianana Hübn. Tor. 12.

3667. A. Fasciana Linn. Syst. Phal. 283. Variegana Hübn. Tor. 14.

4. Verein, Coitus 4.

Limmen, Limmae.

Die Schwingen theils satt, theils blaß marmorähnlich gewässert.

3668. Limma Inundana Schiff. Verz. Tor. F. 6. Hübn. Tor. 60.

3669. L. Mygindana Schiff. Verz. Tor. E. 28. Hübn. Tor. 181.

5. Verein, Coitus 5.

Asthenien, Astheniae.

Die Schwingen trübweiß, grau bandirt und liniirt.

3670. Asthenia Variegana Schiff. Verz. Tor. E. 6. Angustana Hübn. Tor. 74.

3671. A. Minutana Hübn. Tor. 75.

3672. A. Pygmaeana Hübn. Tor. 69.

3673. A. Favillaceana Hübn. Tor. 255.

3674. A. Reliquana. Permixtana Hübn. Tor. 75.

6. Verein, Coitus 6.

Laspeyresien, Laspeyresiae.

Die Schwingen zierlich metallisch gestricht, fast buntgemischt.

3675. Laspeyresia Stagnana Schiff. Verz. Tor. E. 23. Hübn. Tor. 193.

3676. L. Cinereana Hübn. Tor. 211.

3677. L. Corollana Hübn. Tor. 282.

7. Verein, Coitus 7.

Phiaren, Phiares.

Die Schwingen bandweise dunkel gefleckt und metallisch bezeichnet.

3678. Phiaris Metallica Hübn. Tor. 68.

3679. P. Penkleriana Schiff. Verz. Tor. B. 12. Micana Hübn. Tor. 28.

8. Verein, Coitus 8.

Celyphen, Celyphae.

Die Schwingen dunkel bandirt und gefleckt.

3680. Celypha Conchana Hübn. Tor. 106.
3681. C. Aemulana. Urticana Hübn. Tor. 65.
3682. C. Striana Schiff. Verz. Tor. D. 14. Rusticana Hübn. Tor. 66.
3683. C. Fasciolana Hübn. Tor. 260.

9. Verein, Coitus 9.

Eudemiden, Eudemides.

Die Schwingen zierlich bandweise angelegt.

3684. Eudemis Achatana Schiff. Verz. Tor. E. 27. Marmorana Hübn. Tor. 25
3685. E. Lacunana Schiff. Verz. Tor. E. 40. Porphyrana Hübn. Tor. 26.
3686. E. Charpentierana Hübn. Tor. 281.
3687. E. Areolana Hübn. Tor. 279.
3688. E. Ulmana Hübn. Tor. 278.
3689. E. Naevana Hübn. Tor. 261.
3690. E. Cespitana Hübn. Tor. 244. 245.
3691. E. Pustulana Hübn. Tor. 208.
3692. E. Strobilana Hübn. Tor. 70.
3693. E. Fuligana Hübn. Tor. 109.
3694. E. Nubilana Hübn. Tor. 111.

10. Verein, Coitus 10.

Syndemiden, Syndemides.

Die Schwingen dunkel bandirt und neblig marmorirt.

3695. Syndemis Murinana Hübn. Tor. 105.
3696. S. Diversana Hübn. Tor. 251.
3697. S. Walbomiana Linn. Syst. Phal. 312. Hübn. Tor. 203.
3698. S. Pascuana Hübn. Tor. 99.
3699. S. Musculana Hübn. Tor. 98.
3700. S. Rivulana Hübn. Tor. 184.
3701. S. Griseana Hübn. Tor. 135.
3702. S. Hybridana Hübn. Tor. 238.

3. Stamm, Stirps III.

Eutrachien, Eutrachiae.

Ihre haarige Streichler, auch am Senenrande befränzte Schwingen zeichnen sie unter andern aus.

Erste Familie, Familia A.

Schattensuchende, Umbratiles.

Sie haben eine schattige Anlage nach der Länge der Schwingen.

1. Verein, Coitus 1.

Episagmaten, Episagmatae.

Die Schwingen mit einem großen Randfleck besetzt.

3703. Episagma Schreberiana Linn. Syst. Phal. 316. Hübn. Tor. 45.

3704. E. Semimaculana Hübn. Tor. 48.

2. Verein, Coitus 2.

Acallen, Acallae.

Die Schwingen undeutlich gefleckt und zerschieden gefärbt.

3705. Acalla Ophtalmicana. Hübn. Tor. 51.

3706. A. Scabrana Schiff. Verz. Tor. E. 12. Hübn. Tor. 169.

3707. A. Lipsiana Schiff. Verz. Tor. D. 9. Hübn. Tor. 180.

3708. A. Ciliana Hübn. Tor. 171.

3. Verein, Coitus 3.

Ablabien, Ablabiae.

Die Schwingen glänzend, zeichenlos, bleich gefärbt.

3709. Ablabia Pratana Hübn. Tor. 227. 228.

3710. A. Magnana Hübn. Tor. 225. 226.

3711. A. Argentana Schiff. Verz. Tor. B. 18. Hübn. Tor. 86.

4. Verein, Coitus 4.

Acleriden, Acleridae.

Die Schwingen am Senenrande schattig gefleckt.

3712. Acleris Triana. Tripunctana Hübn. Tor. 129.
3713. A. Aspersana Hübn. Tor. 259.
3714. A. Schalleriana Linn. Syst. Phal. 315. Hübn. Tor. 288. 289.
3715. A. Comparana Hübn. Tor. 284.
3716. A. Autumnana Hübn. Tor. 247.
3717. A. Ferrugana Schiff. Verz. Tor. D. 1. Rufana Hübn. Tor. 127.
3718. A. Aquilana Hübn. Tor. 235.
3719. A. Favillaceana Hübn. Tor. 62.
3720. A. Logiana Linn. Syst. Phal. 317. Tristana Hübn. Tor. 50.

5. Verein, Coitus 5.

Lopen, Lopae.

Die Schwingen nach der Länge theils blaß, theils satt angelegt.

3721. Lopas Combustana Hübn. Tor. 234.
3722. L. Falsana. Logiana Hübn. Tor. 217.
3723. L. Rufana Schiff. Verz. Tor. D. 8. Hübn. Tor. 178.
3724. L. Sericana Hübn. Tor. 83.
3725. L. Apiciana Hübn. Tor. 87.
3726. L. Radiana Hübn. Tor. 177.
3727. L. Umbrana Hübn. Tor. 59.
3728. L. Divisana Hübn. Tor. 198.

6. Verein, Coitus 6.

Rhacodien, Rhacodiae.

Die Schwingen am Senenraude wie angefressen.

3729. Rhacodia Caudana Fabr. Ent. Pyr. 124. Hübn. Tor. 232.

3730. R. Effractana Hübn. Tor. 175.
3731. R. Emargana Fabr. Ent. Pyr. 123. Hübn. Tor. 233.
3732. R. Rosana Linn. Syst. Phal. 293. Contaminana Hübn. Tor. 142.
3733. R. Forskaleana Linn. Syst. Phal. 304. Hübn. Tor. 143.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemischte, Mixtae.

Die Schwingen sowohl nach der Quere als Länge unterschieden bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Eclecten, Eclectes.

Die Schwingen mit abstehenden Schüppgen geziert, schief blaß bandirt.

3734. Eclectis Cristana Schiff. Verz. Tor. D. 10. Hübn. Tor. 176.
3735. E. Byringerana Hübn. Tor. 216.
3736. E. Blandana. Cristana Hübn. Tor. 55.
3737. E. Nyctemerana Hübn. Tor. 240.
3738. E. Bollingerana Hübn. Tor. 61.

2. Verein, Coitus 2.

Teleien, Teleiae.

Die Schwingen nach der Quer blaß bandirt und gesprengelt.

3739. Teleia Abietana Hübn. Tor. 275. 276.
3740. T. Confixana Hübn. Tor. 277.
3741. T. Veterana. Scabrana Hübn. Tor. 58.
3742. T. Sudoriana Hübn. Tor. 283.

3. Verein, Coitus 3.

Aphanien, Aphaniae.

Die Schwingen rauschüppig, sehr sparsam bezeichnet, weiß von Farbe.

3743. Aphania Mulzeriana. Treueriana Hübn. Tor. 100.
3744. A. Cerusana Hübn. Tor. 63.
3745. A. Niveana Hübn. Tor. 64.
3746. A. Lineana Schiff. Verz. Tor. E. 31. Scriptana Hübn. Tor. 110.

4. Verein, Coitus 4.

Oxigraphen, Oxigraphae.

Die Schwingen mit schwarzen Littern bezeichnet, grünlichweiß gefärbt.

3747. Oxigrapha Literana Linn. Syst. Phal. 288. Hübn. Tor. 89. 90.
3748. O. Notatana Hübn. Tor. 88.
3749. O. Treueriana et Asperana Schiff. Verz. Tor. E. 9. 10. Squammulana Hübn. Tor. 93. 94. 95.
3750. O. Aerugana Hübn. Tor. 92. 91.
3751. O. Irrorana Hübn. Tor. 96.
3752. O. Abjectana Hübn. Tor. 97.

5. Verein, Coitus 5.

Sparganothen, Sparganothes.

Die Schwingen schief dunkelstreifig, färbig.

3753. Sparganothis Mixtana Hübn. Tor. 215.
3754. S. Adustana Hübn. Tor. 218.
3755. S. Griseana Hübn. Tor. 135.
3756. S. Luteolana Hübn. Tor. 136.
3757. S. Consimilana Hübn. Tor. 239.
3758. S. Pilleriana Schiff. Verz. Tor. B. 2. Hübn. Tor. 172.

3759. S. Strigana. Gnomana Schiff. Verz. Tor. C. 7. Hübn. Tor. 141.

3760. S. Rolandriana Linn. Phal. 309. Hübn. Tor. 174.

Dritte Familie, Familia C.

Zweydeutige, Dubiae.

Sie haben Aehnlichkeit mit Schaben. Ihre Streichler und Schwingflügel sind ziemlich schmal und lang.

1. Verein, Coitus 1.

Doloplocen, Doloplocae.

Die Schwingen unrichtig schattig bandirt und schwarz punctirt.

3761. Doloploca Punctulana Schiff. Verz. Tor. E. 13. Schlemmerella Hübn. Tin. 14.

3762. D. Lutosana Hübn. Tor. 200.

2. Verein, Coitus 2.

Oporinien, Oporiniae.

Die Schwingen mit schiefen blassen Bändgen und Flecken besetzt, dunkel marmorirt.

3763. Oporinia Hyemana. Hübn. Tor. 267. et Tortricella Tin. 11.

3764. O. Rugosana Hübn. Tor. 82.

3. Verein, Coitus 3.

Exapaten, Exapatae.

Die Schwingen mit würfligen schwarzen Fleckgen bezeichnet.

3765. Exapate Gelatana. Gelatella Linn. Syst. Phal. 344. Congelatella Clerc. Icon. 8. 5. Paradoxa Sulz. Gesch. 23. 21. Hübn. Tor. 266. M. et F.

4. Stamm, Stirps IV.

Archipen, Archipes.

Sie haben deutlich vorstehende Schnäuzgen an ihren schmälern dreyeckigen Streichlern und fast buchtige Schwingen.

Erste Familie, Familia A.

Blüthverderbende, Floriperdae.

Ihre Schwingen sind deutlich buchtig und schief angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Cacöcien, Cacoeciae.

Die Schwingen mit ansehnlichen dunklen Flecken geziert.

3766. Cacoecia Laevigana Schiff. Verz. Tor. D. 12. Oxyacanthana Hübn. Tor. 117.

3767. C. Heparana Schiff. Verz. Tor. D. 3. Crataegana Hübn. Tor. 107.

3768. C. Fulvana Schiff. Verz. D. 6. Pyrastrana Hübn. Tor. 124.

3769. C. Xylosteana Linn. Syst. Phal. 295. Acerana et Xylosteana Hübn. 118. 264.

3770. C. Roborana. Heparana Schiff. Verz. Tor. D. 3. Hübn. Tor. 126.

3771. C. Characterana Hübn. Tor. 125.

2. Verein, Coitus 2.

Pandemiden, Pandemides.

Die Schwingen schief dunkel bandirt.

3772. Pandemis Reticulana Hübn. Tor. 271.

3773. P. Textana Hübn. Tor. 115.

3774. P. Cerasana. Operana Schiff. Verz. Tor. D. 2. Hübn. Tor. 119.

3775. P. Oporana Linn. Syst. Phal. 292. Hermanniana Schiff. Verz Tor. D. 20. Hübn. Tor. 112.

3776. P. Sorbiana. Operana Schiff. Verz. Tor. D. 2. Hübn. Tor. 113.

3777. P. Pasquayana Schiff. Verz. Tor. D. 21. Carpiniana Hübn. Tor. 116.

3778. P. Ribeana Hübn. Tor. 114.

3779. P. Croceana. Hübn. Tor. 120.

3780. P. Pronubana Hübn. Tor. 121.

Zweyte Familie, Familia B.

Geringe, Vulgares.

Ihre Flügel sind gemeinförmig und einfältig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Philedonen, Philedonae.

Die Schwingen blaßfärbig und mit anderthalb dunklen Bändern besetzt.

3781. Philedone Germingana Schiff. Verz. Tor. D. 22. Pectinana Hübn. Tor. 108.

3782. P. Cinctana Schiff. Verz. Tor. E. 3. Albidana Hübn. Tor. 132.

3783. P. Costana Schiff. Verz. Tor. C. 5. Gnomana Hübn. Tor. 131.

2. Verein, Coitus 2.

Epagogen, Epagogae.

Die Schwingen gelb gefärbt und mit anderthalb braunen Bändern besetzt.

3784. Epagoge Peramplana. Amplana Hübn. Tor. 201.

3785. E. Gnomana Linn. Syst. Phal. 244. Flavana Hübn. Tor. 133.

3786. E. Ochreana. Oporana Schiff. Verz. Tor. D. 2. Hübn. Tor. 134.

3. Verein, Coitus 3.

Amelien, Ameliae.

Die Schwingen trüb färbig, schlecht dunkel bandirt.

3787. Amelia Steineriana Schiff. Verz. Tor. E. 16. Hübn. Tor. 170.

3788. A. Rhombana Schiff. Verz. Tor. D. 7. Hübn. Tor. 173.

3789. A. Lienana Hübn. Tor. 168.

4. Verein, Coitus 4.

Nephodesmen, Nephodesmae.

Die Schwingen grau gefärbt und wolkig dunkel bandirt.

3790 Nephodesme Rusticana Hübn. Tor. 102.

3791. N. Nebulana Hübn. Tor. 104.

3792. N. Roscidana Hübn. Tor. 103.

3793. N. Conspersana Schiff. Verz. Tor. E. 14. Penziana Hübn. Tor. 85.

3794. N. Asinana Hübn. Tor. 101.

3795. N. Maurana Hübn. Tor. 122.

5. Verein, Coitus 5.

Aphelien, Apheliae.

Die Schwingen zeichenlos aber hellfärbig.

3796. Aphelia Viburnana Schiff. Verz. Tor. C. 15. Unitana Hübn. Tor. 123.

3797. A. Senecionana Hübn. 263.

3798. A. Viridana Linn. Syst. Phal. 286. Hübn. Tor. 156.

3799. A. Suttneriana Schiff. Verz. Tor. C. 2. Flavana Hübn. Tor. 157.

3800. A. Flavana Hübn. Tor. 258.

5. Stamm, Stirps V.

Agapeten, Agapetae.

Diese zeichnet vorzüglichst ihre eigene streifige Anlagsart der Schwingen aus.

Erste Familie, Familia A.

Gelbe, Flavae.

Die Schwingen hellgelb gefärbt, einfach bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Euxanthiden, Euxanthides.

Die Schwingen mit winkligen Strichen bezeichnet, sattfärbig.

3801. Euxanthis Hamana Linn. Syst. Phal. 290. Hübn. Tor. 140.

3802. E. Zoegana Linn. Syst. Phal. 289. Hübn. Tor. 138.

3803. E. Trigonana Schiff. Verz. Tor. C. 17. Diversana Hübn. Tor. 139.

2. Verein, Coitus 2.

Thiodien, Thiodiae.

Die Schwingen schwefelgelb, sparsam schwärzlich grau bezeichnet.

3804. Thiodia Citrana Hübn. Tor. 185.

3805. T. Sulphurana Hübn. Tor. 162.

3. Verein, Coitus 3.

Aleimmen, Aleimmae.

Die Schwingen strohgelb, zart dunkel gewebt und grau bezeichnet.

3806. Aleimma Americana Schiff. Verz. C. 11. Plumbana Hübn. Tor. 144.

3807. A. Contaminana Hübn. Zutr. Tor. 142.
3808. A. Ectypana Hübn. Tor 190.
3809. A. Forskaleana Linn. Syst. Phal. 304. Hübn. Tor. 143.

4. Verein, Coitus 4.

Eulien, Euliae.

Die Schwingen schattig rostfärbig und mit einem glänzendweißen Punct bezeichnet.

3810. Eulia Ministrana Linn. Syst. Phal. 300. Ferrugana Hübn. Tor. 56.

Zweyte Familie, Familia B.

Blendende, Submetallicae.

Die Schwingen mit metallähnlichen Streifen, Flecken oder Puncten geziert, in gelbem Grunde.

1. Verein, Coitus 1.

Commophilen, Commophilae.

Die Schwingflügel fast wechselnd bandirt und bleyglänzend bezeichnet.

3811. Commophila Lediana Schiff. Verz. Tor. B. 13. Hübn. Tor. 151.
3812. C. Aeneana Hübn. Tor. 188.

2. Verein, Coitus 2.

Crösien, Croesiae.

Die Schwingen sehr zierlich glänzend stahlfärbig bezeichnet.

3813. Croesia Hoffmanseggana Hübn. Tor. 150.
3814. C. Bergmanniana Schiff. Verz. Tor. B. 5. Rosana Hübn. Tor. 137.
3815. C. Holmiana Lin. Syst. Phal. 308. Hübn. Tor. 39.

3. Verein, Coitus 3.

Panoplien, Panopilae.

Die Schwingen mit glänzend bleyfärbigen Linien durchzogen.

3816. Panoplia Augustana Hübn. Tor. 205.
3817. P. Lecheana Linn. Syst. Phal. 301. Hübn. Tor. 67.

4. Verein, Coitus 4.

Phalonien, Phaloniae.

Die Schwingen wechslend würflig gefleckt und glänzend bleyfärbig bezeichnet.

3818. Phalonia Decimana Schiff. Verz. Tor. B. 19. Hübn. Tor. 145.
3819. P. Tesserana Schiff. Verz. Tor. B. 7. Tessellana Hübn. Tor. 144.

5. Verein, Coitus 5.

Chlidonien, Chlidoniae.

Die Schwingen rostbraun angelegt und mit glänzend weißen Puncten geziert.

3820. Chlidonia Avellana Linn. Syst. Phal. 297. Hartmanniana Hübn. Tor. 146.
3821. C. Badiana Schiff. Verz. Tor. B. 8. Hübn. Tor. 147.
3822. C. Dubitana Hübn. Tor. 71.
3823. C. Baumanniana Schiff. Verz. Tor. B. 6. Hübn. Tor. 148.
3824. C. Amiantana Hübn. Tor. 155.
3825. C. Fabriciana Hübn. Tor. 149.

Dritte Familie, Familia C.

Muschelfärbige, Praenobiles.

Die Schwingen glänzend perlfärbig gestreift oder gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Dapsilien, Dapsiliae.

Die Schwingen glänzend weiß gestreift.

3826. Dapsilia Cebrana Hübn. Tor. 197.
3827. D. Locupletana Hübn. Tor. 268.
3828. D. Rutilana Hübn. Tor. 249.

2. Verein, Coitus 2.

Euceliden, Eucelides.

Die Schwingen braun, gelb gefleckt.

3829. Eucelis Mediana Schiff. Verz. Tor. C. 14. Aurana Fabr. Ent. Pyr. 154. Hübn. Tor. 179.

3. Verein, Coitus 3.

Eugnosten, Eugnostae.

Die Schwingen mit ansehnlichen glänzendperlweißen Flecken angelegt.

3830. Eugnosta Lathoniana Hübn. Tor. 189.
3831. E. Margaritana Hübn. Tor. 219.
3832. E. Norwichiana Hübn. Tor. 252.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Träge, Pigrae.

An Gestalt nähern sie sich den Schiefern und in ihren Anlagen sind sie merklich einfacher als die vorläufig verzeichneten Wickler.

1. Stamm, Stirps 1.

Nycteolen, Nycteolae.

Sie haben gänzlich das Ansehen der Wickler, aber zugleich auch viele Aehnlichkeit mit den Eulen, in ihre Anlage.

Erste Familie, Familia A.
Ausartende, Variabiles.

Die Schwingen sind mit einem Mittepunct und mehrern Wellenlinien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.
Axien, Axiae.

Der Mittepunct meist deutlich und schwarz, die Wellenlinien theils blaß, theils schwarz.

3833. Axia Dilutana Hübn. Tor. 6.
3834. A. Revayana Schiff. Verz. Tor. E. 17. Undulana Hübn. Tor. 7.
3835. A. Punctana Hübn. Tor. 9.
3836. A. Romosana Hübn. Tor. 10.
3837. A. Degenerana Hübn. Tor. 8.

2. Stamm, Stirps II.
Pseudoipen, Pseudoipes.

Ihr starker Leib und ihre hellgrüne Färbung des Kopfes, Rumpfes und der Schwingflügel, an der obern Ansicht, machen sie auffallend kennbar.

Erste Familie, Familia A.
Kleinliche, Minores.

Die Schwingen fast stumpf und zeichenlos.

1. Verein, Coitus 1.
Eariaden, Eariades.

Die Schwingen auswärts sätter gefärbt.

3838. Earias Clorana Linn. Syst. Tor. 287. Hübn. Tor. 160.
3839. E. Vernana Fabr. Mant. Pyr. 8. Hübn. Tor. 161.

2. Verein, Coitus 2.

Zelicen, Zelicae.

Die Schwingen am Senenrande weiß, übrigens grün.

3840. Zelica Malachitana. Zelia Stoll. 16. 2. I

3. Verein, Coitus 3.

Rhogalien, Rhogaliae.

Die Schwingen fast gefingert zackig, und mit einem weißen Mittezeichen bemerkt.

3841. Rhogalia Epigenana Stoll. 16. 1. B.

Zweyte Familie, Familia B.

Größliche, Majores.

Die Schwingen am Ende fast zugespitzt; durch die Mitte mit bleichen Linien bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Hylophilen, Hylophilae.

Die Schwingen von zwey Linien schief bezogen.

3842. Hylophila Prasinana Linn. Syst. Phal. 285. Fagana et Sylvana Fabr. Ent. Pyr. 5. 6. Hübn. Tor. 158.

3843. H. Quercana Schiff. Verz. Tor. A. 1. Prasinaria Fabr. Ent. Pyr. 4. Hübn. Tor. 159.

3. Stamm, Stirps III.

Chlamiferen, Chlamiferae.

Dem Ansehen nach sind sie den Schiefern und Zünslern sehr ähnlich. Ihre Schwingen sind mit erhabenen Schuppen geziert.

Erste Familie, Familia A.
Zweyförmige, Biformes.

Die Schwingen zackenstriemig bezeichnet und beschattet.

1. Verein, Coitus 1.
Röselien, Roeseliae.

Die Schwingen weißlichgrau gefärbt, schattig und schwarz bezeichnet.

3844. Roeselia Togatulana. Hübn. Pyr. 131.

3845. R. Cucullatana. Cuculatella Linn. Syst. Tin. 376. Palliola Schiff. Verz. Noc. D. 1. Palliolalis Hübn. Pyr. 13. 149.

3846. R. Strigulana. Strigula Schiff. Verz. Noct. D. 2. Strigulalis Hübn. Pyr. 16.

3847. R. Cristulana. Cristulalis Hübn. Pyr. 17.

3848. R. Centonana. Centonalis Hübn. Pyr. 15.

3849. R. Albulana. Albula Schiff. Verz. Noc. D. 3. Albulalis Hübn. Pyr. 14.

4. Stamm, Stirps IV.
Cochlidien, Cochlidiae.

Ihrer Gestalt nach scheinen sie sowohl den Schiefern als den Wicklern ähnlich. Ihr Leib ist dick und ihre Flügel kurz.

Erste Familie, Familia A.
Spinnerähnliche, Bombycoides.

Die Schwingen heller gemischt, braun, mit dunkler Anlage.

1. Verein, Coitus 1.
Cheloniaden, Cheloniades.

Die Schwingen schief schattig angelegt und bezeichnet.

3850. Chelonias Testudinana. Testudo Schiff. Verz. Bom. V. 1. Asella et Limacodes Esp. Bom. 26. Sulphurea Fabr. Spec. Bom. 86. Limax et Testudo Bork. Bom. 173. 174. Hübn. Tor. 164. 165.

3851. C. Asellana. Asella Schiff. Verz. Bom. V. 2. Cruciata Knoch. III. 3. 11. 12. Asellus Fabr. Ent. Hep. 9. Hübn. Tor. 166. 167.

2. Verein, Coitus 2.

Phobetren, Phobetra.

Die Schwingen schlingschattig angelegt und bezeichnet.

3852. Phobetron Hiparchiana. Hiparchia Cram. 185. D.

3853. P. Abbotana. Pithecium Abb. Lepidopt. 74.

Achte Horde, Phalanx octava.

Schaben, Tineae.

Ihr Kopf ist auf der Stirne wohlbehaart, vorzüglich sind ihre Streichler, und auch ihre Flügel, auf unterschiedene Arten sehr eigen ausgezeichnet.

Erste Rotte, Tribus prima.

Gewisse, Certae.

Diese scheinen den Schiefern anzugehören, nach ihren Formen in Flieggestalt. Im ersten Geschlechte haben sie gefiederte Ohren und fast breitliche Flügel.

1. Stamm, Stirps I.

Canephoren, Canephorae.

Ihre Flügel sind ansehnlich; aber den Weibern mangeln theils sogar die Spuren derselben, dergleichen auch die Stützen.

Erste Familie, Familia A.

Wahre, Verae.

Die Flügel einfärbig, blaßfränzig.

1. Verein, Coitus 1.

Sterrhopterицen, Sterrhopterices.

Die Flügel ziemlich ansehnlich und beschüppelt; der Wanst schlang, am Bauche weiß behaart.

3854. Sterrhopterix Vestitella Fabr. Syst. Bom. 105.
Graminella Bork. Bom. 102. Hübn. Tin. 1.

3855. S. Calvella Ochs. Psy. 6. Furva Bork. Bom. 103.
Hirsutella Hübn. Tin. 2.

2. Verein, Coitus 2.

Leptopterицen, Leptopterices.

Die Flügel zärtlich beschüppelt; der Wanst dicklich.

3856. Leptopterix Hirsutella Schiff. Verz. Tin. A. 7.
Viciella Hübn. Tin. 3.

3857. Viciella Schiff. Verz. Tin. A. 2. Hübn. Tin. 280.

3. Verein, Coitus 3.

Phalacropterицen, Phalacropterices.

Die Flügel fast kahl und durchsichtig, bis an den Rand.

3858. Phalacropterix Vitrella. Alburnea Esp. Bom. 94. 3.
Hübn. Tin. 372.

3859. P. Fucella. Apiformis Rossii Faun. Etr. 1105.
Hübn. Tin. 305.

3860. P. Muscella Schiff. Verz. Tin A. 3. Hübn. Tin. 8.

4. Verein, Coitus 4.

Epichnopterицen, Epichnopterices.

Die Flügel schittern beschüppelt, doch ziemlich bedeckt.

3861. Epichnopterix Pennella Hübn. Tin. 447.

3862. E. Plumigerella Hübn. Tin. 213.

3863. E. Plumella Schiff. Verz. Tin. A. 6. Hübn. Tin. 7. Pulla Esp. Bom. 44. 8.

3864. E. Pectinella Schiff. Verz. Tin. A. 5. Nana Bork. Bom. 104. Hübn. Tin. 5.

3865. E. Nitidella Hübn. Tin. 6.

3866. E. Bombycella Schiff. Verz. Tin .A. 4. Bombella Fabr. Mant. Bom. 205. Hübn. Tin. 4.

Zweyte Familie, Familia B.

Falsche, Falsae.

Ihre Schwingflügel sind lang und ihre Senkflügel kurz. Erstere scheinen bezeichnet im ersten Geschlechte; im andern manglen beyderley.

1. Verein, Coitus I.

Taleporien, Taleporiae.

Die Schwingen mit dunklen Schüppgen undeutlich bezeichnet.

3867. Taleporia Glabrella Ochs. Psy. 8. Pseudobombycella Hübn. Tin. 212. 282.

3868. T. Triquetrella Zinc. Beob. 5. Hübn. Tin. 373.

2. Stamm, Stirps II.

Seten, Setes.

Die Streichler mit gekrümmten Schnauzen besetzt. Die Schwingen schmal die Senken kurz, beyderley ansehnlich befränzt.

Erste Familie, Familia A.

Bekannte, Notae.

Die Schwingen nur mit einzelnen Puncten bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Autoseten, Autosetes.

Die Schwingen karg bezeichnet, die Senken fast ausgebleicht.

3869. Autoses Pellionella Linn. Syst. Phal. 372. Hübn. Tin. 15.

3870. A. Sarcitella Linn. Syst. Phal. 370. Roes. Ins. I. 4. 17.

Zweyte Familie, Familia B.

Verdächtige, Suspectae.

Die Schwingen fast gefleckt, aber auch schlechtfärbig, wie an jenen der ersten Familie.

1. Verein, Coitus 1.

Aceden, Acedae.

Die Schwingen blos mit schwarzen Puncten ausgezeichnet.

3871. Acedes Lapella Linn. Syst. Phal. 37[illegible]. Hübn. Tin. 252.

3872. A. Lutarella Hübn. Tin. 168.

2. Verein, Coitus 2.

Endroseu, Endroses.

Die Schwingen schwarz bethaut, gleichsam.

3873. Endrosis Tapezella Linn. Syst. Phal. 371. Hübn. Tin. 91.

3874. E. Betulinella Fabr. Mant. Alu. 13. Hübn. Tin. 20. 448.

3875. E. Populella Hübn. Tin. 21.

3. Verein, Coitus 3.

Monopiden, Monopides.

Die Schwingen mit einem runden durchsichtigen Fleckgen bemerkt.

3876. Monopis Rusticella Hübn. Tin. 339. 17.

3. Stamm, Stirps III.

Enyphanten, Enyphantae.

Ihre Gestalten gleichen den Wicklern und Zünslern mehr als den Schaben. Die Flügel sind vorzüglich ansehnlich.

Erste Familie, Familia A.

Zünslerähnliche, Pyralidoides.

Die Flügel groß, zart, auffallend schwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Semioscopen, Semioscopes.

Die Schwingen litternähnlich bezeichnet, in der Mitte.

3877. Semioscopis Steinkellnerella. Steinkellnerana Schiff. Verz. Tor. D. 16. Characterella Hübn. Tin. 26.

3878. S. Avellanella Hübn. Tin. 27.

3879. S. Anella Schiff. Verz. Tin. B. 30. Hübn. Tin. 28.

2. Verein, Coitus 2.

Chimabachen, Chimabachae.

Die Schwingen wellenähnlich bezeichnet, staubiggemengt.

3880. Chimabache Fagella Schiff. Verz. Tin. B. 34. Hübn. Tin. 12.

3881. C. Consimilella. Atom-la Hübn. Tin. 13.

3882. C. Lobella Hübn. Tin. 238.

Zweyte Familie, Familia B.

Wicklerähnliche, Tortricoides.

Die Flügel schmal, fast rauhlich.

1. Verein, Coitus 1.

Cheimophilen, Cheimophilae.

Die Schwingen fast haarähnlich beschüppelt weißstriemig bezeichnet.

3883. Cheimophila Phryganella Hübn. Tin. 10.
3884. C. Salicella Hübn. Tin. 9.

2. Verein, Coitus 2.

Symmocen, Symmocae.

Die Schwingen weiß, sonderbar schwarz bezeichnet.

3885. Symmoca Signella Hübn. Tin. 211.
3886. S. Picarella Linn. Faun. Suec. 1389. Hübn. Tin. 219.

4. Stamm, Stirps IV.

Brosecn, Brosees.

Diese sind den Teredinen, vorzüglichst aber denen der ersten Familie, in manchem Betrachte sehr ähnlich. Sie haben scheckige braune Schwingen, mit dergleichen Franzen.

Erste Familie, Familia A.

Diebische, Furaces.

Die Flügel ansehnlich, ziemlich stumpf.

1. Verein, Coitus 1.

Phycen, Phyces.

Die Schwingen dunkel bandirt, hell gemischt.

3887. Phycis Boletella Fabr. Ent. Tin. 1. Hübn. Tin. 18.
3888. P. Mediella Hübn. Tin. 19.
3889. P. Parasitella Hübn. Tin. 16.

Zweyte Familie, Familia B.

Verderbende, Vastificae.

Die Schwingen fleckig und sprenglig angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Diaphthirusen, Diaphthirusae.

Die Flügel weißlich und schwärzlich scheckig.

3890. Diaphthirusa Granella Linn. Syst. Phal. 377. Hübn. Tin. 165.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Ungewisse, Incertae.

Sie haben dünne, krumme, theils behaarte Streichler und ziemlich breite, stumpfe Flügel.

1. Stamm, Stirps I.

Trichocheilien, Trichocheiliae.

Die Streichler an den Regen und Lippen fein büschlig behaart.

Erste Familie, Familia A.

Auserlesene, Elegantes.

Sie haben im ersten Geschlechte krauslich befiederte Ohren. Ihre Schwingen sind voll gleichförmiger Zeichnungen.

1. Verein, Coitus 1.

Epichysien, Epichysiae.

Die Schwingen gänzlich mit hellen Puncten und scheckigen Franzen besetzt.

3891. Epichysia Anthracinella Schiff. Verz. Tin. B. 60. Hübn. Tin. 224.

3892. E. Ophisella. Ophisa Cram. 13. C.

Zweyte Familie, Familia B.

Gemeine, Communes

Die Schwingen nach der Länge und Breite schief gestreift.

1. Verein, Coitus 1.

Orophien, Orophiae.

Die Schwingen braun, blaßfärbig gestreift.

3893. Orophia Majorella Schiff. Verz. Tin. D. 1. Flavella Fabr. Ent. Alu. 9. Hübn. Tin. 120.

3894. O. Denisella Schiff. Verz. Tin. C. 23. Carmelitella Hübn. Tin. 78.

3895. O. Sordidella Hübn. Tin. 229.

2. Verein, Coitus 2.

Anadetten, Anadetiae.

Die Schwingen dunkel bezeichnet, blaß gefärbt.

3896. Anadetia Hesperidella Hübn. Tin. 169.

3897. A. Vitella Linn. Syst. Phal. 382. Hübn. Tin. 349.

3898. A. Barbella Schiff. Verz. B. 43. Hübn. Tin. 291.

3899. A. Lobella Schiff. Verz. Tin. C. 9. Hübn. Tin. 238.

Dritte Familie, Familia C.

Bindige, Vittatae.

Die Schwingen nach der Länge gleichsam zusammengesetzt.

1. Verein, Coitus 1.

Dichomeriden, Dichomerides.

Die Schwingen dem Senenrande nach blaß gefärbt.

3900. Dichomeris Ligula Hübn. Zutr. 143. 144.

2. Verein, Coitus 2.

Mesophlepen, Mesophlepes.

Die Schwingen mitten der Länge nach mit einer dunklen Linie bezeichnet.

3901. Mesophleps Genistella Schiff. Verz. Tin. B. 52. Parenthesella Fabr. Ent. Tin. 87. Interuptella Hübn. Tin. 116.

3902. M. Silacella Hübn. Tin. 117.

3. Verein, Coitus 3.

Pleuroten, Pleurotae.

Die Schwingen nur am Seitenrande blaßfärbig, übrigens der Länge nach schattig.

3903. Pleurota Rostrella Hübn. Tin. 113.

3904. P. Marginella Hübn. Tin. 299.

3905. P. Bicostella Linn. Syst. Tin. 387. Hübn. Tin. 115.

3906. P. Pyropella Schiff. Verz. Tin. B. 53. Hübn. Tin. 114.

3907. P. Semicostella Hübn. Tin. 396.

4. Verein, Coitus 4.

Eupleuriden, Eupleurides.

Die Schwingen ansehnlich blaß seitenrändig und streifig.

3908. Eupleuris Honorella Hübn. Tin. 354.

3909. E. Striatella Hübn. Tin. 154.

Vierte Familie, Familia D.

Gekrümmte, Aduncae.

Die Schwingen am Ende fast hackenförmig gekrümmt.

1. Verein, Coitus 1.

Theristen, Theristes.

Die Schwingen sehr lang und spitzig, nach der Länge mittedurch gestreift.

3910. Theristis Acinacidella Hübn. Tin. 237.

3911. T. Cultrella Hübn. Tin. 109.

3912. T. Pterella Hübn. Tin. 102.

2. Verein, Coitus 2.

Harpipterices, Harpipterices.

Die Schwingen der Länge nach schattig angelegt.

3913. Harpipterix Hamella Hübn. Tin. 282.
3914. H. Forficella Hübn. Tin. 343.
3915. H. Harpella Schiff. Verz. Tin. B. 50. Hübn. Tin. 110.
3916. H. Falcella Schiff. Verz. Tin. B. 47. Hübn. Tin. 112.

3. Verein, Coitus 3.

Sophronien, Sophroniae.

Die Schwingen auch winklig bezeichnet, sanft schattig bunt gefärbt.

3917. Sophronia Illustrella Hübn. Tin. 158.

4. Verein, Coitus 4.

Hypsolophen, Hypsolophae.

Die Schwingen vorzüglich am Haarrande schüppig, bogig gestreift.

3918. Hypsolopha Asperella Linn. Syst. Phal. 397. Hübn. Tin. 101. 329.
3919. H. Persicella Schiff. Verz. Tin. B. 67. Hübn. Tin. 100.
3920. H. Antennella Schiff. Verz. Tin. B. 19. Lucella Fabr. Ent. Alu. 7. Mucronella Hübn. Tin. 99.

5. Verein, Coitus 5.

Oxybelien, Oxybeliae.

Die Schwingen fast bandähnlich angelegt, braun und gelb wechselnd.

3921. Oxybelia Capucinella Hübn. Tin. 159. 331.
3922. O. Fasciella Hübn. Tin. 111.
3923. O. Variella Hübn. Tin. 279.

3924. O. Cuspidella Schiff. Verz. Tin. C. 58. Hübn. Tin. 242.

Fünfte Familie, Familia E.

Schmale, Macilentae.

Die Schwingen fast gleich breit und kaum spitzig; die Senken ansehnlicher.

1. Verein, Coitus 1.

Ochromolopen, Ochromolopes.

Die Schwingen der Länge nach blaß gestriemt.

3925. Ochromolopis Byssinella Hübn. Tin. 380.
3926. O. Sericella Hübn. Tin. 363.
3927. O. Vibicella Hübn. Tin. 308.
3928. O. Bifariella Hübn. Tin. 385. 386.
3929. O. Ictella Hübn. Tin. 361.

2. Verein, Coitus 2.

Euoten, Euotae.

Die Schwingen der Länge nach unterschieden gefärbt.

3930. Euota Pruniella Schiff. Verz. Tin. C. 75. Hübn. Tin. 175.
3931. E. Xylostella Linn. Syst. Phal. 389. Hübn. Tin. 119.
3932. E. Contristella. Tristella Hübn. Tin. 218.

3. Verein, Coitus 3.

Abebaeen, Abebaeae.

Die Schwingen nach der Quere gefleckt.

3933. Abebaea Sylvella Linn. Syst. Phal. 413. Hübn. Tin. 42[illegible].
3934. A. Costella Hübn. Tin. 107.
3935. A. Vulgella Schiff. Verz. Tin. C. 44. Hübn. Tin. 346.
3936. A. Fiscella Hübn. Tin. 108.
3937. A. Immella Hübn. Tin. 347.

4. Verein, Coitus 4.

Acompsien, Acompsiae.

Die Schwingen zeichnungslos und gleichfärbig.

3938. Acompsia Unitella Hübn. Tin. 147.
3939. A. Depresella Hübn. Tin. 407.
3940. A. Cinerella Linn. Syst. Phal. 392. Hübn. Tin. 173.
3941. A. Ardeliella Hübn. Tin. 437.

2. Stamm, Stirps II.

Coenyphanten, Coenyphantae.

Ihre Streichler sind ziemlich glatt, auch krumm. Ihre Schwingen fast stumpf und ihre Senken mäßig.

Erste Familie, Familia A.

Buntscheckige, Variegatae.

Die Schwingen bunt, schwarz gefleckt.

1. Verein, Coitus 1.

Anchinien, Anchiniae.

Die Schwingen schmutzig weiß, sonderlich schwarz bezeichnet.

3942. Anchinia Daphnella Schiff. Verz. Tin. M. 37. Hübn. Tin. 81.
3943. A. Cneorella. Verucella Schiff. Verz. Tin. C. 8? Hübn. Tin. 314.

2. Verein, Coitus 2.

Clysien, Clysiae.

Die Schwingen kreideweiß, bandweiße angelegt.

3944. Clysia Hybridella Hübn. Tin. 351.
3945. C. Ambiguella Hübn. Tin. 153.

Zweyte Familie, Familia B.

Abgeeckte, Obtusae.

Die Schwingen blaßfärbig, klein schwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Epeleustien, Epeleustiae.

Die Schwingen braun, weißlich bezeichnet.

3946. Epeleustia Hepaticella Hübn. Tin. 84.
3947. E. Hypericella Hübn. Tin. 441.
3948. E. Sororculella Hübn. Tin. 440.
3949. E. Liturella Hübn. Tin. 83.
3950. E. Vaccinella Hübn. Tin. 416.

2. Verein, Coitus 2.

Carcinen, Carcinae.

Die Schwingen zierlich buntfärbig, vorzüglich roth bezeichnet.

3951. Carcina Cancrella. Fagana Schiff. Verz. Tor. G. 13. Hübn. Tor. 153.
3952. C. Christierella. Christiernana Linn. Phal. 303. Hübn. Tor. 152.
3953. C. Formosella Schiff. Verz. Tin. C. 47. Hübn. Tin. 248.
3954. C. Flammella. Formosella Hübn. Tin. 160.

3. Verein, Coitus 3.

Agonoptericen, Agonopterices.

Die Schwingen im Mitteraume mit weißen roth umringten Puncten bezeichnet.

3955. Agonopterix Signella Hübn. Tin. 80.
3956. A. Alstroemerella. Alstroemeriana Linn. Syst. Phal. 314. Monilella Schiff. Verz. Tin. C. 11. Puella Hübn. Tin. 82.

3957. A. Scriptella Hübn. Tin. 152.
3958. A. Cicutella Hübn. Tin. 79. 419.
3959. A. Aegopodiella. Albipunctella Hübn. Tin. 149.
3960. A. Pudridella Hübn. Tin. 244.

4. Verein, Coitus 4.
Pinariden, Pinarides.

Die Schwingen im Mitteraume mit einem dunklen Punct bemerkt.

3961. Pinaris Angelicella Hübn. Tin. 337.
3962. P. Depunctella Hübn. Tin. 378.
3963. P. Carduella Hübn. Tin. 439.
3964. P. Rubidella Hübn. Tin. 221.
3965. P. Badiella Hübn. Tin. 92.
3966. P. Apiella Hübn. Tin. 94.
3967. P. Zephyrella Hübn. Tin. 414. 415.
3968. P. Heracliella. Heracliana Linn. Syst. Phal. 326. Hübn. Tin. 417.
3969. P. Yeatiella Hübn. Tin. 418.
3970. P. Malvella Hübn. Tin. 281.
3971. P. Gilvella Hübn. Tin. 96.
3972. P. Flavella Hübn. Tin. 97.

5. Verein, Coitus 5.
Nothriden, Nothrides.

Die Schwingen nur im Mitteraume mit schwarzen Puncten bezeichnet.

3973. Nothris Verbascella Schiff. Verz. Tin. B. 36. Hübn. Tin. 98.
3974. N. Pedisequella Hübn. Tin. 95.
3975. N. Tripunctella Schiff. Verz. Tin. B. 66. Hübn. Tin. 217.
3976. N. Pauperella. Terrella Hübn. Tin. 170.
3977. N. Tremella Schiff. Verz. Tin. C. 27. Blattariella Hübn. Tin. 148.

3978. N. Juniperella Linn. Syst. Phal. 408. Hübn. Tin. 216.

3979. N. Umbrella Schiff. Verz. Tin. C. 31. Hübn. Tin. 243.

3980. N. Obscurella Hübn. Tin. 438.

6. Verein, Coitus 6.

Tichonien, Tichoniae.

Die Schwingen kaum ein wenig dunkel bestäubt, blaßfärbig.

3981. Tichonia Pulverella. Atomella Hübn. Tin. 240.

3982. T. Tinctella Hübn. Tin. 214.

3983. T. Deplanella Hübn. Tin. 274.

7. Verein, Coitus 7.

Nygmien, Nygmiae.

Die Schwingen weiß, mit schwarzen Pünctgen reihig besetzt.

3984. Nygmia Evonymella Linn. Syst. Phal. 350. Hübn. Tin. 88.

3985. N. Cagnatella Hübn. Tin. 391. 392. et 87.

3986. N. Irrorella Hübn. Tin. 93.

3987. N. Rorella Hübn. Tin. 234.

3988. N. Padella Linn. Syst. Phal. 151. Hübn. Tin. 393—395.

3989. N. Plumbella Schiff. Verz. Tin. C. 34. Hübn. Tin. 86.

8. Verein, Coitus 8.

Psecadien, Psecadiae.

Die Schwingen mit ungleichen schwarzen Puncten bezeichnet, graulichweiß gefärbt.

3990. Psecadia Sexpunctella Hübn. Tin. 304.

3991. P. Decemguttella Hübn. Tin. 303.

9. Verein, Coitus 9.

Anesychien, Anesychiae.

Die Schwingen weiß, streifweise schwarz gefleckt.

3992. Anesychia Lithospermella. Pusiella Linn. Syst. Phal. 347. Hübn. Tin. 104.
3993. A. Echiella Schiff. Verz. Tin. C. 54. Hübn. Tin. 105.
3994. A. Sequella Linn. Syst. Phal. 352. Hübn. Tin. 103.
3995. A. Vittella Linn. Syst. Phal. 382. Hübn. Tin. 164. 349.

10. Verein, Coitus 10.

Disthymnien, Disthymniae.

Die Schwingen weiß und schwarz wechselnd angelegt.

3996. Disthymnia Funerella Fabr. Mant. Phal. 74. Hübn. Tin. 85.

11. Verein, Coitus 11.

Prayden, Praydes.

Die Schwingen niedlich schwarz bezeichnet, weißlich im Grunde.

3997. Prays Coenobitella Hübn. Tin. 309.
3998. P. Scriptella Hübn. Tin. 152.
3999. P. Repandella Hübn. Tin. 253.

Dritte Familie, Familia C.

Schmale, Angustae.

Ihre Schwingflügel sind schmal und fast gleichbreit.

1. Verein, Coitus 1.

Scythropien, Scythropiae.

Die Schwingen schwarz gefärbt, weiß gefleckt.

4000. Scythropia Crataegella Linn. Syst. Phal. 353. Hübn. Tin. 257.
4001. S. Monachella Hübn. Tin. 143.
4002. S. Luctuella Hübn. Tin. 144.
4003. S. Sturmella. Scopolella Hübn. Tin. 145.
4004. S. Leucatella Linn. Syst. Phal. 391. Hübn. Tin. 146.
4005. S. Scopolella Linn. Syst. Phal. 434? Hübn. Tin. 246.
4006. S. Alternella Hübn. Tin. 151.
4007. S. Reticulella Hübn. Tin. 171.

2. Verein, Coitus 2.

Momphen, Momphae.

Die Schwingen grau und schwarz angelegt, weiß oder gelb gefleckt.

4008. Mompha Conturbatella Hübn. Tin. 450.
4009. M. Ferruginella Hübn. Tin. 348.
4010. M. Mendicella Hübn. Tin. 179.
4011. M. Spendella Hübn. Tin. 381.
4012. M. Caesiella Hübn. Tin. 360.

3. Verein, Coitus 3.

Tebennen, Tebennae.

Die Schwingen ansehnlich bunt angelegt.

4013. Tebenna Maculatella Hübn. Tin. 162.
4014. T. Festivella Hübn. Tin. 249.
4015. T. Laspeyresella Hübn. Tin. 90.
4016. T. Comptella Hübn. Tin. 89.

4. Verein, Coitus 4.

Scythriden, Scythrides.

Die Schwingen bräunlichgrau und bräunlichgelb flammig angelegt.

4017. Scythris Chenopodiella Hübn. Tin. 320.
4018. S. Elongella Hübn. Tin. 174.

5. Verein, Coitus 5.

Gelechien, Gelechiae.

Die Schwingen mit vielen schwarzen Strichgen bezeichnet.

4019. Gelechia Pullatella Hübn. Tin. 118.
4020. G. Notatella Hübn. Tin. 344.
4021. G. Rhombella Schiff. Verz. Tin. C. 38. Hübn. Tin. 277.
4022. G. Proximella Hübn. Tin. 228.
4023. G. Murinella Schiff. Verz. Tin. B. 55. Hübn. 275.

6. Verein, Coitus 6.

Hypatimen, Hypatimae.

Die Schwingen grau, sehr sparsam schwarz bemerkt.

4024. Hypatima Conscriptella Hübn. Tin. 283.
4025. H. Mouffetella Linn. Syst. Phal. 431. Hübn. Tin. 245.
4026. H. Asinella Hübn. Tin. 166.
4027. H. Inspersella Hübn. Tin. 443.
4028. H. Tenebrella Hübn. Tin. 434.

3. Stamm, Stirps III.

Elasmien, Elasmiae.

Diese sind mit kurzen Streichlern und langen Ohren versehen. Ihre Schwingen sind breitlich, fast metallisch glänzend; desgleichen auch ihre Senken.

Erste Familie, Familia A.

Wunderbare, Mirandae.

Ihre Ohren sind theils dick und behaart.

1. Verein, Coitus 1.

Ochsenheimerien, Ochsenheimeriae.

Die Ohren auf ihrem Rücken dick mit Haaren bedeckt. Die Flügel schmal düstern gemischt.

4029. Ochsenheimeria Bubalella Hübn. Tin. 376.
4030. O. Taurella Schiff. Verz. Tin. D. 17. Hübn. Tin. 188.

2. Verein, Coitus 2.

Eutyphien, Eutyphiae.

Die Ohren mit einem haarigen Knoten besetzt, übrigens ganz dünn, aber sehr lang. Die Schwingen glänzend strahlig, zierlich bandirt.

4031. Eutyphia Geerella. Degeerella Linn. Syst. Phal. 426. Hübn. Tin. 130. 446.
4032. E. Sulzella Linn. Syst. Phal. 427. Hübn. Tin. 121.
4033. E. Ochsenheimerella Hübn. Tin. 359.

3. Verein, Coitus 3.

Epityphien, Epityphiae.

Die Schwingen glänzend gefärbt, blaß gefleckt.

4034. Epityphia Latreillella Hübn. Tin. 255.
4035. E. Raddaella Hübn. Tin. 131.
4036. E. Mazolaella Hübn. Tin. 155.

4. Verein, Coitus 4.

Nemotoiden, Nemotoides.

Die Schwingen metallglänzend, sattfärbig.

4037. Nemotois Schiffermillerella. Schiff. Verz. Tin. D. 20. Hübn. Tin. 132.
4038. N. Pfeifferella Hübn. 422.
4039. N. Frischella Linn. Syst. Phal. 433. Hübn. Tin. 425. 426.

4040. N. Mollella Hübn. Tin. 423. 424.
4041. N. Cuprella Schiff. Verz. Tin. D. 44. Hübn. Tin. 185.
4042. N. Cypriacella Hübn. Tin. 445.
4043. N. Reaumurella Linn. Syst. Phal. 425. Viridella Hübn. Tin. 128.
4044. N. Viridella Schiff. Verz. Tin. D. 4. Sphingella Hübn. Tin. 129.

5. Verein, Coitus 5.

Nemophoren, Nemophorae.

Die Schwingen blaß, metallisch glänzend gefärbt.

4045. Nemophora Swammerdamella Linn. Syst. Phal. 424. Hübn. Tin. 410. 411.
4046. N. Metaxella Hübn. Tin. 413.
4047. N. Panzerella Hübn. Tin. 412.
3048. N. Pilella Schiff. Verz. Tin. D. 6. Hübn. Tin. 235.
4049. N. Pilulella Hübn. Tin. 409.

Zweyte Familie, Familia B.

Vollkommene, Perfectae.

Die Ohren mäßig, ziemlich gemeinförmig.

1. Verein, Coitus 1.

Galanthien, Galanthiae.

Die Schwingen fast zeichnungslos.

4050. Galanthia Extensella. Esperella Hübn. Tin. 255.
4051. G. Knochella Hübn. Tin. 260.
4052. G. Flavifrontella Schiff. Verz. Tin. D. 22. Hübn. Tin. 126.
4053. G. Laminella Schiff. Verz. Tin. C. 51. Hübn. Tin. 139.
4054. G. Rufimitrella Schiff. Verz. Tin. D. 15. Hübn. Tin. 124.
4055. G. Maurella Schiff. Verz. Tin. D. 11. Hübn. Tin. 122.

2. Verein, Coitus 2.

Esperien, Esperiae.

Die Schwingen hellfärbig gefleckt oder gestreift.

4056. Esperia Orbonella Hübn. Tin. 313.
4057. E. Sparmannella Fabr. Ent. Tin. 160. Hübn. Tin. 408.
4058. E. Masculella Schiff. Verz. Tin. D. 28. Hübn. Tin. 125.
4059. E. Oehlmanniella Hübn. Tin. 184.
4060. E. Rupella Schiff. Verz. Tin. D. 45. Hübn. Tin. 250.
4061. E. Praelatella Schiff. Verz. Tin. D. 46. Hübn. Tin. 251.
4062. E. Flavimitrella Hübn. Tin. 429.
4063. E. Pronubella Schiff. Verz. Tin. D. 16. Hübn. Tin. 247.

3. Verein, Coitus 3.

Alabonien, Alaboniae.

Die Schwingen hellfärbig bandirt und metallisch glänzend bezeichnet.

3064. Alabonia Geoffroyella Linn. Syst. Phal. 430. Druriella Cram. 396. L. Hübn. Tin. 123.
4065. A. Bracteella Linn. Syst. Phal. 415. Cramerella Cram. 396. M. Hübn. Tin. 156.
4066. A. Aemulella Hübn. Tin. 222.

4. Verein, Coitus 4.

Epermenien, Epermeniae.

Die Schwingen bunt angelegt, die Senken grau; beyderley ansehnlich befränzt.

4067. Epermenia Pontificella Hübn. Tin. 181.

Dritte Familie, Familia C.

Einfache, Simplices.

Die Anlage der Schwingen nur in Bändgen oder Flecken bestehend.

1. Verein, Coitus 1.

Brachmien, Brachmiae.

Die Schwingen schwarz und gelb wechslend gefeldet.

4068. Brachmia Luculella Hübn. Tin. 397.

4069. B. Dimidiella Schiff. Verz. Tin. C. 72. Hübn. Tin. 253.

2. Verein, Coitus 2.

Antispilen, Antispilae.

Die Schwingen mit entgegengesetzten hellen Flecken oder Bändgen angelegt.

4070. Antispila Pagenstecherella. Merianella Hübn. Tin. 265.

4071. A. Augustella Hübn. Tin. 177.

4072. A. Anderschella Hübn. Tin. 352.

4073. A. Jurinella Hübn. Tin. 377.

4074. A. Freyerella. Nigrella Hübn. Tin. 285.

4075. A. Grimmella Hübn. Tin. 455.

4076. A. Stadtmüllerella. Pfeiferella Hübn. 398.

4077. A. Albifrontella Hübn. Tin. 432.

4078. A. Aurella Schiff. Verz. Tin. D. 19. Hübn. Tin. 262.

4079. A. Helwigella Hübn. Tin. 263.

4080. A. Ammanella Hübn. Tin. 388.

4081. A. Megerlella Hübn. Tin. 307.

4082. A. Goldegella Hübn. Tin. 258.

3. Verein, Coitus 3.

Schreckensteinien, Schreckensteiniae.

Die Schwingen sehr täuschend senig und fleckig.

4083. Schreckensteinia Festaliella Hübn. Tin. 449.

Vierte Familie, Familia D.

Scheinliche, Falsae.

Die Schwingen nur mit hellen Bändgen oder Pünctgen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Borkhausenien, Borkhauseniae.

Die Schwingen mit zwey blassen Fleckgen besetzt.

4084. Borkhausenia Minutella Linn. Syst. Phal. 410. Hübn. Tin. 141.
4085. B. Similella Hübn. Tin. 182.
4086. B. Atrella Schiff. Verz. Tin. C. 60. Hübn. Tin. 278.

2. Verein, Coitus 2.

Denisien, Denisiae.

Diese haben etliche blaßgelbe Flecken auf den Schwingen.

4087. Denisia Tigrella Hübn. Tin. 336.
4088. D. Sulphurella Hübn. Tin. 150.
4089. D. Stipella Linn. Sxst. Phal. 412. Hübn. Tin. 138.
4090. D. Luzella Hübn. Tin. 430.

3. Verein, Coitus 3.

Chionoden, Chionodae.

Die Schwingen sind mit etlichen schneeweißen Bändgen oder Fleckgen angelegt.

4091. Chionodes Luctuella Hübn. Tin. 144.
4092. C. Luctificella Hübn. Tin. 312.
4093. C. Berberidella. Quadrella Fabr. Ent. Tin. 51. Scopolella Hübn. Tin. 145.
4094. C. Moestella Hübn. Tin. 295.
4095. C. Exiguella Hübn. Tin. 266.
4096. C. Cinctella Linn. Syst. Phal. 390. Hübn. Tin. 142.
4097. C. Quadripunctella. Quadrella Hübn. Tin. 293.
4098. C. Guttella Hübn. Tin. 176.
4099. C. Scopolella Linn. Syst. Phal. 434? Hübn. Tin. 246.
4100. C. Parella. Atrella Hübn. Tin. 140.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Wunderbare, Mirabiles.

Sie sind die kleinsten aller Schaben, ihre Flügel die schmälsten, aber auch die ansehnlichst befränzten.

1. Stamm, Stirps I.

Phyllonorycteren, Phyllonorycteres.

Ihre Schwingen sind niedlich bemerkt, und glänzend gefärbt.

Erste Familie, Familia A.

Edle, Nobiles.

Die Schwingen metallisch scheinend, und gleichsam mit glänzendem Metall bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Glyphiptericen, Glyphipterices.

Die Grundfarbe der Schwingen graulichbraun, die Zeichen fast silbern.

4101. Glyphipterix Linneella Linn. Syst. Phal. 446. Hübn. Tin. 436. et Linneana Tor. 84.

4102. G. Aillyella Hübn. Tin. 431. et Seppella Tin. 223.

4103. G. Humerella Hübn. Tin. 292.

2. Verein, Coitus 2.

Schiffermüllerien, Schiffermülleriae.

Die Schwingen glänzend oraniengelb; schwärzlich schattig und silbern bezeichnet.

4104. Schiffermülleria Schaefferella Linn. Syst. Phal. 443. Hübn. Tin. 136.

4105. S. Procerella Schiff. Verz. Tin. C. 20. Hübn. Tin. 137.

4106. S. Schrankella Hübn. Tin. 264.

3. Verein, Coitus 3.

Argyresthien, Argyresthiae.

Der Grund der Schwingen perlweiß, mit göldenen Streifen angelegt.

4107. Argyresthia Goedartella Linn. Syst. Phal. 436. Hübn. Tin. 133.

4108. A. Micella Schiff. Verz. Tin. C. 59. Hübn. Tin. 210.

4109. A. Brockeella Hübn. Tin. 362.

4110. A. Pygmaeella Schiff. Verz. Tin. C. 70. Hübn. Tin. 353.

Zweyte Familie, Familia B.
Vorzügliche, Eximiae.

Die Schwingen goldschimmernd gefärbt, silberglänzend bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Chrysoesthien, Chrysoesthiae.

Die Schwingen nach der Breite und Länge perlweiß gestreift und gefleckt.

4111. Chrysoesthia Zinckenella Hübn. Tin. 401. 402.

4112. C. Roesella Linn. Syst. Phal. 445. Hübn. Tin. 135. 399. 400.

4113. C. Mespilella Hübn. Tin. 134.

4114. C. Cydoniella Schiff. Verz. Tin. D. 35. Hübn. Tin. 271.

4115. C. Merianella Linn. Syst. Phal. 438. Hübn. Tin. 134.

3116. C. Leuvenhoeckella Linn. Syst. Phal. 437. Hübn. Tin. 261.

2. Verein, Coitus 2.

Lithocolleten, Lithocolletes.

Die Schwingen mit glänzenden Strichgen und Fleckgen fast gestirnt belegt.

4117. Lithocolletis Locupletella Schiff. Verz. Tin. C. 71. Hübn. Tin. 259.
4118. L. Rajella Linn. Syst. Phal. 447. Hübn. Tin. 200.
4119. L. Kleemannella Fabr. Ent. Tin. 169. Hübn. Tin. 201.
4120. L. Alnifoliella Hübn. Tin. 193.

3. Verein, Coitus 3.

Eucesten, Eucestes.

Die Schwingen oraniengelb und mit perlweißen Winkelstreifen bezeichnet.

4121. Eucestis Ulmifoliella Hübn. Tin. 444.
4122. E. Corylifoliella Hübn. Tin. 194.

Dritte Familie, Familia C.

Stetige, Frequentes.

Die Schwingen sehr zart, und schön schwarz bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Lyonetien, Lyonetiae.

Die Schwingen perlweiß gegründet.

4123. Lyonetia Clerckella Linn. Syst. Phal. 450. Prunifoliella Hübn. Tin. 191.
4124. L. Cerasifoliella Hübn. Tin. 190.
4125. L. Malifoliella Hübn. Tin. 195.

2. Stamm, Stirps II.

Calybiten, Calybitae.

Sie zeichnen sich durch die Haltung ihrer Flügel und Stützen aus, und sind düster scheckig bekleidet.

Erste Familie, Familia A.

Schlange, Graciles.

Die Schwingen lang, fast ganz gleichfärbig deutlich bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Cosmopterien, Cosmopterices.

Die Schwingen gleichsam geschmückt, mit Streifen, Flecken oder Puncten.

4126. Cosmopterix Zieglerella Hübn. Tin. 306.
4127. C. Langiella Hübn. Tin. 187.
4128. C. Angustipennella Hübn. Tin. 197.
4129. C. Phasianipennella Hübn. Tin. 321.
4130. C. Phengitella Hübn. Tin. 323.
4131. C. Ahornerella Hübn. Tin. 178.
4132. C. Microdactylella Schiff. Verz. Tin. D. 42. Hübn. Tin. 290.

2. Verein, Coitus 2.

Aristotelien, Aristoteliae.

Die Flügel gleichsam abgestutzt; die Schwingen grau gefärbt, weiß gestreift.

4133. Aristotelia Decurtella Hübn. Tin. 311.

3. Verein, Coitus 3.

Calotripiden, Calotripides.

Die Schwingen fast buntfärbig.

4134. Calotripis Striatella Hübn. Tin. 288.
4135. C. Illigerella Hübn. Tin. 333.
4136. C. Hemidactylella Schiff. Verz. Tin. D. 41. Hübn. Tin. 276.
4137. C. Franckella Hübn. Tin. 379.
4138. C. Onustella Hübn. Tin. 314.

4. Verein, Coitus 4.

Tichotripiten, Tichotripides.

Die Schwingen grauſcheckig faſt ſtaubig dabey.

4139. Tichotripis Meleagripennella Hübn. Tin. 189.
4140. T. Cuculipennella Hübn. Tin. 192.
4141. T. Accesella Schiff. Verz. Tin. C. 74. Hübn. Tin. 269.
4142. T. Miscella Schiff. Verz. Tin. D. 18. Hübn. Tin. 373.
4143. T. Nanella Schiff. Verz. Tin. C. 68. Hübn. Tin. 267.
4144. T. Testaceella Hübn. Tin. 326.
4145. T. Pumilella Schiff. Verz. Tin. C. 73. Hübn. Tin. 268.

Zweyte Familie, Familia B.

Kurtze, Breves.

Die Schwingen kurz, ziemlich blaßfärbig und ſparſam bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Swammerdamien, Swammerdamiae.

Die Schwingen wolkig grau angelegt.

4146. Swammmerdamia Anthyllidella Hübn. Tin. 330.
4147. S. Cerasiella Hübn. 332.
4148. S. Heroldella. Caesiella Hübn. Tin. 172.

2. Verein, Coitus 2.

Leucopteren, Leucopterae.

Die Schwingen weiß, sparsam bezeichnet.

4149. Leucoptera Spartifoliella Hübn. Tin. 335.
4150. L. Auritella Hübn. Tin. 387.
4151. L. Cerusella Hübn. Tin. 183.

3. Verein, Coitus 3.

Micropterices, Micropterices.

Sehr klein, fast oder ganz zeichenlos, glänzend bekleidet.

4152. Micropterix Mucidella Hübn. Tin. 435.
4153. M. Podevinella Hübn. 342.
4154. M. Pusilella Hübn. Tin. 341.

3. Stamm, Stirps III.

Coleophoren, Coleophorae.

Ihre Flügel sind sehr schmal, und deren Franzen sehr lang; sie haben daher ein ziemlich federförmiges Ansehen.

Erste Familie, Familia A.

Hüpsche, Formosae.

Diese sind mit perlweißen Streifen ihrer Länge nach bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Eupisten, Eupistae.

Die Schwingen mit mehrern glänzenden Streifen geziert.

4155. Eupista Ornatipennella Hübn. Tin. 199.
4156. E. Otidipennella Hübn. Tin. 433.
4157. E. Struthionipennella Hübn. Tin. 209.

2. Verein, Coitus 2.

Apisten, Apistae.

Die Schwingen nur am Senenrande weiß.

4158. Apista Gallipenella Hübn. Tin. 202.
4159. A. Leucapennella Hübn. Tin. 205.

Zweyte Familie, Familia B.

Bemerkte, Signatae.

Die Schwingen mit unterschiedenen Zeichen bemerkt.

1. Verein, Coitus 1.

Caloptilien, Caloptiliae.

Mit hellen Zeichen auf den Schwingen, in färbigem Grunde.

4160. Caloptilia Upupaepennella Hübn. Tin. 203.
4161. C. Ampelipennella. Hübnerella Hübn. Tin. 236.

2. Verein, Coitus 2.

Pöciloptilien, Poeciloptiliae.

Die Schwingen hell und dunkel scheckig.

4162. Poeciloptilia Falconipennella Hübn. Tin. 317.
4163. P. Canaepennella Hübn. Tin. 327.
4164. P. Sittaepennella. Padifoliella Hübn. Tin. 316.
4165. P. Signipennella Hübn. Tin. 196.
4066. P. Anseripennella Hübn. Tin. 319.
4067. P. Roscipennella Hübn. Tin. 198.

Dritte Familie, Familia C.

Gemeine, Vulgares.

Die Schwingen ganz einfärbig ohne Zeichen.

1. Verein, Coitus 1.

Haploptilien, Haploptiliae.

Die Schwingen unterschiedlich gefärbt.

4168. Haploptilia Coracipennella Hübn. Tin. 208.
4169. H. Gryphipennella Hübn. Tin. 206.
4170. H. Rufipennella Hübn. Tin. 204.
4171. H. Mayrella Hübn. Tin. 322.
4172. H. Spinifoliella Hübn. Tin. 350.
4173. H. Complanella. Ochrodactyla Schiff. Verz. Alu. A. 1. Hübn. Tin. 428.
4174. H. Laricella Hübn. Tin. 427.
4175. H. Anatipennella Hübn. Tin. 186.
4176. H. Cygnipennella Hübn. Tin. 207.

Neunte Horde, Phalanx nona.

Geistgen, Alucitae.

Sie sind durch ihre federförmige Flügel, lange Stützen und ihren schlangen Wanst erkennbar.

Erste Rotte, Tribus prima.

Ungespaltene, Integrae.

Die Flügel ganz, mäßig breit und lang, aber die Stützen zart, und der Wanst lang.

1. Stamm, Stirps I.

Panpteroten, Panpterotes.

Die Flügel beyderley lanzetförmig, kaum stumpf.

Erste Familie, Familia A.

Trübfärbige, Obnubilae.

Die Schwingen schattig grau angelegt.

1. Verein, Coitus 1.

Agdisten, Agdistes.

Die Schwingen mit zusammenhängenden dunklen Flecken bemerkt.

4177. Agdistis Adactyla Hübn. Alu. 32—34.

Zweyte Rotte, Tribus secunda.

Dreyspaltige, Trifidae.

Die Schwingen einmal und die Senken zweymal gespalten.

1. Stamm, Stirps I.

Pterophoren, Pterophorae.

Die Flügel federförmig; die Schwingen färbiger als die Senken.

Erste Familie, Familia A.

Stumpfe, Obtusae.

Die Schwingen am Ende breitlich, fast schnäblig, die Senken ungleich.

1. Verein, Coitus 1.

Platyptilien, Platyptiliae.

Die Schwingen aussen breit und stumpf.

4178. Platyptilia Calodactyla et Megadactyla Schiff. Verz. Alu. A. 4. 8. Hübn. Alu. 7. 6.

4179. P. Petradactyla Hübn. Alu. 37. 38.

4180. P. Ochrodactyla Hübn. Alu. 12. 13.

4181. P. Rhododactyla Schiff. Verz. Alu. A. 5. Hübn. Alu. 8.

2. Verein, Coitus 2.

Amblyptilien, Amblyptiliae.

Die Schwingen fast buntscheckig und glänzend bezeichnet.

4182. Amplyptilia Acanthothactyla Hübn. Alu. 23. 24.
4183. A. Cosmodactyla Hübn. Alu. 35. 36.
4184. A. Trichodactyla, Didactyla et Chrysodactyla Schiff. Verz. Alu. A. 3. 2. 11. Hübn. Alu. 9. 18.
4185. A. Phaeodactyla Hübn. Alu. 14. 15.

Zweyte Familie, Familia B.

Spitzige, Cuspides.

Die Schwingen fast gekrümmt und gespitzt, fast halb zerspalten.

1. Verein, Coitus 1.

Stenoptilien, Stenoptiliae.

Die Schwingen schmal, mit einzelen schwarzen Puncten bemerkt.

4186. Stenoptilia Mictodactyla Schiff. Verz. Alu. A. 3. Hübn. Alu. 3.
4187. S. Ptilodactyla Hübn. Alu. 16. 25.
4188. S. Pterodactyla Linn. Syst. Phal. 458. Hübn. Alu. 4.
3189. S. Scarodactyla Hübn. Alu. 21. 22.
3190. S. Tephradactyla Hübn. Alu. 17.
4191. S. Carphodactyla Hübn. Alu. 19. 20.
4192. S. Microdactyla Schiff. Verz. Alu. A. 12. Hübn. Alu. 26. 27.

2. Verein, Coitus 2.

Aciptilien, Aciptiliae.

Die Federn am Ende ziemlich zugespitzt, fast zeichenlos.

4193. Aciptilia Galactodactyla Schiff. Verz. Alu. 14. Hübn. Tin. 2.

4194. A. Pentadactyla Linn. Syst. Phal. 459. Hübn. Alu. 1.
4195. A. Theiodactyla. Leucodactyla Hübn. Alu. 5.

Dritte Rotte, Tribus tertia.

Zehnspaltige, Multifidae.

Beyderley Flügel sind in sechs Federgen getheilt.

1. Stamm, Stirps I.

Rhipidophoren, Rhipidophorae.

Alle Flügel fächerförmig, jeder sechsfederig.

Erste Familie, Familia A.

Scheckige, Variegatae.

Die Flügel theils scheckig befiedert, und mit Endfleckgen bezeichnet.

1. Verein, Coitus 1.

Euchiradien, Euchiradiae.

Die Federn bandweise bräunlichgrau und schwärzlichbraun angelegt, deren Endfleckgen schwarz.

4196. Euchiradia Hexadactyla Linn. Syst. Phal. 460. Hübn. Alu. 10. 11. et 30. 31.
4197. E. Dodecadactyla Hübn. Alu. 29.
4198. E. Polydactyla. Hübn. Alu. 28.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Hübner, Jacob,

Verzeichniß bekannter Schmetterlinge

Augsburg 1816
Zool. 262 f
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307591-2